

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตามประเด็นเนื้อหาของการวิจัยและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำเสนอโดยแบ่งเป็น 5 ตอน เรียงตามลำดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางสังคมและสถานภาพผู้ให้ข้อมูล

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ

ตอนที่ 5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จำนวน 132 ฉบับ ได้รับคืนจำนวนทั้งสิ้น 132 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 จำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	64	48.48
หญิง	68	51.52
รวม	132	100.00

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
อายุ		
ต่ำกว่า 30 ปี	5	3.79
30 – 39 ปี	14	10.61
40 – 49 ปี	40	30.30
50 – 59 ปี	19	14.39
60 ปีขึ้นไป	54	40.91
รวม	132	100.00
อาชีพ		
ไม่มีอาชีพ	30	22.73
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	19	14.39
ทำไร่ ทำนา	54	40.91
ค้าขาย	11	8.33
รับจ้าง	18	13.64
รวม	132	100.00
รายได้จากอาชีพหลักโดยเฉลี่ยต่อเดือน		
ไม่มีรายได้	12	9.09
ไม่เกิน 2,000 บาท	52	39.39
2,001 – 4,000 บาท	34	25.76
4,001 – 6,000 บาท	13	9.85
6,000 บาทขึ้นไป	21	15.91
รวม	132	100.00
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	98	74.25
สูงกว่าประถมศึกษา	34	25.75
รวม	132	100.00

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
ตำแหน่งทางสังคม		
แพทย์/ทันตแพทย์	2	1.52
พยาบาลวิชาชีพ	7	5.30
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ	4	3.03
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	6	4.55
สารวัตรกำนัน/ผช.ผู้ใหญ่บ้าน	4	3.03
สมาชิก อบต.	12	9.09
อาสาสมัครสาธารณสุข	39	29.54
ประชาชนผู้สูงอายุ/ประชาชน	9	6.82
แม่บ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ		
สมาชิกผู้สูงอายุ	49	37.12
รวม	132	100.00
สถานภาพผู้ให้ข้อมูล		
แกนนำชุมชน	70	53.03
ผู้สูงอายุ	49	37.12
ผู้ให้บริการ	13	9.85
รวม	132	100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.52 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.48 อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาอายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.30 อาชีพทำไร่นา คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาคือ ไม่มีอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 22.73 รายได้จากอาชีพหลักโดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.39 รองลงมา รายได้ระหว่าง 2,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.76 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 74.25 ตำแหน่งทางสังคมส่วนใหญ่คือสมาชิกผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 37.12 รองลงมาคืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คิดเป็นร้อยละ 29.54 และสถานภาพผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ คือแกนนำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 53.03 รองลงมาคือผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 37.12

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
ผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ของผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น
โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม (n=132)

ภาพรวมการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการ มีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการ มีส่วนร่วม
ผู้ให้บริการ	2.53	0.85	ปานกลาง	3.59	0.56	มาก
แกนนำชุมชน	3.18	0.76	ปานกลาง	3.77	0.74	มาก
ผู้สูงอายุ	2.52	0.94	ปานกลาง	3.23	1.00	ปานกลาง
รวม	2.87	0.90	ปานกลาง	3.55	0.87	มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้
ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ($\bar{X} = 2.87$) และที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.55$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรายกลุ่ม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่ม
เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก คือ แกนนำชุมชน ($\bar{X} = 3.18$) รองลงมาคือผู้ให้บริการ ($\bar{X} = 2.53$)
และผู้สูงอายุ ($\bar{X} = 2.52$) ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
3 อันดับแรก คือ แกนนำชุมชน ($\bar{X} = 3.77$) รองลงมาคือผู้ให้บริการ ($\bar{X} = 3.59$) และผู้สูงอายุ
($\bar{X} = 3.23$) ตามลำดับ

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น จำแนกตามการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน (n=132)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.93	1.14	ปานกลาง	3.66	0.96	มาก
ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.73	1.11	ปานกลาง	3.51	1.02	มาก
ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.93	0.92	ปานกลาง	3.56	0.89	มาก
ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.31	0.87	ปานกลาง	3.87	0.85	มาก
ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.66	1.06	ปานกลาง	3.37	1.06	ปานกลาง
ภาพรวม	2.87	0.90	ปานกลาง	3.55	0.87	มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ จำแนกตามการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=2.87$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.55$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรายขั้นตอน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก

1. ชั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.31)
2. ชั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 2.93)
3. ชั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 2.93)

และลำดับสุดท้าย คือ ชั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 2.66)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายขั้นตอน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก

1. ชั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.87)
2. ชั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.66)
3. ชั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.56)

และลำดับสุดท้าย คือ ชั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.37)

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้ให้บริการ จำแนกตามการมีส่วน
ร่วม 5 ขั้นตอน (n=13)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
ชั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.73	1.13	ปานกลาง	3.88	0.73	มาก
ชั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.43	0.96	น้อย	3.60	0.66	มาก
ชั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.50	0.87	ปานกลาง	3.39	0.56	ปานกลาง

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.77	0.83	ปานกลาง	4.04	0.66	มาก
ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.38	0.97	น้อย	3.54	0.81	มาก
ภาพรวม	2.53	0.85	ปานกลาง	3.59	0.56	มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ จำแนกตามการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=2.53$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.59$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรายขั้นตอน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก

1. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.77$)
2. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.73$)
3. ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.50$)

และลำดับสุดท้าย คือ ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.38$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายขั้นตอน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก

1. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=4.04$)
2. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.88$)
3. ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.60$)

และลำดับสุดท้าย คือ ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.39$)

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้ให้บริการ ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=13)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
สำรวจข้อมูล และค้นหา ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านก่อนเริ่ม โครงการ	2.62	1.21	ปานกลาง	3.92	0.86	มาก
ค้นหาสาเหตุของปัญหา สุขภาพผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน โดยเข้าร่วมประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นก่อนเริ่ม โครงการ	2.46	1.33	น้อย	3.92	0.76	มาก
สำรวจความต้องการของ ผู้สูงอายุในการส่งเสริม สุขภาพ	3.23	2.08	ปานกลาง	3.85	0.90	มาก
ตัดสินใจกำหนดกิจกรรม การ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามลำดับความต้องการของ ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน	2.62	1.32	ปานกลาง	3.85	0.99	มาก
รวม	2.73	1.13	ปานกลาง	3.88	0.73	มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ ขั้น การริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}= 2.73$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= 3.88$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. สำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ ($\bar{X}= 3.23$)
2. สำรวจข้อมูล และค้นหาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}= 2.62$)
3. ตัดสินใจกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามลำดับความต้องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ($\bar{X}= 2.62$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. ค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน โดยเข้าร่วมประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}= 3.92$)
2. สำรวจข้อมูล และค้นหาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}= 3.92$)
3. สำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ ($\bar{X}= 3.85$)

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้ให้บริการ ช้ันการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=13)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไรบ้าง ทำอย่างไรทำทำไมทำเมื่อไร ใครเป็นผู้ทำและทำที่ไหน	2.62	1.12	ปานกลาง	3.85	0.80	มาก
กำหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.31	1.03	น้อย	3.54	1.05	มาก

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.62	1.04	ปานกลาง	3.85	0.69	มาก
จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์หรืองบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.38	1.26	น้อย	3.31	0.95	ปานกลาง
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในหมู่บ้านและระหว่างหน่วยงานต่างๆ	2.23	1.17	น้อย	3.46	0.97	ปานกลาง
รวม	2.43	0.96	น้อย	3.60	0.66	มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ($\bar{X}=2.43$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.60$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ระดับน้อย เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องมากได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.62$)
2. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไรบ้าง ทำอย่างไรทำไม ทำเมื่อไร ใครเป็นผู้ทำ และทำที่ไหน ($\bar{X}=2.62$)
3. จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์หรืองบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.38$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องมากได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}= 3.85$)
2. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ทำทำไม ทำเมื่อไร ใครเป็นผู้ทำ และทำที่ไหน ($\bar{X}= 3.85$)
3. กำหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}= 3.54$)

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้ให้บริการ ขึ้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=13)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนดูแลผู้สูงอายุ	2.77	1.17	ปานกลาง	3.69	0.86	มาก
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเช่น สถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงกลุ่ม	2.77	0.93	ปานกลาง	3.62	0.87	มาก
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/ชมรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการต่างๆ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการเล่นดนตรีการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ	2.77	1.17	ปานกลาง	3.77	0.72	มาก

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การให้ข้อมูลข่าวสารและ ความรู้ด้านสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้าน ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ใน การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	3.15	1.07	ปานกลาง	3.92	0.76	มาก
การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ ผู้สูงอายุ	3.00	1.35	ปานกลาง	4.00	0.91	มาก
การนิเทศ แนะนำ ติดตาม กำกับงานต่างๆ ให้ดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุที่วางไว้	2.15	1.14	น้อย	3.08	0.76	ปานกลาง
การออกกำลังกาย หรือกำลัง ทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ใน กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	2.38	1.12	น้อย	3.08	0.86	ปานกลาง
การประสานงาน รายงานผล การดำเนินงานและขอ สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานราชการและ องค์การบริหารส่วนตำบล	1.77	1.09	น้อย	2.54	1.20	ปานกลาง

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและประเมินผลงาน เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง	1.77	1.09	น้อย	2.85	1.14	ปานกลาง
รวม	2.50	0.87	ปานกลาง	3.39	0.56	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ ขึ้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=2.50$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.39$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.15$)

2. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.00$)

3. การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย รวมกลุ่ม ($\bar{X}=2.77$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ($\bar{X}=4.00$)

2. การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.92$)

3. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/ชมรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการเล่นดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ($\bar{X}= 3.77$)

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้ให้บริการ ชั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=13)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพียงใด	2.85	0.90	ปานกลาง	4.15	0.80	มาก
ได้รับประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจอันเกิดจากการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพียงใด	2.69	0.95	ปานกลาง	3.92	0.64	มาก
รวม	2.77	0.83	ปานกลาง	4.04	0.66	มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ ชั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}= 2.77$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= 4.04$)

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้ให้บริการ ชั้นประเมินผลการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ (n=13)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ตั้งไว้หรือไม่	2.31	1.18	น้อย	3.62	1.04	มาก
การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.38	1.12	น้อย	3.46	1.13	ปานกลาง
สนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการนี้เพียงใด	3.08	0.86	ปานกลาง	3.77	0.83	มาก
การสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ เพียงใด	1.85	1.07	น้อย	3.15	1.07	ปานกลาง
นำผลการประเมินโครงการ ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานหรือจัดทำโครงการในลักษณะเดียวกันต่อไปหรือไม่	2.31	1.25	น้อย	3.69	0.95	มาก
รวม	2.38	0.97	น้อย	3.54	0.81	มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ ชั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ($\bar{X}=2.38$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.54$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. สนับสนุน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตาม โครงการนี้เพียงใด ($\bar{X}=3.08$)

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.38$)

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ตั้งไว้หรือไม่ ($\bar{X}=2.31$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. สนับสนุน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตาม โครงการนี้เพียงใด ($\bar{X}=3.77$)

2. นำผลการประเมิน โครงการไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานหรือจัดทำโครงการใน ลักษณะเดียวกันต่อไปหรือไม่ ($\bar{X}=3.69$)

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ตั้งไว้หรือไม่ ($\bar{X}=3.62$)

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของแกนนำชุมชน จำแนกตามการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน(n=70)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.33	0.96	ปานกลาง	3.89	0.80	มาก
ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.07	0.96	ปานกลาง	3.78	0.88	มาก
ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.26	0.79	ปานกลาง	3.82	0.76	มาก
ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.16	0.80	ปานกลาง	3.65	0.89	มาก
ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.03	0.90	ปานกลาง	3.62	0.90	มาก
ภาพรวม	3.18	0.76	ปานกลาง	3.77	0.74	มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของแกนนำชุมชน จำแนกตามการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}= 3.18$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= 3.77$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรายขั้นตอน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก

1. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}= 3.33$)
2. ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}= 3.26$)
3. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}= 3.16$)

และลำดับสุดท้าย คือ ชั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.03)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายขั้นตอน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก

1. ชั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.89)
2. ชั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.82)
3. ชั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.78)

และลำดับสุดท้าย คือ ชั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.62)

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของแกนนำชุมชน ชั้น การริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=70)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
สำรวจข้อมูล และค้นหาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านก่อนเริ่มโครงการ	3.44	0.94	ปานกลาง	3.93	0.80	มาก
ค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านโดยเข้าร่วมประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ	3.29	1.13	ปานกลาง	3.96	0.84	มาก
สำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ	3.33	1.10	ปานกลาง	3.93	0.87	มาก
ตัดสินใจกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามลำดับความต้องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน	3.26	1.04	ปานกลาง	3.76	0.94	มาก
รวม	3.33	0.96	ปานกลาง	3.89	0.80	มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของแกนนำชุมชน ชั้น การริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}= 3.33$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= 3.89$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. สํารวจข้อมูล และค้นหาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}= 3.44$)
2. สํารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ ($\bar{X}= 3.33$)
3. ค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน โดยเข้าร่วมประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}= 3.29$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. ค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน โดยเข้าร่วมประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}= 3.96$)
2. สํารวจข้อมูล และค้นหาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}= 3.93$)
3. สํารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ ($\bar{X}= 3.93$)

ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของแกนนำชุมชน ชั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=70)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไรบ้าง ทำอย่างไรทำไมทำเมื่อไรใครเป็นผู้ทำและทำที่ไหน	3.11	1.11	ปานกลาง	3.83	0.92	มาก

ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
กำหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.06	1.03	ปานกลาง	3.79	0.99	มาก
มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.93	1.22	ปานกลาง	3.76	1.14	มาก
จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์หรืองบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.91	1.18	ปานกลาง	3.74	1.09	มาก
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในหมู่บ้านและระหว่างหน่วยงานต่างๆ	3.33	1.00	ปานกลาง	3.81	0.87	มาก
รวม	3.07	0.96	ปานกลาง	3.78	0.88	มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของแกนนำชุมชนชั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}= 3.07$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= 3.78$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในหมู่บ้านและระหว่างหน่วยงานต่างๆ (\bar{X} = 3.33)
2. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ทำทำไม ทำเมื่อไร ใครเป็นผู้ทำ และทำที่ไหน (\bar{X} = 3.11)
3. กำหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.06)
เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก
 1. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ทำทำไม ทำเมื่อไร ใครเป็นผู้ทำ และทำที่ไหน (\bar{X} = 3.83)
 2. ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในหมู่บ้านและระหว่างหน่วยงานต่างๆ (\bar{X} = 3.81)
 3. กำหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.79)

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของแกนนำชุมชน ขึ้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=70)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนดูแลผู้สูงอายุ	3.67	1.16	มาก	4.04	1.00	มาก
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเช่น สถานที่ออกกำลังกาย รวบรวมกลุ่ม	3.31	0.92	ปานกลาง	3.83	0.90	มาก

ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/ ชมรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการ ออกกำลังกาย กิจกรรม สันทนาการต่างๆ การตรวจ สุขภาพ กิจกรรมการเล่น ดนตรีการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ	3.47	0.93	ปานกลาง	3.89	0.86	มาก
การให้ข้อมูลข่าวสารและ ความรู้ ด้านสุขภาพแก่ผู้ สูงอายุครอบครัวและชุมชน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้าน ร่างกายและจิตใจของผู้สูง อายุตลอดจนเสริมสร้าง ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุ	3.46	0.86	ปานกลาง	3.89	0.83	มาก
การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ ผู้สูงอายุ	3.31	0.96	ปานกลาง	3.91	1.00	มาก
การนิเทศ แนะนำ ติดตาม กำกับงานต่างๆ ให้ดำเนิน การตาม โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุที่วางไว้	2.97	1.06	ปานกลาง	3.67	0.91	มาก

ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การออกกำลังกาย หรือกำลัง ทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ใน กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.19	1.12	ปานกลาง	3.80	1.06	มาก
การประสานงาน รายงานผล การดำเนินงานและขอ สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานราชการและ องค์การบริหารส่วนตำบล	3.13	1.20	ปานกลาง	3.77	1.07	มาก
การสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและประเมินผลงาน เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง	2.87	1.12	ปานกลาง	3.56	1.06	มาก
รวม	3.26	0.79	ปานกลาง	3.82	0.76	มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
แกนนำชุมชน ขึ้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ($\bar{X}=3.26$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.82$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. การส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.67$)
2. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/ชมรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการออก
กำลังกายกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการเล่นดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน

กลุ่มอาชีพต่างๆ (\bar{X} = 3.47)

3. การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.46)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. การส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 4.04)

2. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.91)

3. การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.89)

ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของแกนนำชุมชน ชั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=70)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพียงใด	3.07	0.95	ปานกลาง	3.59	1.06	มาก
ได้รับประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจอันเกิดจากการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพียงใด	3.24	0.86	ปานกลาง	3.71	0.85	มาก
รวม	3.16	0.80	ปานกลาง	3.65	0.89	มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ แก่นนำชุมชน ขึ้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}= 3.16$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= 3.65$)

ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของแก่นนำชุมชน ขึ้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=70)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ตั้งไว้หรือไม่	2.94	1.02	ปานกลาง	3.66	0.98	มาก
การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.13	1.24	ปานกลาง	3.69	0.92	มาก
สนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการนี้เพียงใด	3.44	1.03	ปานกลาง	3.86	0.92	มาก
การสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ เพียงใด	2.83	0.99	ปานกลาง	3.44	0.99	ปานกลาง

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
นำผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานหรือจัดทำโครงการในลักษณะเดียวกันต่อไปหรือไม่	2.80	1.10	ปานกลาง	3.46	1.10	ปานกลาง
รวม	3.03	0.90	ปานกลาง	3.62	0.90	มาก

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของแกนนำชุมชน ชั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.03$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.62$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. สนับสนุน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการนี้เพียงใด ($\bar{X}=3.44$)

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.13$)

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ตั้งไว้หรือไม่ ($\bar{X}=2.94$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. สนับสนุน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการนี้เพียงใด ($\bar{X}=3.86$)

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.69$)

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ตั้งไว้หรือไม่ ($\bar{X}=3.66$)

ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้สูงอายุ จำแนกตามการมีส่วนร่วม 5
ขั้นตอน (n=49)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.42	1.18	น้อย	3.26	1.09	ปานกลาง
ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.33	1.19	น้อย	3.10	1.16	ปานกลาง
ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.57	0.94	ปานกลาง	3.24	1.01	ปานกลาง
ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.66	0.86	มาก	4.14	0.76	มาก
ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.22	1.11	น้อย	2.98	1.23	ปานกลาง
ภาพรวม	2.52	0.94	ปานกลาง	3.23	1.00	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ จำแนกตามการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=2.52$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.23$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรายขั้นตอน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก

1. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.66$)
2. ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.57$)
3. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.42$)

และลำดับสุดท้าย คือ ชั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 2.22)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายขั้นตอน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก

1. ชั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 4.14)
2. ชั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.26)
3. ชั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 3.24)

และลำดับสุดท้าย คือ ชั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (\bar{X} = 2.98)

ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้สูงอายุ ชั้น การริเริ่มกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=49)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
สำรวจข้อมูล และค้นหาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านก่อนเริ่มโครงการ	2.33	1.36	น้อย	3.27	1.17	ปานกลาง
ค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านโดยเข้าร่วมประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ	2.43	1.29	น้อย	3.22	1.16	ปานกลาง
สำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ	2.33	1.21	น้อย	3.20	1.14	ปานกลาง
ตัดสินใจกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามลำดับความต้องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน	2.61	1.32	ปานกลาง	3.35	1.16	ปานกลาง
รวม	2.42	1.18	น้อย	3.26	1.09	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ ชั้น การริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ($\bar{X}=2.42$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.26$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. ตัดสินใจกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามลำดับความต้องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ($\bar{X}=2.61$)

2. ค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน โดยเข้าร่วมประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}=2.43$)

3. สำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ ($\bar{X}=2.33$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. ตัดสินใจกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามลำดับความต้องการของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ($\bar{X}=3.35$)

2. สำรวจข้อมูล และค้นหาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้านก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}=3.27$)

3. ค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน โดยเข้าร่วมประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ ($\bar{X}=3.22$)

ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้สูงอายุ ชั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=49)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไบ้าง ทำอย่างไรทำทำไมทำเมื่อไรใครเป็นผู้ทำและทำที่ไหน	2.45	1.31	น้อย	3.27	1.32	ปานกลาง

ตารางที่ 4.18 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
กำหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.33	1.28	น้อย	3.08	1.20	ปานกลาง
มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.22	1.34	น้อย	3.04	1.24	ปานกลาง
จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์หรืองบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.22	1.33	น้อย	3.00	1.24	ปานกลาง
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในหมู่บ้านและระหว่างหน่วยงานต่างๆ	2.45	1.28	น้อย	3.12	1.30	ปานกลาง
รวม	2.33	1.19	น้อย	3.10	1.16	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ($\bar{X}=2.33$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.10$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในหมู่บ้านและระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ($\bar{X} = 2.45$)

2. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ทำทำไม ทำเมื่อไร ใครเป็นผู้ทำ และทำที่ไหน ($\bar{X} = 2.45$)

3. กำหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X} = 2.33$)
เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กำหนดขั้นตอนทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ทำทำไม ทำเมื่อไร ใครเป็นผู้ทำ และทำที่ไหน ($\bar{X} = 3.27$)

2. ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในหมู่บ้านและระหว่างหน่วยงานต่างๆ ($\bar{X} = 3.12$)

3. กำหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X} = 3.08$)

ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้สูงอายุ ขึ้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=49)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การส่งเสริมให้ครอบครัว และชุมชนดูแลผู้สูงอายุ	3.06	1.09	ปานกลาง	3.61	0.98	มาก
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเช่น สถานที่ออกกำลังกาย รวมกลุ่ม	2.76	1.07	ปานกลาง	3.52	1.29	มาก
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/ชมรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย สันทนาการ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการเล่นดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ	3.12	1.07	ปานกลาง	3.63	1.09	มาก

ตารางที่ 4.19 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุตลอดจนเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	2.67	1.23	ปานกลาง	3.33	1.18	ปานกลาง
การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	2.67	1.23	ปานกลาง	3.27	1.17	ปานกลาง
การนิเทศ แนะนำ ติดตาม กำกับงานต่างๆ ให้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่วางไว้	2.00	1.17	น้อย	2.84	1.25	ปานกลาง
การออกกำลังกาย หรือกำลังทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.71	1.04	ปานกลาง	3.35	1.09	ปานกลาง
การประสานงาน รายงานผลการดำเนินงานและขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและองค์การบริหารส่วนตำบล	2.22	1.30	น้อย	2.88	1.44	ปานกลาง

ตารางที่ 4.19 (ต่อ)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประเมินผลงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง	1.88	1.17	น้อย	2.69	1.34	ปานกลาง
รวม	2.57	0.94	ปานกลาง	3.24	1.01	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ ขึ้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=2.57$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.24$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/ชมรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการต่างๆ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการเล่นดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ($\bar{X}=3.12$)

2. การส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.06$)

3. การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย รวมกลุ่ม ($\bar{X}=2.76$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/ชมรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการเล่นดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ($\bar{X}=3.63$)

2. การส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.61$)

3. การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย รวมกลุ่ม ($\bar{X}=3.52$)

ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้สูงอายุ ชั้นรับผลประโยชน์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n=49)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก การดำเนินโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุเพียงใด	3.67	0.90	มาก	4.14	0.79	มาก
ได้รับประโยชน์ทั้งด้านวัตถุ และ จิตใจอันเกิดจากการ ดำเนินโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุเพียงใด	3.65	0.88	มาก	4.14	0.76	มาก
รวม	3.66	0.86	มาก	4.14	0.76	มาก

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
ผู้สูงอายุ ชั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ($\bar{X}= 3.66$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= 4.14$)

ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ของผู้สูงอายุ ชั้นประเมินผลการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ (n=49)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน			ที่ควรจะเป็น		
	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม	\bar{X}	S.D.	ระดับการมีส่วนร่วม
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ตั้งไว้หรือไม่	2.02	1.25	น้อย	2.90	1.42	ปานกลาง
การประเมินความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.24	1.33	น้อย	3.06	1.34	ปานกลาง
สนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการนี้เพียงใด	2.86	1.16	ปานกลาง	3.39	1.15	ปานกลาง
การสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ เพียงใด	2.08	1.26	น้อย	2.94	1.62	ปานกลาง
นำผลการประเมินโครงการ ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานหรือจัดทำโครงการในลักษณะเดียวกันต่อไปหรือไม่	1.90	1.18	น้อย	2.59	1.35	ปานกลาง
รวม	2.22	1.11	น้อย	2.97	1.23	ปานกลาง

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ ขึ้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ($\bar{X}=2.22$) และที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=2.97$)

เมื่อพิจารณาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. สนับสนุน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตาม โครงการนี้เพียงใด ($\bar{X}=2.86$)
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=2.24$)
3. การสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ เพียงใด ($\bar{X}=2.08$)

เมื่อพิจารณาที่ควรจะเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก

1. สนับสนุน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตาม โครงการนี้เพียงใด ($\bar{X}=3.39$)
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ($\bar{X}=3.06$)
3. การสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ เพียงใด ($\bar{X}=2.94$)

**ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น**

ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ในภาพรวม
ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน (n=132)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		ที่ควรจะเป็น		t	P
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.93	1.14	3.66	0.96	-10.59**	.00
2. ขั้นการวางแผนส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	2.73	1.11	3.51	1.02	-11.02**	.00
3. ขั้นดำเนินการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	2.93	0.92	3.56	0.89	-10.05**	.00
4. ขั้นรับผลประโยชน์ใน การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.31	0.87	3.87	0.85	-7.15**	.00
5. ขั้นประเมินผลการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.66	1.06	3.37	1.06	-10.25**	.00
รวม	2.87	0.90	3.55	0.87	-11.49**	.00

** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ในภาพรวมและตามขั้นตอนการมีส่วน
ร่วม 5 ขั้นตอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน (n=13)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		ที่ควรจะเป็น		t	P
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.73	1.13	3.88	0.73	-4.26**	.00
2. ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.43	0.96	3.60	0.66	-4.32**	.00
3. ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.50	0.87	3.39	0.56	-4.85**	.00
4. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.77	0.83	4.04	0.66	-4.35**	.00
5. ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.38	0.97	3.54	0.81	-5.43**	.00
รวม	2.53	0.85	3.59	0.56	-5.59**	.00

** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ให้บริการ ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ในภาพรวมและตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของแกนนำชุมชน ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน (n=70)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		ที่ควรจะเป็น		t	P
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. ขั้นตอนการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.33	0.96	3.89	0.80	-6.19**	.00
2. ขั้นตอนการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.07	0.96	3.78	0.88	-8.29**	.00
3. ขั้นตอนดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.26	0.79	3.82	0.76	-6.90**	.00
4. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.16	0.80	3.65	0.89	-5.15**	.00
5. ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.03	0.90	3.62	0.90	-7.20**	.00
รวม	3.18	0.76	3.77	0.74	-7.90**	.00

** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของแกนนำชุมชน ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ในภาพรวมและตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ ระหว่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน (n=49)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		ที่ควรจะเป็น		t	P
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.42	1.18	3.26	1.09	-8.23**	.00
2. ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.33	1.19	3.10	1.16	-6.13**	.00
3. ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.57	0.94	3.24	1.01	-5.92**	.00
4. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	3.66	0.86	4.14	0.76	-3.55**	.00
5. ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.22	1.11	2.98	1.23	-5.86**	.00
รวม	2.52	0.94	3.23	1.00	-6.81**	.00

** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็น ในภาพรวมและตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

**ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุระหว่างผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ**

ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ ตามที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน (n=132)

ขั้นตอนการมีส่วน ร่วม	แกนนำชุมชน (n=70)		ผู้สูงอายุ (n=49)		ผู้ให้บริการ (n=13)		F	P	คู่ที่ แตก ต่างกัน
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.			
1. ขั้นการริเริ่ม									
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.33	0.96	2.42	1.18	2.73	1.13	10.68**	.00	1&2
2. ขั้นการวางแผน									
ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.07	0.96	2.33	1.19	2.43	0.96	7.56**	.00	1&2
3. ขั้นดำเนินการ									
ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.26	0.79	2.57	0.94	2.50	0.87	11.31**	.00	1&2 และ 1&3
4. ขั้นรับผล									
ประโยชน์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.16	0.80	3.66	0.86	2.77	0.83	8.44**	.00	1&2 และ 2&3
5. ขั้นประเมินผล									
การส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	3.03	0.90	2.22	1.11	2.38	0.97	10.19**	.00	1&2
รวม	3.18	0.76	2.52	0.94	2.53	0.85	10.16**	.00	

ตารางที่ 4.26 (ต่อ)

แหล่งความแปรปรวน	d.f.	Sum of Squares	Mean of Squares	F
ระหว่างกลุ่ม	2	14.40	7.20	10.16**
ภายในกลุ่ม	129	91.48	0.71	
รวม	131	105.88		

** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.26 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า โดยภาพรวมและ แต่ละขั้นตอนการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe' test) ต่อไป พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันหลายคู่แยกตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้

1. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 1 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ โดยแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ
2. ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 1 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ โดยแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ
3. ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 2 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ และ แกนนำชุมชน กับผู้ให้บริการ โดยแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ และผู้ให้บริการ
4. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 2 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ กับผู้ให้บริการ โดยผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าแกนนำชุมชน และผู้ให้บริการ
5. ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 1 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ โดยแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ

ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ ตามที่ควรจะเป็น (n=132)

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม	แกนนำชุมชน (n=70)		ผู้สูงอายุ (n=49)		ผู้ให้บริการ (n=13)		F	P	คู่ที่ แตกต่างกัน
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.			
1. ขั้นการริเริ่ม กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.89	0.80	3.26	1.09	3.88	0.73	7.33**	.00	1&2
2. ขั้นการวางแผน ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.78	0.88	3.10	1.16	3.60	0.66	7.08**	.00	1&2
3. ขั้นดำเนินการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.82	0.76	3.24	1.01	3.39	0.56	7.02**	.00	1&2
4. ขั้นรับผล ประโยชน์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	3.65	0.89	4.14	0.76	4.04	0.66	5.40**	.00	1&2
5. ขั้นประเมินผล การส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	3.62	0.90	2.98	1.23	3.54	0.81	5.86**	.00	1&2
รวม	3.77	0.74	3.23	1.00	3.59	0.56	5.97**	.00	

ตารางที่ 4.27 (ต่อ)

แหล่งความแปรปรวน	d.f.	Sum of Squares	Mean of Squares	F
ระหว่างกลุ่ม	2	8.32	4.16	5.97**
ภายในกลุ่ม	129	89.94	0.70	
รวม	131	98.26		

** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.27 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ ตามที่ควรจะเป็น พบว่า โดยภาพรวมและ แต่ละขั้นตอนการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Scheffe' test) ต่อไป พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน แยกตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้

1. ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 1 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ โดยแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ
2. ขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 1 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ โดยแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ
3. ขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 1 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ โดยแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ
4. ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 1 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าแกนนำชุมชน
5. ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 1 คู่คือ แกนนำชุมชน กับผู้สูงอายุ โดยแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุ

ตอนที่ 5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมที่ควรจะเป็น จากคำถามปลายเปิด ซึ่งมีจำนวนผู้ตอบ 54 คน ($n=132$ คน) คิดเป็นร้อยละ 40.91 และการสนทนากลุ่ม โดยนำเสนอข้อมูลภาพรวมของแต่ละกลุ่มและแยกตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ดังนี้

โดยภาพรวม กลุ่มผู้ให้บริการคาดหวังให้ระดับการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.59$) ยกเว้นขั้นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.39$) และจากการสนทนากลุ่ม ผู้ให้บริการคาดหวังให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกขั้นตอน เนื่องจากสภาพปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการยังเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคาดหวังให้แกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

กลุ่มแกนนำชุมชนคาดหวังให้ระดับการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.77$) และจากการสนทนากลุ่ม แกนนำชุมชนคาดหวังให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพทุกขั้นตอน โดยแสดงความคิดเห็นว่าแกนนำชุมชนควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมและเป็นผู้วางแผนกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

กลุ่มผู้สูงอายุคาดหวังให้ระดับการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.59$) ยกเว้นขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.14$) และจากการสนทนากลุ่ม ผู้สูงอายุคาดหวังให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วางแผนส่งเสริมสุขภาพและประเมินการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น และคาดหวังให้แกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังคาดหวังให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและได้รับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น

โดยภาพรวมแยกตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นการริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นว่าควรมีการสำรวจข้อมูลและคืนข้อมูลให้ชุมชนร้อยละ 59.26 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ เห็นภาพรวมจากการเชื่อมโยงปัญหาต่างๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้ขั้นตอนต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองลงมาคือสร้างหรือจัดกิจกรรมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ร้อยละ 25.93

ในขั้นการวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอความคิดเห็นว่า ควรให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผน ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือควรเลือกกิจกรรมที่ทำได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ไม่ซับซ้อน ร้อยละ 25.93

สำหรับขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพ เสนอความคิดเห็นว่า ทั้งชุมชนและแกนนำชุมชนควรมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่องร้อยละ 75.93 รองลงมาคือการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ ร้อยละ 29.63

ขั้นรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอความคิดเห็นว่า ทุกคนควรมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น มีผลดี ผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล / อบต. ควรสนับสนุนผู้สูงอายุให้ดียิ่งๆ ขึ้น ร้อยละ 14.82

ขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 42.60 รองลงมาคือควรเป็นการประเมินแบบที่ชุมชนเข้าใจง่าย ร้อยละ 37.04

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ทำให้ได้แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของชุมชนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ดังนี้

1. ต้องเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อวางแผนรองรับตามความคาดหวังของผู้รับบริการ เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นการริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ถึงขั้นประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3. ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ แกนนำชุมชน และผู้สูงอายุ เกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ทุกกลุ่มมีความคาดหวังเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของการมีส่วนร่วม เช่น ผู้ให้บริการคาดหวังให้แกนนำชุมชนและผู้สูงอายุมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นทุกขั้นตอนและผู้ให้บริการควรมีส่วนร่วมในขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในระดับปานกลาง แต่ในขณะเดียวกัน แกนนำชุมชนและผู้สูงอายุคาดหวัง ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมมากในขั้นตอนการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
4. ต้องมีการติดตามประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง