

เรือเอกหญิง สิริกานต์ กาญจนเพ็ญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของสตรี  
 ในระยะหลังคลอด.( FACTORS ASSOCIATED WITH SEXUAL RELATIONSHIP OF  
 POSTPARTUM MOTHERS )อ.ที่ปรึกษา : ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล,อ.ที่ปรึกษาร่วม:  
 อ.วินัส อุดมประเสริฐกุล 156 หน้า. ISBN 974- 17- 4811- 6

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอดเริ่มช้าหรือเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพ  
 ความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของคู่สามีและภรรยา โดยทั่วไปสตรี  
 หลังคลอดจะได้รับคำแนะนำให้งดมีเพศสัมพันธ์ในระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด เพื่อป้องกันการ  
 ติดเชื้อและการฉีกขาดของแผลฝีเย็บ แต่มีสตรีหลังคลอดจำนวนหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์แล้วในระยะ  
 ดังกล่าว ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์  
 ของสตรีในระยะหลังคลอด โดยทำการศึกษาสตรีในระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด จำนวน 235 ราย  
 ที่มารับบริการตรวจหลังคลอด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย  
 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง นำข้อมูลที่ได้มาแจกแจงความถี่ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ  
 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติทดสอบ chi - square

#### ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด อย่างมี  
 นัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุของสตรีหลังคลอด รายได้ของครอบครัว ระยะเวลาที่น้ำคาวปลาหมด  
 การคุมกำเนิด การเลี้ยงบุตรด้วยนม ความต้องการทางเพศของสามีและสตรีหลังคลอด และทัศนคติ  
 ต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด
2. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด ได้แก่ อายุ  
 ของสามีสตรีหลังคลอด จำนวนบุตรที่มีชีวิต ระยะเวลาการสมรส แบบแผนความเชื่อ ระดับ  
 การศึกษา ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด วิธีการคลอด การตัดและเย็บฝีเย็บ

The first sexual relationship during the first 6 weeks postpartum can occur sooner or later depending on physical fitness, mental stability and societal customs of the couple. It is generally recommended that postpartum mothers should avoid sexual relationship during puerperium in order to prevent complications such as pelvic infection and laceration of episiotomy wound. However there are considerable number of couples who have sexual relationship during this period. The purpose of this research was to study factor associated with sexual relationship of postpartum mothers . The sample was composed of 235 mothers, during 6 weeks postpartum follow up, at Somdejprapinklao Hospital. The data was collected by using the structured interview method. Analysis of data was facilitated by frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation and chi – square test

The results show that

1. Many factors associated with sexual relationship during puerperium were woman's age, family income, the time of disappearance of lochia, feeding, husband's sex desire, contraceptive practice and attitude to sexual relationship.
2. The other factors that did not related to sexual relationship were husband's age, living child, length of marriage, education levels, knowledge about sexual relationship, method of delivery and episiotomy.