

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่
ได้รับยาต้านไวรัส

ผู้วิจัย : นางพทุษวรรณ ศิวเวทฬิกุล

สถานที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร. ประนอม โธทกานนท

กรรมการที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรจา สันตยากร
: รองศาสตราจารย์ ดร. สัราญ มีแจ้ง

ประเภทสารนิพนธ์ : วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสถานพยาบาล กลุ่มตัวอย่างจำนวน 110 ราย ได้จากการสุ่มอย่างง่ายตามโควต้า เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในโครงการNAPHA มากกว่า 6 เดือน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง สร้างตามแนวคิดการดูแลตนเองเมื่อมีภาวะเป็ียงเบนสุขภาพของโอเริม ผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาและมีค่าความเที่ยงหลังใช้เท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติค่าที (t-test) สถิติค่าเอฟ (F-test) และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยเชฟเฟ (Scheffe')

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส มีพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งในภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน อยู่ในระดับ "ดี" (ภาพรวมมี $\bar{X} = 4.07$, S.D. = 0.33)
2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสระยะเวลา 25-36 เดือน มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง ($\bar{X} = 4.21$, S.D. = 0.41) ดีกว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสระยะเวลา 13-24 เดือน ($\bar{X} = 3.93$, S.D. = 0.34) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับภูมิคุ้มกัน (เฉลี่ย 6 เดือน) มากกว่า 50 เซลล์/ไมโครลิตร มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่า ($\bar{X} = 4.14$, S.D. = 0.31) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับภูมิคุ้มกัน (เฉลี่ย 6 เดือน) น้อยกว่า 50 เซลล์/ไมโครลิตร ($\bar{X} = 3.99$, S.D. = 0.31) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title : SELF – CARE BEHAVIORS OF HIV/AIDS PATIENTS WITH
HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY

Author : Mrs. Puttawan Siwavejtipikul

Major Adviser : Prof. Dr. Pranom Othaganont

Adviser : Assist. Prof. Dr. Chanjar Suntayakorn
: Assoc. Prof. Dr. Somran Meejang

Type of Degree : Master of Nursing Science Degree in Community Nurse
Practitioner (M.N.S. in Community Nurse Practitioner)
Naresuan University, 2007

Abstract

The purpose of this study were to study and compare the level of self – care behavior of HIV/AIDS as classified by their personal factors and health care institute factors. The sample were 110 HIV/AIDS patients with highly active antiretroviral therapy drawn from 9 hospitals by quota and simple random sampling techniques.

A questionnaire was developed based on Orem's health deviation self – care theory. The data were analyzed by t – test , F – test and Post Hoc comparison (Scheffe') The findings were as follows;

1. Self – care behaviors of HIV/AIDS patients with highly active antiretroviral therapy, both in total and in each aspect, were in the level " good " (total $\bar{X} = 4.07$, S.D. = 0.33)

2. HIV/AIDS patients who had highly active antiretroviral therapy for 25 – 36 months had significantly self – care behavior scores higher than those who had HAART for 13 – 24 months at .05 level.

3. HIV/AIDS patients with highly active antiretroviral therapy who had CD₄ level changed more than 50 cell/mm³ had significantly self – care behaviors scores higher than those who had CD₄ level changed less than 50 cell/mm³ at .05 level.