

บทที่ 3

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

3.1 วัสดุในการทดลอง

พันธุ์ข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่รวบรวมจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวนทั้งหมด 31 พันธุ์ และพันธุ์ข้าวเปรียบเทียบ 2 พันธุ์ (ตาราง 3.1)

ตาราง 3.1 แสดงสายพันธุ์ข้าวเหนียวก่ำทั้ง 31 พันธุ์ และพันธุ์เปรียบเทียบ 2 พันธุ์

| Varieties                         |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ก่ำเวียงสา (Kum wiengsa)       | 18. ก่ำ 5153 (Kum 5153)               |
| 2. ก่ำคอยมูเซอ (Kum doi moosoeur) | 19. ก่ำ 88061 (Kum 88061)             |
| 3. กำน่าน (Kum nan)               | 20. ก่ำ 87046 (Kum 87046)             |
| 4. ก่ำคอยสะเก็ด (Kum doi saket)   | 21. ก่ำสุพรรณ (Kum Supan)             |
| 5. กำนา (Kum na)                  | 22. ก่ำเวียดนาม (Kum Vietnam)         |
| 6. ก่ำพะเยา (Kum phayao)          | 23. ก่ำหกลำ (Kum Hoksalee)            |
| 7. ก่ำฝาง (Kum Fang)              | 24. ก่ำS0901 (S0901)                  |
| 8. ก่ำ 19959 (Kum 19959)          | 25. ก่ำS0902 (S0902)                  |
| 9. ก่ำ 19104 (Kum 19104)          | 26. ก่ำS0903 (S0903)                  |
| 10. ก่ำ 99151 (Kum 99151)         | 27. ก่ำS0904 (S0904)                  |
| 11. ก่ำ 7677 (Kum 7677)           | 28. ก่ำS0905 (S0905)                  |
| 12. ก่ำ 89038 (Kum 89038)         | 29. ก่ำS0906 (S0906)                  |
| 13. ก่ำ 87090 (Kum 87090)         | 30. ก่ำS0907 (S090)                   |
| 14. ก่ำ 89057 (Kum 89057)         | 31. ก่ำS090ค (S090ค)                  |
| 15. ก่ำ 87061 (Kum 87061)         | 32. ข้าวดอกมะลิ 105 (KDML105 ; Check) |
| 16. ก่ำ 88083 (Kum 88083)         | 33. กข 6 (RD6 ; Check)                |
| 17. ก่ำ 88069 (Kum 88069)         |                                       |

### สถานที่ทดลอง

งานวิจัยนี้ทำที่แปลงทดลอง สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แปลงวิจัยพืชไร่ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552-2553

### การวางแผนการทดลอง

ทำการปลูกข้าวเหนียวดำแต่ละพันธุ์จำนวน 31 พันธุ์ โดยมีข้าวขาวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ โดยเริ่มปลูกเมื่อเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 ปลูกดำกอละ 2-3 ต้น ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร ในการดูแลรักษาแปลงทดลองนั้น ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 หลังอายุข้าวประมาณ 30 วัน ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อต้นข้าวอายุได้ 55 วัน หลังปลูกดำ

การทดลองนี้ได้ดำเนินการทดลอง ที่แปลงทดลองสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลรักษา กำจัดวัชพืช ป้องกันโรค และแมลงตามความเหมาะสม

### 3.1 จำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา

จำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา ตามมาตรฐานสีต้นข้าว ตามแบบบันทึก descriptors for rice ของ IBPGR-IRRI (1980) โดยบันทึกลักษณะดังนี้

1. ระยะแตกกอ 6 ลักษณะ คือ ได้แก่ สีแผ่นใบ (leaf blade) สีกาบใบ (leaf sheath) สีเขี้ยว ก้านแมลง (auricle) สีเยื่อเกี่ยวพัน (ligule) สีข้อ (node) และสีปล้อง (internode)
2. ระยะออกรวง 3 ลักษณะ คือ สีเกสรตัวเมีย (stigma) สีปลายยอดดอก (apiculus) และสีกลีบรองดอก (inner glumes)
3. ระยะเก็บเกี่ยว 3 ลักษณะ คือ สีเปลือกเมล็ด (husk) สีเยื่อหุ้มเมล็ด (pericarp) และการปรากฏของหาง (present of awn)
4. หาปริมาณของสารแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวเหนียวดำกล้อง
5. หาความแตกต่างของการสะสมแอนโทไซยานินใน รูปของ ไชยานิน 3-กลูโคไซด์
6. หาความแตกต่างของปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด
7. หาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

8. หาความสัมพันธ์ของปริมาณสารแอนโทไซยานิน สารไซยานิดิน 3-กลูโคไซด์ สารฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

### 3.2 การทดลองศึกษาความแตกต่างของการสะสมสารโปรแอนโทไซยานิน (Proanthocyanin)

หาปริมาณสารโปรแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวเหนียวกำลังของแต่ละสายพันธุ์ ตามวิธีของ Abdel-Aal *et al.*, (1998)

เก็บตัวอย่างเมล็ดทุกต้นแล้วทำการสับตัวอย่างเมล็ดในแต่ละพันธุ์จากนำไปสกัดโปรแอนโทไซยานิน โดยบดเมล็ดข้าวเหนียวกำลัง และชั่งข้าวที่บดจำนวน 3 กรัม ใส่ใน centrifuge tube ขนาดความจุ 50 มิลลิลิตร เติมน้ำ acidified ethanol (ethanol และ HCl 1 N 85:15 v/v ) ปริมาตร 25 มิลลิลิตร แล้วนำไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสาร เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้น ปรับ pH ให้เป็น 1 โดย 4 N HCl แล้วเขย่าต่ออีก 15 นาที หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 27,200 g เป็นเวลา 15 นาที นำสารสกัดที่ได้ไปในขวดปรับปริมาตร ปรับปริมาตรด้วยสาร acidified ethanol ให้มีปริมาตร เป็น 50 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปวัดด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยอ่านค่า absorbance ที่ความยาวคลื่นแสง 535 นาโนเมตร และทำกราฟมาตรฐานของสารไซยานิดิน 3-กลูโคไซด์ ความเข้มข้น 0-48 ไมโครกรัม ในสาร ethanol 3 มิลลิลิตร นำไปวัดค่า absorbance ที่ความยาวคลื่นแสง 535 นาโนเมตร แล้วนำไปคำนวณหาปริมาณสารโปรแอนโทไซยานินตามสมการดังนี้

$$C = (A/B \times (\text{vol}/1,000)) \times \text{MW} \times (1/\text{sample wt}) \times 10^6$$

$$C = (A/25,965) \times (50/1,000) \times 449 \times (1/3) \times 10^6$$

$$C = A \times 288.21 \text{ mg/kg}$$

เมื่อ  $C$  = concentration of total anthocyanin (mg/kg)

$B$  = molar absorptivity (Cyanidin 3-glucoside =  $25,965 \text{ cm}^{-1} \text{ M}^{-1}$ )

$\text{Vol}$  = total volume of anthocyanin extract

$\text{MW}$  = molecular weight of cyanidin 3-glucoside = 449

### 3.3 ความแตกต่างของการสะสมสารไซยานิดิน 3-กลูโคไซด์

วิธีการวิเคราะห์ไซยานิดิน 3-กลูโคไซด์

เก็บตัวอย่างเมล็ดข้าวทุกต้นแล้ว ทำการสุมตัวอย่างเมล็ดในแต่ละพันธุ์จากนำไปสกัดไซยานิดิน 3-กลูโคไซด์ ในส่วนของเมล็ด โดยวิธีของ (Ryu *et al.*, 1998) นำตัวอย่างของข้าวเหนียวก่ำ จำนวน 1 กรัม มาสกัดในสารสกัด 0.5%TFA- 95%EtOH ปริมาตร 20 มิลลิลิตร จากนั้นนำเข้าเครื่องเขย่าเป็นเวลา 9 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) ตัวอย่างที่สกัดได้นำมากรองเอากากเบื้องต้นโดยใช้กระดาษกรองเบอร์ 4 จากนั้นกรองซ้ำอีกครั้งโดยใช้ C<sub>18</sub> cartridge (กรองสารสกัดเก็บไว้ประมาณ 10 มิลลิลิตร) นำสารสกัดที่กรองเสร็จไปวิเคราะห์ในเครื่อง HPLC เพื่อวัดปริมาณไซยานิดิน โดยใช้ Allure C<sub>18</sub> คอลัมน์ ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ที่ mobile phase A คือ 0.1%TFA-H<sub>2</sub>O และ mobile phase B คือ 0.1%TFA-MeOH เปลี่ยน mobile phase A ไปเป็น B โดยใช้สมการเส้นตรงจาก 0.1%TFA-H<sub>2</sub>O ไปเป็น 0.1%TFA-MeOH ใช้เวลา 30 นาที ที่อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตร/นาที จากนั้นนำไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบไซยานิดินมาตรฐานต่อไป

### 3.4 ความแตกต่างของการสะสมสารฟีนอลิกทั้งหมด

วิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ตามวิธีของ Folin and Ciocalteu, 1927

เก็บตัวอย่างเมล็ดทุกต้นแล้วทำการสุมตัวอย่างเมล็ดข้าวเหนียวก่ำแต่ละพันธุ์ จากนั้นไปสกัดโดยทำการเจือจางสารสกัด นำตัวอย่างของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง 1 กรัม มาสกัดในสารสกัด เอทานอล 85%- HCl ปริมาตร 25 มิลลิลิตร จากนั้น ให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย Folin Ciocalteu reagent ปริมาตร 1 มิลลิลิตร (เจือจางอัตราส่วน 1:1 ระหว่างสารละลายและน้ำกลั่น) ร่วมกับ 10% Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 1 มิลลิลิตร และน้ำกลั่น 1 มิลลิลิตร จากนั้นบ่มทิ้งไว้ในที่มืด อุณหภูมิห้อง นาน 1 ชั่วโมง วัดปฏิกิริยาด้วยการวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 760 นาโนเมตร หลังจากนั้นนำค่าที่ได้จากน้ำกลั่น และสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิกความเข้มข้นต่างๆ มาทำกราฟมาตรฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากการสกัด และคำนวณความเข้มข้นของสารสกัดในรูปของมิลลิกรัมของกรดแกลลิกสมมูลต่อ 100 กรัม

### 3.5 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH radical scavenging activity)

วิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ตามวิธีของ Brand-William *et al.*, 1995

เตรียมสารละลายของ DPPH ที่ความเข้มข้น 0.08 มิลลิโมล ในสารละลายเอทานอล 100% หลังจากนั้นผสมสารละลาย DPPH, tris buffer solution และ 80% เอทานอล ในอัตราส่วน 1: 1: 1



เพื่อให้ได้สารผสมปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติมสารสกัดจากตัวอย่างปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร (ในกรณีของสารมาตรฐานให้เติมสารมาตรฐานความเข้มข้นต่างๆ ลงไปแทนสารสกัดจากตัวอย่าง โดยใช้ Trolox เป็นสารมาตรฐาน) ปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 2.4 มิลลิลิตร บ่มปฏิกิริยาไว้นาน 30 นาที ในที่มีตัววัดปฏิกิริยาโดยวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 525 นาโนเมตร หน่วยวัดมีค่าเท่ากับ ไมโครโมลาร์ Trolox ต่อกรัมตัวอย่าง ( $\mu\text{M TE/g sample}$ )