







ภาพผนวกที่ 5 การทดสอบโรคโดยวิธีการตัดใบครั้งที่ 1 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS27 ที่ 14 วันหลังปลูกเชื้อ



ภาพผนวกที่ 6 การทดสอบโรคโดยวิธีการตัดใบครั้งที่ 1 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS140 ที่ 14 วันหลังปลูกเชื้อ



ภาพผนวกที่ 7 การทดสอบโรคโดยวิธีการตัดใบครั้งที่ 1 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS145 ที่ 14 วันหลังปลูกเชื้อ




ภาพผนวกที่ 8 การทดสอบโรคโดยวิธีการตัดใบครั้งที่ 1 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS160 ที่ 14 วันหลังปลูกเชื้อ




ภาพผนวกที่ 9 การทดสอบโรคโดยวิธีการตัดใบครั้งที่ 2 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS27 ที่ 7 วันหลังปลูกเชื้อ




ภาพผนวกที่ 10 การทดสอบโรคโดยวิธีการตัดใบครั้งที่ 2 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS140 ที่ 7 วันหลังปลูกเชื้อ




ภาพผนวกที่ 11 การทดสอบโรคโดยวิธีการตัดใบครั้งที่ 2 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS145 ที่ 7 วันหลังปลูกเชื้อ




ภาพผนวกที่ 12 การทดสอบโรคโดยวิธีการตัดใบครั้งที่ 2 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS160 ที่ 7 วันหลังปลูกเชื้อ




ภาพผนวกที่ 13 การทดสอบโรคโดยวิธีการราดใบครั้งที่ 2 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS27 ที่ 18 วันหลังปลูกเชื้อ



ภาพผนวกที่ 14 การทดสอบโรคโดยวิธีการราดใบครั้งที่ 2 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS140 ที่ 18 วันหลังปลูกเชื้อ



ภาพผนวกที่ 15 การทดสอบโรคโดยวิธีการราดใบครั้งที่ 2 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS145 ที่ 18 วันหลังปลูกเชื้อ



ภาพผนวกที่ 16 การทดสอบโรคโดยวิธีการราดใบครั้งที่ 2 ด้วยเชื้อ *R. solanacearum* สายพันธุ์ RS160 ที่ 18 วันหลังปลูกเชื้อ