

172669

นฤมล ภาณุเดชะ: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (RELATIONSHIPS AMONG
SELECTED FACTORS AND HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF PREGNANT
WOMEN WITH INDUCED HYPERTENSION) อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุกัญญา ประจุศิลป์
, 180 หน้า. ISBN 974-17-3642-8

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลำดับที่ของการตั้งครรภ์ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และเพื่อศึกษาอำนาจการพยากรณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือมีความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท จำนวน 150 คน ในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเที่ยงจากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .84, .90, .91, .96, และ .93 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์อยู่ในระดับดี ($\bar{X}=3.19$, S.D. =0.30)

2. การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การรับรู้ประโยชน์ และ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = .702, .489$ และ $.347$ ตามลำดับ)

3. การรับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = -.393$)

4. การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการรับรู้อุปสรรค สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 51.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ใน

รูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ $Z_{\text{พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ}} = .643 Z_{\text{การรับรู้สมรรถนะแห่งตน}} - .169 Z_{\text{การรับรู้อุปสรรค}}$

สาขาวิชา.....พยาบาลศาสตร์.....ลายมือชื่อนิสิต.....

ปีการศึกษา.....2548.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

4677570836 : MAJOR NURSING SCIENCE

172669

KEY WORD: HEALTH PROMOTING BEHAVIORS / PREGNANCY INDUCED HYPERTENSION

NARUMON PHANUTAECHA: RELATIONSHIPS AMONG SELECTED FACTORS AND
HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF PREGNANT WOMEN WITH INDUCED
HYPERTENSION. THESIS ADVISOR: ASST. PROF.SUKUNYA PRACHUSILPA,
DNSc.180 pp. ISBN 974-17-3642-8

The purpose of this study was to examine the relationships among perceived self-efficacy, perceived benefits, perceived barriers, social support, and health promoting behaviors of pregnant women with induced hypertension. Study sample consisted of 150 pregnant women with induced hypertension selected by multi – stage random sampling. The instruments for the study were the demographic data questionnaire, the Perceived Self-Efficacy questionnaire, the Perceived Benefits questionnaire, the Perceived Barriers questionnaire, the social support questionnaire, and the Health Promoting Behaviors of pregnant women with induced hypertension questionnaire. Content validity for all questionnaires were reviewed by a panel of experts. Internal consistency reliability for the instruments determined by Cronbach's alpha ranged from .84 to .96. Pearson product-moment correlation and Stepwise multiple regressions were used for statistical analysis.

The results were as follows:

1. Mean score of health promoting behaviors of pregnant women with induced hypertension was at the good level. ($\bar{X}=3.19$, S.D. =0.30)
2. There were positive statistical correlations between perceived self-efficacy, perceived barriers, social support, and health promoting behaviors of pregnant women with induced hypertension at the level of .05 ($r = .702$, .489 and .347, respectively)
3. There was a negative statistical correlation between perceived barriers and health promoting behaviors of pregnant women with induced hypertension at the level of .05 ($r = -.393$)
4. Perceived self-efficacy and perceived barriers significantly predicted health promoting behaviors of pregnant women with induced hypertension at the level of .05. These variables predicted 51.8 % of the variance. The equation derived from the standardized score was:

$$Z_{\text{Health promoting behaviors}} = .643 Z_{\text{perceived self-efficacy}} - .169 Z_{\text{perceived barriers}}$$

Field of study.....Nursing Science.....

Student's signature.....*Narumon Phanutaecha*.....

Academic year.....2005.....

Advisor's signature.....*Sukunya Prachusilpa*.....