

## บทคัดย่อ

170600

จากการศึกษาปลุกต้นกระชายดำในสภาพพื้นที่เกษตรกรของจังหวัดลำปาง และในพื้นที่ของสถาบันวิจัยฯ ลำปาง รวมจำนวน 4 พื้นที่ พบว่า พื้นที่ของเกษตรกรสามารถปลุกต้นกระชายดำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้เจริญเติบโตได้ แต่ยังให้ผลผลิตปริมาณเหง้าในจำนวนที่น้อย คือ มีน้ำหนักสดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 33.52 – 33.89 กรัมตอกอ เมื่อเทียบกับที่ปลูกในพื้นที่ของสถาบันวิจัยฯ ลำปาง มีน้ำหนักสดเฉลี่ยของเหง้าตอกอมากที่สุด คือ 153.67 และ 150.89 กรัมตอกอ

## ABSTRACT

170600

The study of *Kaempferia parviflora* Wall.ex Baker. cultivation from plantlet propagation by tissue culture in agriculturist area Lampang province. The result show that plantlet has growth in agriculturist area Lampang province but yield of rhizome had less. The agriculturist area has average of fresh weight less than LARTC area about 33.52 – 33.89 g/tussock and 153.67 – 150.89 g/tussock respectively.

---

<sup>1/</sup> สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000