

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การได้รับเคมีบำบัดมาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง อยู่ระหว่างการรักษา และมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาลเคมีบำบัด โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จำนวน 60 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ได้แยกชนิดของมะเร็ง ( Functional Assessment of Cancer Therapy – General :FACT-G (Thai-Version) ) วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบความแตกต่าง Man-Whitney U

ผลการวิจัยพบว่า

1.คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม มีคุณภาพชีวิตระดับสูง จำแนกคุณภาพชีวิตตามรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม/ครอบครัว ด้านอารมณ์ จิตใจและด้านปฏิบัติกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับสูง

2.ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่มีความแตกต่างของระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส มีคุณภาพชีวิตโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม/ครอบครัว และด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านปฏิบัติกิจกรรม ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่มีความแตกต่างของรายได้ พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม/ครอบครัว ด้านอารมณ์ จิตใจ ไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวิตด้านปฏิบัติกิจกรรม แตกต่างกัน

ผู้วิจัยเสนอแนะ ด้านปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ควรมีการประเมินระดับคุณภาพชีวิตเป็นระยะๆของการรับเคมีบำบัดและพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลระบบผู้ป่วยนอกที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่รักษาระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุม กาย จิต สังคมและเน้นรายบุคคลให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย

This descriptive research study aimed to compare quality of life in cancer patients receiving the treatment of chemotherapy at a tertiary hospital in Saraburi, Thailand.

The sixty patients ongoing the treatment of chemotherapy were selected by accidental sampling. The criteria for eligibility were patients aged over 20 years receiving the treatment of chemotherapy at least one time at oncology unit in outpatient department. The researchers collected data by questionnaires included demographic data, quality of life questionnaire by Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G, Thai-Version). Data were analyzed by descriptive statistics and Mann-Whitney U-test.

The results of this study indicated that cancer patients showed high level of the overall quality of life. Then, comparison of demographic data; educational level, marital status and each dimension quality of life showed no difference. However, comparison of demographic data; different income and functional well being showed significantly different.

Based on the research findings, the present study suggested that nursing intervention should be developed activities improving quality of life in cancer patient at ambulatory setting including.