

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การศึกษาเรื่อง เยาวชนไทย : พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
ปีพ.ศ. 2550 ในบทนี้จะนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย ในประเด็นที่ครอบคลุม
สาระสำคัญเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

4.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีประสบการณ์ในการ
ดื่มสุรา จำนวน 374 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
374 คน ด้วยตนเองและเก็บกลับคืนมาได้ 374 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่แจกไป
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในเรื่อง เพศ ชั้นปี อายุ และคณะวิชา (ตารางที่ 8) มีดังนี้

ตารางที่ 8 ลักษณะข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง

(n=374)

ลักษณะข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
1. เพศ		
ชาย	148	39.57
หญิง	226	60.43
รวม	374	100
2. ชั้นปี		
ชั้นปีที่ 1	105	28.07
ชั้นปีที่ 2	149	39.84
ชั้นปีที่ 3	69	18.45
ชั้นปีที่ 4	51	13.64
รวม	374	100
3. อายุ		
18 ปี	8	2.1
19 ปี	93	24.9
20 ปี	149	39.8
21 ปี	77	20.6
22 ปี	33	8.8
23 ปี	11	2.9
24 ปี	3	0.8
รวม	374	100
4. กลุ่มสาขาวิชา		
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	102	27.30
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	158	42.2
สังคมศาสตร์	114	30.5
รวม	374	100

จากตารางที่ 8 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (60.42%) และกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (39.83%) อายุประมาณ 20 ปี (39.83%) เมื่อพิจารณาจำนวนของนักศึกษาของกลุ่มสาขาวิชาทั้งหมดพบว่า กลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (42.24%) เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

4.2 พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน ปี พ.ศ. 2550

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน ปี พ.ศ. 2550 ผู้วิจัยได้จำแนกพฤติกรรมการดื่มสุรา ออกเป็นพฤติกรรมย่อยๆออกเป็น 5 ด้าน คือ สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุรา ชนิดของสุราที่ดื่ม ความถี่ในการดื่มสุรา สถานที่ดื่มสุรา และ กระบวนการดื่มสุราในการดื่มสุรา ซึ่งผู้วิจัยจะรายงานผลการวิเคราะห์เรียงลำดับทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

4.2.1 สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน ปี พ.ศ. 2550 ในภาพรวมในพฤติกรรมเกี่ยวกับสาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก ซึ่ง ประกอบด้วย พฤติกรรมเกี่ยวกับ ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่ม สาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก สุราชนิดแรกที่ดื่ม สภาพการณ์ดื่มสุรา ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก และ ปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก โดยมีรายละเอียด (ตารางที่ 9) ดังนี้

ตารางที่ 9 สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก

สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
1.ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่ม		
ต่ำกว่า 10 ปี	4	1.1
อายุ 11 ปี	3	.8
อายุ 12 ปี	10	2.7
อายุ 13 ปี	15	4.0
อายุ 14 ปี	26	7.0
อายุ 15 ปี	39	10.4
อายุ 16 ปี	43	11.5
อายุ 17 ปี	59	15.8
อายุ 18 ปี	89	23.8
อายุ 19 ปี	48	12.8
อายุ 20 ปี	31	8.3
อายุ 21 ปี	3	.8
อายุ 22 ปี	4	1.1
รวม	374	100
2. สาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
เพื่อนชวน	177	29.80
อยากทดลอง	195	32.82
เพื่อเข้าสังคม	95	16.0
เพื่อความโก้เก๋	9	1.5
มีคนบังคับ	31	5.2
คลายเครียด/วิตกกังวล	38	6.4
เพื่อความเป็นผู้ใหญ่	8	1.3
ดื่มตามสื่อโฆษณา/ละครโทรทัศน์		.2

ตารางที่ 9 สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก (ต่อ)

สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
เพื่อสร้างความมั่นใจ	8	1.3
อกหัก	12	2.0
กิจกรรมรับน้องใหม่	10	1.7
กระตุ้นให้การเรียนรู้หรืออ่านหนังสือดีขึ้น	6	1.0
ฉลองงานปีใหม่	1	.2
ผู้ใหญ่พาดื่ม	2	0.3
ดื่มเองไม่มีเหตุผล	1	.2
รวม	594	100
3. สุราชนิดแรกที่ดื่ม		
เหล้าขาว	30	8.0
สุราไทย	63	16.8
สุราต่างประเทศ	87	23.3
เบียร์	73	19.5
ไวน์/สปาย	111	29.7
เหล้าดองยา	2	.5
อุ กระแช่ น้ำตาลเมา สาโท	8	2.1
รวม	374	100
4. บุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วยในครั้งแรก		
ดื่มคนเดียว	14	3.7
ดื่มกับเพื่อน	311	83.2
ดื่มขณะทำกิจกรรม	29	7.8
ดื่มกับผู้ปกครอง	14	3.7
ดื่มกับญาติพี่น้อง	6	1.6
รวม	374	100

ตารางที่ 9 สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก (ต่อ)

สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
5. ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
เฉยๆ	167	34.4
ตื่นเต้นเล็กน้อย	74	15.3
ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก	19	3.9
ประหม่าเล็กน้อย	32	6.6
สนุกดี	52	10.7
รู้สึกสับสน	11	2.3
ไม่ชอบ	34	7.0
ไม่มีประโยชน์	33	6.8
รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่	3	.6
รู้สึกผิด	21	4.3
รู้สึกว่าทำไม่ถูก	30	6.2
เมา	7	1.4
ปวดศีรษะมาก	2	.4
รวม	485	100
6. รสชาติในการดื่มสุราครั้งแรก		
ขม	203	54.3
หวาน	21	5.6
อร่อยดี	60	16.0
ไม่อร่อย	89	23.8
แปลกๆ	1	.3
รวม	374	100

ตารางที่ 9 สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก (ต่อ)

สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
7. ปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก		
ประมาณ 1 – 2 แก้ว/กระป๋อง	206	55.1
ประมาณ 3 – 4 แก้ว/กระป๋อง	58	15.5
ประมาณ 5 – 6 แก้ว/กระป๋อง	35	9.4
มากกว่า 6 แก้ว/กระป๋อง	63	16.8
ปริมาณสูงสุดที่เคยดื่ม / จิบ	12	3.2
รวม	374	100

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มสุรา ในพฤติกรรมเกี่ยวกับสาเหตุและประสบการณ์ในการดื่มสุราครั้งแรกพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าอายุที่เริ่มดื่มสุราในครั้งแรกคืออายุ 18 ปี (23.8%) มีสาเหตุเนื่องมาจาก อยากลอง (32.82%) และ สุราชนิดแรกที่ดื่มคือ ไวน์/สไปรต (29.7%) บุคคลที่ร่วมดื่มสุราในครั้งแรกคือ เพื่อน (83.2%) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามีอยู่ (3.7%) ที่ระบุว่า เริ่มดื่มสุราในครั้งแรกกับผู้ปกครอง ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรกคือ เฉยๆ (34.4%) รสชาติในการดื่มสุราครั้งแรก คือ ขม (54.3%) และ ส่วนปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรกประมาณ 1 – 2 แก้ว/กระป๋อง (55.1%)

4.2.2 ชนิดของสุราที่ดื่มในปัจจุบัน

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน ปี พ.ศ. 2550 ในภาพรวมในพฤติกรรมเกี่ยวกับชนิดของสุราที่ดื่ม ซึ่งได้แก่ ประเภทของสุราที่ชอบดื่ม และ เหตุผลที่ชอบดื่มสุราประเภทนั้น รายละเอียด (ตารางที่10) พบว่าดังนี้

ตารางที่ 10 ชนิดของสุราที่ดื่มในปัจจุบัน

ชนิดของสุราที่ดื่ม	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
1.ประเภทของสุราที่ชอบดื่ม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
เหล้าขาว	21	3.76
สุราไทย	116	20.80
สุราต่างประเทศ	148	26.52
เบียร์	110	19.71
ไวน์/สปาย	122	21.86
เหล้าดอกยา	19	3.40
อุ กระแซ่ น้ำตาลเมา สาโท	22	3.94
รวม	558	100
2. เหตุผลที่ชอบดื่มสุราประเภทนี้ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
รสชาติดี	292	58.4
ราคาถูก	83	16.6
หาซื้อง่าย	116	23.2
แล้วแต่เพื่อนซื้อ	6	1.2
แล้วแต่เพื่อนดื่ม	3	0.6
รวม	500	100

จากตารางที่ 10 พฤติกรรมเกี่ยวกับชนิดของสุราที่ดื่มในปัจจุบันพบว่า ประเภทของสุราที่นักศึกษาส่วนมากนิยมดื่มในปัจจุบัน สุราต่างประเทศ (26.52%) และเหตุผลที่ชอบดื่มสุราประเภทนี้คือ รสชาติดี (58.4%)

4.2.3 ความถี่และช่วงเวลาในการดื่มสุรา

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2550 ในภาพรวมพฤติกรรมเกี่ยวกับความถี่ในการดื่มสุรา ซึ่งได้แก่ ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน ช่วงเวลาการดื่มสุรา มีรายละเอียด (ตารางที่ 11) ดังนี้

ตารางที่ 11 ความถี่และช่วงในการดื่มสุรา

ความถี่ในการดื่มสุรา	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
1. ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน		
ดื่มทุกวัน	13	3.5
ดื่มสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง	34	9.1
ดื่มสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง	46	12.3
ดื่ม 1-2 ครั้งต่อเดือน	34	9.1
ดื่ม 3-4 ครั้งต่อเดือน	23	6.1
ดื่มนานๆครั้ง	220	58.8
ดื่มตามเทศกาล	4	1.1
รวม	374	100
2. ช่วงเวลาการดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
หลังเลิกเรียน	33	7.8
ก่อนรับประทานอาหารเย็น	6	1.4
หลังรับประทานอาหารเย็น	23	5.4
ตอนเย็นหลังออกกำลังกาย	12	2.8
ตอนกลางวันระหว่างเรียน	4	.9
ตอนกลางคืน	283	66.9

ตารางที่ 11 ความถี่ในการดื่มสุรา (ต่อ)

ความถี่ในการดื่มสุรา (ต่อ)	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
2. ช่วงเวลาการดื่มสุรา (ต่อ) (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
แล้วแต่สถานการณ์	17	4.0
ไปเที่ยวสถานบันเทิง	19	4.5
หลังสอบเสร็จ	19	4.5
เหงา	7	1.7
รวม	423	100

จากตารางที่ 11 พฤติกรรมในภาพรวมเกี่ยวกับความถี่และช่วงเวลาในการดื่มสุรา พบว่า ส่วนใหญ่ระบุว่า ในปัจจุบันการดื่มสุราจะเป็นการดื่มนานๆครั้ง (58.8%) และช่วงเวลาในการดื่มสุราส่วนมากเป็นเวลากลางคืน (66.9%)

4.2.4 สถานที่ดื่มสุรา

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2550 ในภาพรวมในพฤติกรรมเกี่ยวกับสถานที่ดื่มสุรา ซึ่งได้แก่ สถานที่ในการดื่มสุรา การดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย และ สถานที่ในการดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย รายละเอียด (ตารางที่ 12) ดังนี้

ตารางที่ 12 สถานที่ดื่มสุรา

สถานที่ดื่มสุรา	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
1. สถานที่ในการดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
บ้านตนเอง	74	9.1
บ้านเพื่อน	123	15.1
หอพัก	108	13.2
ร้านอาหาร	80	9.8
สนามกีฬา	9	1.1
ผับ หรือ เชน	131	16.0
สวนสาธารณะ	9	1.1
ร้านคาราโอเกะ	57	7.0
ร้านขายอาหารและสุราติดรั้วมหาวิทยาลัย	88	10.8
งานเลี้ยงสังสรรค์	123	15.1
คณะ/ห้องเรียน	15	1.8
รวม	817	100
2. การดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย		
เคย	191	51.1
ไม่เคย	183	48.9
รวม	374	100
3. สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
คณะ	65	23.2
ห้องเรียน	5	1.8
ห้องน้ำ	9	3.2
โรงอาหาร	9	3.2
สนามกีฬา	21	7.5

ตารางที่ 12 สถานที่ดื่มสุรา (ต่อ)

สถานที่ดื่มสุรา	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
สวนหย่อม	18	6.4
บนดาดฟ้า	18	6.4
หอพัก	107	38.2
ศูนย์อาหารและบริการ	20	7.1
ห้องปฏิบัติการ	4	1.4
บริเวณที่จัดกิจกรรม	2	.7
หอศิลป์	1	.4
บึงสีฐาน	1	.4
รวม	280	100

จากตารางที่ 12 พฤติกรรมในภาพรวมในพฤติกรรมเกี่ยวกับสถานที่ดื่มสุราพบว่า สถานที่ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เป็นที่ดื่มสุราคือ ผับ/เรค (16.0%) และพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เคยดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย (51.1%) โดยส่วนใหญ่ดื่มสุราในบริเวณหอพักของมหาวิทยาลัย (38.2%)

4.2.5 กระบวนการพฤติกรรมในการดื่มสุราในแต่ละครั้ง

การวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2550 ในภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการพฤติกรรมในการดื่มสุรา ซึ่งในกระบวนการพฤติกรรมการดื่มสุราได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

- 1) พฤติกรรมในช่วงก่อนดื่มสุรา
- 2) พฤติกรรมในช่วงขณะดื่มสุรา
- 3) พฤติกรรมในช่วงหลังดื่ม

รายละเอียดดังนี้

1) พฤติกรรมในช่วงก่อนดื่มสุรา

พฤติกรรมการดื่มสุราในช่วงก่อนดื่มสุราประกอบไปด้วย โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา สาเหตุที่ดื่มสุรา แหล่งซื้อสุรา บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา โดยมีรายละเอียด (ตารางที่ 13) ดังนี้

ตารางที่ 13 พฤติกรรมในการดื่มสุรา

พฤติกรรมในช่วงก่อนดื่มสุรา	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
1. โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
อยู่คนเดียว	29	3.3
ไปเที่ยวกับเพื่อน	164	18.8
ร่วมงานวันเกิดกับเพื่อน	146	16.8
สอบเสร็จ	142	16.3
ร่วมการแข่งขันกีฬา	26	3.0
ทำรายงาน/ฝึกปฏิบัติงาน	26	3.0
รับประทานอาหารกับเพื่อน	28	3.2
ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน	192	22.0
ร่วมงานบุญประเพณี	58	6.7
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน	12	1.4
ไปศึกษาดูงาน/สัมมนา	17	2.0
กิจกรรมรับน้องใหม่	9	1.0
กิจกรรมเข้าเชียร์น้องใหม่	6	.7
เลี้ยงสายรหัส	7	.8
ฉลองเทศกาลสำคัญ	3	.3
ออกค่าย	4	.5
ไม่มีอะไรทำ	1	.2
รวม	871	100

ตารางที่ 13 พฤติกรรมในการดื่มสุรา (ต่อ)

พฤติกรรมในช่วงก่อนดื่มสุรา	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
2.สาเหตุที่ดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
เพื่อนชวน	206	30.9
อยากทดลอง	84	12.6
เพื่อเข้าสังคม	165	24.7
เพื่อความโก้เก๋	12	1.8
มีคนบังคับ	30	4.5
คลายเครียด/วิตกกังวล	84	12.6
เพื่อความเป็นผู้ใหญ่	10	1.5
ดื่มตามสื่อโฆษณา/ละครโทรทัศน์	6	.9
เพื่อสร้างความมั่นใจ	14	2.1
ออกหัก	24	3.6
กิจกรรมรับน้องใหม่	7	1.0
กระตุ้นให้การเรียนรู้หรืออ่านหนังสือดีขึ้น	4	.6
บรรเทาอากาศดี	4	.6
เทศกาลสำคัญ	3	.4
อยากดื่มเอง	5	.7
ตามสังคมที่บ้าน	3	.4
เลี้ยงพี่บัณฑิต	6	.9
รวม	667	100

ตารางที่ 13 พฤติกรรมในการดื่มสุรา (ต่อ)

พฤติกรรมในช่วงก่อนดื่มสุรา	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
3. แหล่งที่ซื้อสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
ร้านสะดวกซื้อซึ่งเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง	214	27.3
ร้านขายของชำ	191	24.4
ซูเปอร์มาร์เกต	133	17.0
ผับ/บาร์	132	16.8
ร้านอาหารที่มีสุราขาย	99	12.6
ไม่เคยซื้อเอง	15	1.9
รวม	784	100
4. บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
บิดา-มารดา	35	6.7
อาจารย์	5	1.0
เพื่อน	338	64.3
ญาติ-พี่น้อง	62	11.8
แฟน	61	11.6
คนเดียว	25	4.8
รวม	526	100

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มสุรา ในช่วงก่อนดื่มสุรา พบว่า โอกาสหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การดื่มสุราของนักศึกษาส่วนใหญ่ คือ การไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน (22.0%) สาเหตุการดื่มสุราคือ เพื่อนชวน (30.9%) แหล่งซื้อสุราจาก ร้านสะดวกซื้อ 24 น. (27.3%) และบุคคลที่ร่วมดื่มสุราโดยส่วนใหญ่ระบุว่า เพื่อน (64.30%)

2) พฤติกรรมในช่วงขณะดื่มสุรา

พฤติกรรมในช่วงขณะดื่มสุรา ประกอบไปด้วย กิจกรรมระหว่างดื่มสุรา วิธีการดื่มสุรา ปริมาณการดื่มสุรา การใช้สารเสพติดขณะดื่มสุรา ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา ซึ่งมีรายละเอียด (ตารางที่ 14) ดังนี้

ตารางที่ 14 พฤติกรรมในช่วงการดื่มสุรา

พฤติกรรมในช่วงดื่มสุรา	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
5. กิจกรรมระหว่างดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
ร้องเพลง	178	23.3
ฟังเพลง	232	30.4
ทำงานส่วนตัว	11	1.4
ทำงานหารายได้	1	.1
เล่นสนุกเกอร์	8	1.0
ดูฟุตบอล	54	7.1
ทำรายงาน/ฝึกปฏิบัติงาน	5	.7
ดูโคโยตี้	47	6.2
เล่นดนตรี	25	3.3
คุยกับเพื่อน	164	21.5
เล่นกีฬา	5	.7
ไปศึกษาดูงาน/สัมมนา	3	.4
ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย	4	.5
ขับรถไปเที่ยว	9	1.2
กิจกรรมรับน้องใหม่	4	.5
เล่นการพนัน	5	.7
ดูโทรทัศน์	4	.5
คุยกับผู้ปกครอง	5	.7
รวม	764	100

ตารางที่ 14 พฤติกรรมในช่วงการดื่มสุรา (ต่อ)

พฤติกรรมในช่วงดื่มสุรา (ต่อ)	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
6. วิธีการดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
ดื่มโดยไม่ผสมอย่างอื่นหรือดื่มเพียวๆ	82	14.5
ผสมโซดา	237	42.0
ผสมน้ำเปล่า	83	14.7
ผสมน้ำอัดลม	158	28.0
ผสมน้ำผลไม้	4	.7
รวม	564	100
7. ปริมาณในการดื่มสุราแต่ละครั้ง		
หนึ่งกึ่ง (1 แก้วเล็กๆ)	35	9.4
หนึ่งแก้ว	95	25.4
3 – 4 แก้ว	3	.8
หนึ่งก๊ก (ครึ่งขวดแบน)	10	2.7
หนึ่งแบน	58	15.5
หนึ่ง กลม/ขวด	103	27.5
สอง กลม/ขวด	32	8.6
สาม กลม/ขวด	32	8.6
หก กลม/ขวด	1	.3
5 - 6 ลิ้ง	1	.3
แล้วแต่จำนวนเงินที่มี	4	1.1
รวม	374	100

ตารางที่ 14 พฤติกรรมในช่วงการดื่มสุรา (ต่อ)

พฤติกรรมในช่วงดื่มสุรา (ต่อ)	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
8. การใช้สารเสพติดในขณะที่ดื่มสุรา		
เคย	61	16.3
ไม่เคย	313	83.7
รวม	374	100
9. สารเสพติดใดที่ใช้ขณะดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
บุหรื	59	83.3
กัญชา	11	15.7
รวม	70	100

จากตารางที่ 14 กระบวนพฤติกรรมในการดื่มสุราในช่วงขณะดื่มสุราพบว่า กิจกรรมที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำเหมือนกันระหว่างดื่มสุรา คือ ฟังเพลง (30.4%) โดยดื่มสุราแบบ ผสมโซดา (42.0%) ปริมาณการดื่มสุราของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ดื่มในแต่ละครั้ง คือ หนึ่งกลม/ขวด (27.5%) และไม่เคยใช้สารเสพติดในขณะที่ดื่มสุรา (83.7%) สำหรับกลุ่มที่บอกว่าเคยใช้สิ่งเสพติดระบุว่า บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่นักศึกษาส่วนใหญ่สูบในขณะที่ดื่มสุรา (83.3%)

3) พฤติกรรมในช่วงหลังดื่มสุรา

พฤติกรรมในการดื่มสุราในช่วงหลังดื่มสุรา ประกอบไปด้วย ที่มาของเงินที่จ่ายในการดื่มสุรา ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา ระยะเวลาในการดื่มสุรา ความรู้สึกหลังจากดื่มสุรา ดื่มสุราเพียงใดถึงพอ การดื่มสุรากับผลการเรียน การดื่มสุราในอนาคต โดยมีรายละเอียด (ตารางที่ 15) ดังนี้

ตารางที่ 15 พฤติกรรมในการดื่มสุราในช่วงหลังดื่มสุรา

พฤติกรรมในช่วงหลังดื่มสุรา	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
10. ที่มาของเงินที่จ่ายในการดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
เงินส่วนตัวที่เก็บสะสม	247	54.5
เจียดเงินรายวันที่ใช้ไปเรียนหนังสือ	126	27.8
รายได้จากการทำงาน	26	5.7
ยืมจากเพื่อน	24	5.3
เงินจากการกู้ยืมการศึกษา/เงินทุนการศึกษา	6	1.3
มีแต่เพื่อนเลี้ยง	14	3.1
ผู้ปกครอง/ญาติ ชื้อให้	10	2.2
รวม	453	100
11. ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา		
ฟรี	72	19.3
ต่ำกว่า 100 บาท	49	13.1
100 – 200 บาท	159	42.5
201 – 400 บาท	55	14.7
401 – 600 บาท	16	4.3
601 – 800 บาท	3	.8
801 – 1,000 บาท	14	3.7
มากกว่า 1,000 บาท	6	1.6
รวม	374	100

ตารางที่ 15 พฤติกรรมในการดื่มสุรา (ต่อ)

พฤติกรรมในช่วงหลังดื่มสุรา (ต่อ)	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
12. กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
กลับบ้าน/หอบพัก	220	35.2
เล่นเกม	27	4.3
กินข้าว	72	11.5
หารายได้พิเศษ	3	.5
นอนหลับ	249	39.8
ทะเลาะวิวาท	2	.3
ทำรายงาน/ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน	1	.2
มีเพศสัมพันธ์	17	2.7
เล่นดนตรี	10	1.6
เล่นการพนัน	22	3.5
ร้องเพลง	1	.2
โทรศัพท์หาแฟน	1	.2
รวม	625	100
13.ระยะเวลาทั้งหมดของกระบวนการดื่มสุราใน แต่ละครั้ง		
น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง	47	12.6
น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง	27	7.2
มากกว่าครึ่งชั่วโมง – 1 ชั่วโมง	63	16.8
มากกว่า 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง	91	24.3
มากกว่า 2 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมง	75	20.1
มากกว่า 4 ชั่วโมง – 5 ชั่วโมง	71	19.0
มากกว่า 5 ชั่วโมง – 6 ชั่วโมง	374	100
รวม		

ตารางที่ 15 พฤติกรรมในการดื่มสุรา (ต่อ)

พฤติกรรมในช่วงหลังดื่มสุรา (ต่อ)	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
14. ความรู้สึกหลังจากดื่มสุรา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
สนุกสนานรื่นเริง	186	40.3
พอใจในรสชาติ	60	13.0
ไม่ประทับใจ	61	13.2
เฉยๆ	146	31.7
ไม่ดีต่อร่างกาย	1	.2
เมา	5	1.1
อาเจียน	2	.4
รวม	461	100
15. อาการที่ทำให้เลิกดื่มสุราในแต่ละครั้ง		
ดื่มจนหนอยเพียงรู้สึกว่ามีคิม	126	33.7
เริ่มรู้สึกมึนศีรษะจึงพอ	156	41.7
ดื่มจนรู้สึกสนุก	59	15.8
ดื่มจนเมามาย	30	8.0
อาเจียน	2	.5
ปวดหัว	1	.3
รวม	374	100
16. การดื่มสุรากับผลการเรียน		
ผลการเรียนดีขึ้น	16	4.3
ผลการเรียนแย่ลง	58	15.5
ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา	300	80.2
รวม	374	100

ตารางที่ 15 พฤติกรรมในการดื่มสุรา (ต่อ)

พฤติกรรมในช่วงหลังดื่มสุรา (ต่อ)	จำนวนคน / ผู้ตอบ คำถาม	ร้อยละ (%)
17.การดื่มสุราในอนาคต		
ไม่ดื่มเลย	66	17.6
ดื่มบ้างเป็นบางครั้ง	300	80.2
ดื่มเป็นประจำ	8	2.1
รวม	374	100

จากตารางที่ 15 พฤติกรรมในภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการพฤติกรรมในการดื่มสุรา ในช่วงหลังดื่มสุราพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้เงินส่วนตัวที่เก็บสะสม (54.5%) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุราในแต่ละครั้ง โดยค่าใช้จ่ายในการดื่มสุราในแต่ละครั้ง ประมาณ 100 – 200 บาท (42.5%) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการดื่มสุราแต่ละครั้ง มากกว่า 2 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมง (24.3%) หลังจากดื่มสุราแล้วส่วนใหญ่บอกว่า รู้สึกสนุกสนานรื่นเริง (40.3%) และจะเลิกดื่มเมื่อมีอาการเริ่มรู้สึกมึนศีรษะจึงพอ (41.7%) และกิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุราคือ นอนหลับ (39.84%)

สำหรับการดื่มสุรากับผลการเรียนนักศึกษากลุ่มส่วนใหญ่บอกว่า การดื่มสุราไม่มีผลกระทบต่อการเรียน (80.2%) และในอนาคตนักศึกษากลุ่มส่วนใหญ่จะดื่มเป็นบางครั้งบางคราว (80.21%)

ดังนั้นในภาพรวมสรุปได้ว่า

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการดื่มสุราส่วนใหญ่ เริ่มมีประสบการณ์ดื่มสุราในครั้งแรกในช่วงอายุ 18 ปี โดยมีสาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรกเพราะ อยากทดลอง โดยในครั้งแรกดื่ม ไวน์/สไปรท์ กับเพื่อน ประมาณ 1 – 2 แก้ว รู้สึกว่าสุราไม่รบกวน แต่ดื่มแล้วรู้สึกเมา

ในปัจจุบันนักศึกษากลุ่มใหญ่ที่ยังคงดื่มสุราบอกว่า ชอบดื่มสุราต่างประเทศ เพราะมีรสชาติดี โดยนานๆครั้งจึงดื่ม และส่วนใหญ่บอกว่า ดื่มตอนกลางคืน ที่ผับ หรือ เชน นักศึกษาจำนวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย (51.1%) เคยดื่มสุราบริเวณมหาวิทยาลัย และ หอพักเป็นที่ นักศึกษากลุ่มใหญ่ใช้เป็นสถานที่ดื่มสุรามากที่สุด

สำหรับกระบวนการในการดื่มสุราในแต่ละครั้งของนักศึกษานั้นพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ดื่มสุราในโอกาสที่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน เพราะเพื่อนชวนโดยซื้อสุราจากร้านสะดวกซื้อซึ่งเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง และนำไปล้อมวงดื่มกับเพื่อนและส่วนใหญ่ระบุว่า กิจกรรมที่ทำไปด้วยในระหว่างการดื่มสุราคือ การฟังเพลง ในการล้อมวงดื่มสุรากับเพื่อนแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะดื่มสุราแบบ ผสมโซดา และจะหมดสุราในแต่ละครั้ง หนึ่งขวด และเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรใส่ใจที่พบว่า ส่วนใหญ่ (83.7%) ไม่เคยใช้สารเสพติดขณะดื่มสุรา มีเพียงส่วนเล็กน้อย (16.3%) ที่ระบุว่าใช้สารเสพติดร่วมด้วยขณะดื่มสุรา ได้แก่ สูบบุหรี่ (83.3%) และสูบกัญชา (15.7%) ในการดื่มแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100 – 200 บาท โดยเงินที่ใช้ในการดื่มสุราเป็นเงินส่วนตัวที่เก็บสะสมไว้ในการล้อมวงดื่มสุราแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง หลังจากดื่มสุราแล้วส่วนใหญ่จะรู้สึกสนุกสนานรื่นเริง การดื่มในแต่ละครั้งจะเลิกดื่มเมื่อรู้สึกมึนศีรษะ หลังจากดื่มแล้ว กิจกรรมที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำคือ นอนหลับ

สำหรับผลการเรียนกับการดื่มสุรานั้นนักศึกษากลุ่มส่วนใหญ่บอกว่า การดื่มสุราไม่มีผลกระทบต่อการเรียน (80.2%) และในอนาคตก็ยังคงดื่มสุราเป็นบางครั้งบางคราว (80.2%)

4.3 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน

ผลการ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

จากผลการศึกษาพบว่า

4.3.1 สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุรา

จากผลการ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องเกี่ยวกับ สาเหตุและประสบการณ์ดื่มสุรา ได้แก่ ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่มสุรา สาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก สุราชนิดแรกที่ดื่ม สภาพการณ์ดื่มสุรา ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก และปริมาณการดื่มสุราครั้งแรก รายละเอียดมีดังนี้

1) สาเหตุและประสบการณ์การดื่มสุรา

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของ ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่มสุรา จากดังกล่าวข้างต้น พบว่า (ตารางที่ 16) ดังนี้

ตารางที่ 16 ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่มสุรา

ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ ครั้งแรกในการดื่มสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ต่ำกว่า 10 ปี	2 (2.0)	2 (1.3)	0 (0.00)	4 (1.1)
อายุ 11 ปี	1 (1.0)	2 (1.3)	0 (0.00)	3 (.8)
อายุ 12 ปี	4 (3.9)	0 (0.00)	6 (1.6)	10 (2.7)
อายุ 13 ปี	4 (3.9)	9 (5.7)	2 (1.8)	15 (4.0)
อายุ 14 ปี	6 (5.9)	13 (8.2)	7 (6.1)	26 (7.0)
อายุ 15 ปี	14 (12.7)	17 (10.8)	9 (7.9)	39 (10.4)
อายุ 16 ปี	7 (6.9)	18 (11.4)	18 (15.8)	43 (11.5)
อายุ 17 ปี	9 (8.8)	28 (17.7)	22 (19.3)	59 (15.8)
อายุ 18 ปี	30 (29.4)	38 (24.1)	21 (5.3)	89 (23.8)
อายุ 19 ปี	8 (7.8)	18 (11.4)	22 (19.3)	43 (12.8)
อายุ 20 ปี	15 (14.7)	10 (6.3)	6 (5.3)	31 (8.3)
อายุ 21 ปี	1 (1.0)	1 (.6)	1 (.9)	3 (.8)

ตารางที่ 16 ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่มสุรา (ต่อ)

ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ ครั้งแรกในการดื่มสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
อายุ 22 ปี	2 (2.0)	2 (1.3)	0 (0.00)	4 (1.1)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 24$, $Asymp.Sig = .014$, $\chi^2 = 41.566$)

จากตารางที่ 16 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน พบว่า ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่มสุรา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2) สาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของสาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก ผลการศึกษเป็นดังนี้ (ตารางที่ 17)

ตารางที่ 17 สาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก

สาเหตุของการดื่มสุรา ครั้งแรก	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เพื่อนชวน	52 (33.5)	71 (27.8)	54 (29.3)	177 (29.8)
อยากทดลอง	60 (38.7)	80 (31.4)	55 (29.9)	195 (32.8)
เพื่อเข้าสังคม	16 (10.3)	45 (17.6)	34 (18.5)	95 (16.0)
เพื่อความโก้เก๋	1 (.6)	6 (2.4)	2 (1.1)	9 (1.5)
มีคนบังคับ	6 (3.9)	14 (5.5)	11 (6.0)	31 (5.2)
คลายเครียด/วิตกกังวล	9 (5.8)	14 (5.5)	15 (8.2)	38 (6.4)
เพื่อความเป็นผู้ใหญ่	3 (1.9)	3 (1.2)	2 (1.1)	8 (1.3)
ดื่มตามสื่อโฆษณา/ ละครโทรทัศน์	0 (0.00)	1 (.4)	0 (0.00)	1 (.2)
เพื่อสร้างความมั่นใจ	1 (.6)	5 (2.0)	2 (1.1)	8 (1.3)
อกหัก	1 (.6)	5 (2.0)	6 (3.3)	12 (2.0)
กิจกรรมรับน้องใหม่	2 (1.3)	6 (2.4)	2 (1.1)	10 (1.7)
กระตุ้นให้การเรียนรู้ หรืออ่านหนังสือดีขึ้น	2 (1.3)	4 (1.6)	0 (0.00)	6 (1.0)
รวม	155 (100)	255 (100)	184 (100)	594 (100)

($p \geq .05$, $df = 28$, Asymp.Sig = .309, $\chi^2 = 31.175$)

จากตารางที่ 17 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของสาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก พบว่าสาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3) สุราชนิดแรกที่ดื่ม

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของสุราชนิดแรกที่ดื่ม ผลการศึกษาดังนี้ (ตารางที่ 18)

ตารางที่ 18 สุราชนิดแรกที่ดื่ม

สุราชนิดแรกที่ดื่ม	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เหล้าขาว	3 (2.9)	13 (8.2)	14 (12.3)	30 (8.0)
สุราไทย	13 (12.7)	30 (19.0)	20 (17.5)	63 (16.8)
สุราต่างประเทศ	29 (28.4)	30 (19.0)	28 (24.6)	87 (23.3)
เบียร์	13 (12.7)	46 (29.1)	14 (12.3)	73 (19.5)
ไวน์/สปาย	39 (38.2)	37 (23.4)	35 (30.7)	111 (29.7)
เหล้าดองยา	1 (1.0)	1 (.6)	0 (0.00)	2 (.5)
อุ กระแช่ น้ำตาลเมา สาโท	4 (3.9)	1 (.6)	3 (2.6)	8 (2.1)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 12$, $Asymp.Sig = .002$, $\chi^2 = 31.736$)

จากตารางที่ 18 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของสุราชนิดแรกที่ดื่ม พบว่า สุราชนิดแรกที่ดื่ม กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4) บุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วยในครั้งแรก

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของบุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วยในครั้งแรก ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 19)

ตารางที่ 19 บุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วยในครั้งแรก

บุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วย ในครั้งแรก	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ดื่มคนเดียว	9 (8.8)	4 (2.5)	1 (.9)	14 (3.7)
ดื่มกับเพื่อน	77 (75.5)	139 (88.0)	95 (83.3)	311 (83.2)
ดื่มขณะทำกิจกรรม	6 (5.9)	11 (7.0)	12 (10.5)	29 (7.8)
ดื่มอยู่กับผู้ปกครอง	7 (6.9)	2 (1.3)	5 (4.4)	14 (3.7)
ดื่มอยู่กับญาติพี่น้อง	3 (2.9)	2 (1.3)	1 (.9)	6 (1.6)
รวม	102 (100)	158 (100)	115 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 8$, $Asymp.Sig = .010$, $\chi^2 = 20.028$)

จากตารางที่ 19 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของบุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วยในครั้งแรก พบว่า บุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วยในครั้งแรก กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5) ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 20)

ตารางที่ 20 ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก

ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก	การเรียนกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เฉยๆ	49 (37.7)	70 (36.6)	48 (29.3)	167 (34.4)
ตื่นเต้นเล็กน้อย	24 (18.5)	28 (14.7)	22 (13.4)	74 (15.3)
ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก	3 (2.3)	7 (3.7)	9 (5.5)	19 (3.9)
ประหม่าเล็กน้อย	8 (6.2)	13 (6.8)	11 (6.7)	32 (6.6)
สนุกดี	13 (10.0)	24 (12.6)	15 (9.1)	52 (10.7)
รู้สึกสับสน	2 (1.5)	2 (1.0)	7 (4.3)	11 (2.3)
ไม่ชอบ	8 (6.2)	9 (4.7)	17 (10.4)	34 (7.0)
ไม่มีประโยชน์	15 (11.5)	10 (5.2)	8 (4.9)	33 (6.8)
รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่	1 (.8)	0 (0.00)	2 (1.2)	3 (.6)
รู้สึกผิด	3 (2.3)	7 (3.7)	11 (6.7)	21 (4.3)

ตารางที่ 20 ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก (ต่อ)

ความรู้สึกในการดื่มสุรา ครั้งแรก (ต่อ)	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
รู้สึกว่าการไม่ถูก	3 (2.3)	15 (7.9)	12 (7.3)	30 (6.2)
เมา	0 (0.00)	6 (3.1)	1 (.6)	7 (1.4)
ปวดศีรษะมาก	1 (.8)	0 (0.00)	1 (.6)	2 (.4)
รวม	130 (100)	191 (100)	164 (100)	485 (100)

($p \geq .05$, $df = 24$, $Asymp.Sig = .029$, $\chi^2 = 38.719$)

จากตารางที่ 20 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก พบว่า ความรู้สึกในการดื่มสุราครั้งแรก กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6) รสชาติในการดื่มสุราครั้งแรก

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของรสชาติในการดื่มสุราครั้งแรก ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 21)

ตารางที่ 21 รสชาติในการดื่มสุราครั้งแรก

รสชาติในการดื่มสุรา ครั้งแรก	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ขม	49 (48.0)	92 (58.2)	62 (54.4)	203 (54.3)
หวาน	9 (8.8)	4 (2.5)	8 (7.0)	21 (5.6)
อร่อยดี	20 (19.6)	24 (15.2)	16 (14.0)	60 (16.0)
ไม่อร่อย	23 (22.5)	38 (24.1)	28 (24.6)	89 (23.8)
แปลกๆ	1 (1.0)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (.3)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 8$, Asymp.Sig = .261, $\chi^2 = 10.062$)

จากตารางที่ 21 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของรสชาติในการดื่มสุราครั้งแรก พบว่า รสชาติในการดื่มสุราครั้งแรก กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

7) ปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 22)

ตารางที่ 22 ปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก

ปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ประมาณ 1 – 2 แก้ว/กระป๋อง	65 (63.7)	74 (46.8)	67 (58.8)	206 (55.1)
ประมาณ 3 – 4 แก้ว/กระป๋อง	14 (13.7)	30 (19.0)	14 (12.3)	58 (15.5)
ประมาณ 5 – 6 แก้ว/กระป๋อง	7 (6.9)	14 (8.9)	14 (12.3)	35 (9.4)
มากกว่า 6 แก้ว/กระป๋อง	8 (7.8)	38 (24.1)	17 (14.9)	63 (16.8)
ปริมาณสูงสุดที่เคยดื่ม 3 – 4 จิบ	7 (7.8)	2 (1.3)	2 (1.8)	12 (3.2)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 8$, Asymp.Sig = .001, $\chi^2 = 27.053$)

จากตารางที่ 22 จากการเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก พบว่า ปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก กับการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.3.2 ชนิดของสุราที่ดื่มในปัจจุบัน

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องชนิดของสุราที่ดื่ม ซึ่งได้แก่ ประเภทสุราที่ชอบดื่มในปัจจุบัน และ เหตุผลที่ชอบดื่มสุราชนิดที่ดื่มอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ชนิดของสุราที่ดื่ม

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของ ชนิดสุราที่ดื่มในปัจจุบัน ผลการศึกษาคือเป็นดังนี้ (ตารางที่ 23)

ตารางที่ 23 ชนิดของสุราที่ดื่มในปัจจุบัน

ชนิดของสุราที่ดื่ม ในปัจจุบัน	การเรียนรู้ในกลุ่มกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เหล้าขาว	2 (1.4)	13 (5.0)	6 (3.9)	21 (3.8)
สุราไทย	16 (11.2)	62 (23.8)	38 (24.7)	116 (20.8)
สุราต่างประเทศ	40 (28.0)	63 (24.1)	45 (29.2)	148 (26.5)
เบียร์	17 (11.9)	65 (24.9)	28 (17.5)	109 (19.5)
ไวน์/สปาย	54 (37.8)	31 (11.9)	38 (24.7)	123 (22.0)
เหล้าดองยา	6 (4.2)	13 (5.0)	0 (0.00)	19 (3.4)
อุ กระแช่ น้ำตาลเมา สาโท	8 (5.6)	14 (5.4)	0 (0.00)	22 (3.9)
รวม	143 (100)	261 (100)	154 (100)	558 (100)

($p \geq .05$, $df = 12$, $Asymp.Sig = .000$, $\chi^2 = 65.825$)

. จากตารางที่ 23 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ ชนิดของสุราที่ดื่มในปัจจุบัน พบว่า ชนิดของสุราที่ดื่มในปัจจุบัน กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2) เหตุผลที่ชอบดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของ เหตุผลที่ชอบดื่มสุราชนิดที่ดื่มอยู่ในปัจจุบัน ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 24)

ตารางที่ 24 เหตุผลที่ชอบดื่มสุรา

เหตุผลที่ชอบดื่มสุรา ชนิดที่ดื่มอยู่ในปัจจุบัน	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
รสชาติดี	83 (65.4)	122 (57.8)	87 (53.7)	292 (58.4)
ราคาถูก	13 (10.2)	40 (19.0)	30 (18.5)	83 (16.6)
หาซื้อง่าย	28 (22.0)	47 (22.3)	41 (25.3)	116 (23.2)
แล้วแต่เพื่อนซื้อ	2 (1.6)	1 (.5)	3 (1.9)	6 (1.2)
แล้วแต่เพื่อนดื่ม	1 (.8)	1 (.5)	1 (.6)	3 (.6)
รวม	127 (100)	211 (100)	162 (100)	500 (100)

($p \geq .05$, $df = 8$, Asymp.Sig = .426, $\chi^2 = 8.081$)

จากตารางที่ 24 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ เหตุผลที่ชอบดื่มสุราชนิดที่ดื่มอยู่ในปัจจุบัน พบว่า เหตุผลที่ชอบดื่มสุรา ชนิดที่ดื่มอยู่ในปัจจุบัน กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.3.3 ความถี่ในการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องความถี่ในการดื่มสุรา ซึ่งได้แก่ ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน และ ช่วงเวลาในการดื่มสุรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ความถี่ในการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของ ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 25)

ตารางที่ 25 ความถี่ในการดื่มสุรา

ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ดื่มทุกวัน	4 (3.9)	7 (4.4)	2 (1.8)	13 (3.5)
ดื่มสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง	9 (8.8)	17 (10.8)	8 (7.0)	34 (9.1)
ดื่มสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง	7 (6.9)	25 (15.8)	14 (12.3)	46 (12.3)
ดื่ม 1-2 ครั้งต่อเดือน	8 (7.8)	9 (5.7)	17 (14.9)	34 (9.1)
ดื่ม 3-4 ครั้งต่อเดือน	6 (5.9)	14 (8.9)	3 (2.6)	23 (6.1)
ดื่มนานๆครั้ง	65 (63.7)	86 (54.4)	69 (60.5)	220 (58.8)
ดื่มตามเทศกาล	3 (2.9)	0 (0.00)	1 (.9)	4 (1.1)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 12$, $Asymp.Sig = .026$, $\chi^2 = 23.205$)

จากตารางที่ 25 จากการศึกษเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน พบว่า ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2) ช่วงเวลาในการดื่มสุราในปัจจุบัน

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ ช่วงเวลาการดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 26)

ตารางที่ 26 ช่วงเวลาในการดื่มสุราในปัจจุบัน

ช่วงเวลาในการดื่มสุราในปัจจุบัน	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
หลังเลิกเรียน	10 (8.5)	14 (7.8)	9 (7.2)	33 (7.8)
ก่อนรับประทานอาหารเช้า	1 (.9)	4 (2.2)	1 (.8)	6 (1.4)
หลังรับประทานอาหารเช้า	12 (10.3)	8 (4.4)	3 (2.4)	23 (5.4)
ตอนเย็นหลังออกกำลังกาย	1 (.9)	8 (4.1)	3 (2.4)	12 (2.8)
ตอนกลางวันระหว่างเรียน	1 (.9)	3 (1.7)	0 (0.00)	4 (4.9)
ตอนกลางคืน	75 (64.1)	118 (65.6)	90 (72.0)	283 (66.9)
แล้วแต่สถานการณ์	3 (2.6)	8 (4.4)	6 (4.8)	17 (4.0)
ไปเที่ยวสถานบันเทิง	5 (4.3)	7 (3.9)	7 (5.6)	19 (4.5)
หลังสอบเสร็จ	6 (5.1)	10 (5.6)	3 (2.4)	19 (4.5)
เหงา	3 (2.6)	1 (.6)	3 (2.4)	7 (1.7)
รวม	117 (100)	181 (100)	125 (100)	423 (100)

($p \geq .05$, $df = 27$, $Asymp.Sig = .002$, $\chi^2 = 53.997$)

จากตารางที่ 26 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ ช่วงเวลาในการดื่มสุราในปัจจุบัน พบว่า ช่วงเวลาในการดื่มสุราในปัจจุบันกับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.3.4 สถานที่ในการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของสถานที่ดื่มสุราซึ่งได้แก่ สถานที่ในการดื่มสุรา การดื่มสุราในมหาวิทยาลัย และ สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) สถานที่ในการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของสถานที่ในการดื่มสุรา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 27)

ตารางที่ 27 สถานที่ดื่มสุรา

สถานที่ในการดื่มสุรา	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
บ้านตนเอง	20 (10.2)	32 (8.7)	22 (8.7)	74 (9.1)
บ้านเพื่อน	23 (11.7)	53 (14.4)	47 (18.7)	123 (15.1)
หอพัก	32 (16.2)	53 (14.4)	23 (9.1)	108 (13.2)
ร้านอาหาร	14 (7.1)	40 (10.9)	26 (10.3)	80 (9.8)
สนามกีฬา	2 (1.0)	7 (1.9)	0 (0.00)	9 (1.1)
ผับ/เรค	34 (17.3)	46 (12.5)	51 (20.2)	131 (16.0)

ตารางที่ 27 สถานที่ดื่มสุรา (ต่อ)

สถานที่ในการดื่มสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
สวนสาธารณะ	4 (2.0)	4 (1.1)	1 (.4)	9 (1.1)
ร้านคาราโอเกะ	12 (6.1)	29 (7.9)	16 (6.3)	57 (7.0)
ร้านขายอาหารและสุราติด รั้วมหาวิทยาลัย	28 (14.2)	34 (9.2)	26 (10.3)	88 (10.8)
งานเลี้ยงสังสรรค์	24 (12.2)	61 (16.6)	38 (15.1)	123 (15.1)
คณะ/ห้องเรียน	4 (2.0)	9 (2.4)	2 (.8)	15 (1.8)
รวม	197 (100)	368 (100)	252 (100)	817 (100)

($p \geq .05$, $df = 20$, $Asymp.Sig = 0.41$, $\chi^2 = 32.182$)

จากตารางที่ 27 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ สถานที่ในการดื่มสุรา พบว่า สถานที่ในการดื่มสุรา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2) การดื่มสุราในมหาวิทยาลัย

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ การดื่มสุราในมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 28)

ตารางที่ 28 การดื่มสุราในมหาวิทยาลัย

การดื่มสุราในบริเวณ มหาวิทยาลัย	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เคย	51 (50.0)	83 (52.5)	57 (50.0)	191 (51.1)
ไม่เคย	51 (50.0)	75 (47.5)	57 (50.0)	183 (48.9)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 2$, $Asymp.Sig = .890$, $\chi^2 = .234$)

จากตารางที่ 28 จากการศึกษเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ การดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย พบว่า การดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3) สถานที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัย

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 29)

ตารางที่ 29 สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัย

สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัย	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
คณะ	16 (22.2)	33 (27.5)	16 (18.2)	65 (23.2)
ห้องเรียน	1 (1.4)	3 (2.5)	1 (1.1)	5 (1.8)
ห้องน้ำ	3 (4.2)	3 (2.5)	3 (3.4)	9 (3.2)
โรงอาหาร	2 (2.8)	4 (3.3)	3 (3.4)	9 (3.2)
สนามกีฬา	5 (6.9)	8 (6.7)	8 (9.1)	21 (7.5)
สวนหย่อม	5 (6.9)	6 (5.0)	7 (8.0)	18 (6.4)
บนคาเฟ่	6 (8.3)	9 (7.5)	3 (3.4)	18 (6.4)
หอพัก	29 (40.3)	37 (30.8)	41 (46.6)	107 (38.2)
ศูนย์อาหารและบริการ	5 (6.9)	11 (9.2)	4 (4.5)	20 (7.1)
ห้องปฏิบัติการ	0 (0.00)	3 (2.5)	1 (1.1)	4 (1.4)
บริเวณที่จัดกิจกรรม	0 (0.00)	2 (1.7)	0 (0.00)	2 (.7)
หอศิลป์	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (1.1)	1 (.4)
บึงสีฐาน	0 (0.00)	1 (.8)	0 (0.00)	1 (.4)
รวม	72 (100)	120 (100)	88 (100)	280 (100)

($p \geq .05$, $df = 24$, Asymp.Sig = .741, $\chi^2 = 19.210$)

จากตารางที่ 29 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัยพบว่า สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัยกับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4.3.5 กระบวนพฤติกรรมในการดื่มสุราในแต่ละครั้ง

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของกระบวนพฤติกรรมในการดื่มสุรา ซึ่งกระบวนพฤติกรรมการดื่มสุราในแต่ละครั้งได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

- 1) พฤติกรรมในช่วงก่อนดื่มสุรา
- 2) พฤติกรรมในช่วงขณะดื่มสุรา
- 3) พฤติกรรมในช่วงหลังดื่ม

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พฤติกรรมในช่วงก่อนดื่มสุรา

พฤติกรรมการดื่มสุราในช่วงก่อนดื่มสุราประกอบไปด้วย โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา สาเหตุที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา แหล่งซื้อสุรา บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 30)

ตารางที่ 30 โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา

โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
อยู่คนเดียว	11 (5.5)	11 (2.7)	7 (2.7)	29 (3.3)
ไปเที่ยวกับเพื่อน	52 (26.1)	63 (15.2)	49 (19.1)	164 (18.8)
ร่วมงานวันเกิดกับเพื่อน	30 (15.1)	68 (16.4)	48 (18.7)	146 (16.8)
สอบเสร็จ	31 (15.6)	72 (17.3)	39 (15.2)	142 (16.3)
ร่วมการแข่งขันกีฬา	0 (0.00)	17 (4.1)	9 (3.5)	26 (3.0)
ทำรายงาน/ฝึกปฏิบัติงาน	9 (4.5)	12 (2.9)	5 (1.9)	26 (3.0)
รับประทานอาหารกับเพื่อน	3 (1.5)	16 (3.9)	9 (3.5)	28 (3.2)
ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน	41 (20.6)	82 (19.8)	69 (26.8)	192 (22.0)
ร่วมงานบุญประเพณี	5 (2.5)	42 (10.1)	11 (4.3)	58 (6.7)
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน	1 (.5)	9 (2.2)	2 (.8)	12 (1.4)
ไปศึกษาดูงาน/สัมมนา	7 (3.5)	9 (2.2)	1 (.4)	17 (2.0)
กิจกรรมรับน้องใหม่	1 (.5)	5 (1.2)	3 (1.2)	9 (1.0)

ตารางที่ 30 โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา (ต่อ)

โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
กิจกรรมเข้าเชียร์น้องใหม่	1 (.5)	5 (1.2)	0 (0.00)	6 (.7)
เลี้ยงสายรหัส	3 (1.5)	2 (.5)	2 (.8)	7 (.8)
ฉลองเทศกาลสำคัญ	1 (.5)	2 (.5)	0 (0.00)	3 (.3)
ออกค่าย	2 (1.0)	0 (0.00)	2 (.8)	4 (.5)
ไม่มีอะไรทำ	1 (.5)	0 (0.00)	1 (.4)	2 (.2)
รวม	199 (100)	415 (100)	257 (100)	871 (100)

($p \geq .05$, $df = 32$, $Asymp.Sig = .000$, $\chi^2 = 67.583$)

จากตารางที่ 30 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของโอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา พบว่า โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2) สาเหตุที่ดื่มสุรา

จากการศึกษาความเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ สาเหตุที่ดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 31)

ตารางที่ 31 สาเหตุที่ดื่มสุรา

สาเหตุที่ดื่มสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เพื่อนชวน	52 (33.3)	94 (31.3)	60 (28.4)	206 (30.9)
อยากทดลอง	24 (15.4)	31 (10.3)	29 (13.7)	84 (12.6)
เพื่อเข้าสังคม	39 (25.0)	79 (2.3)	47 (.5)	165 (24.7)
เพื่อความโก้โก้	4 (2.6)	7 (2.3)	1 (.5)	12 (1.8)
มีคนบังคับ	7 (4.5)	15 (5.0)	8 (3.8)	30 (4.5)
คลายเครียด/วิตกกังวล	15 (9.6)	33 (11.0)	36 (17.1)	84 (12.6)
เพื่อความเป็นผู้ใหญ่	2 (1.3)	7 (2.3)	1 (.5)	6 (.9)
ดื่มตามสื่อโฆษณา/ละคร โทรทัศน์	1 (.6)	4 (1.3)	1 (.5)	6 (.9)
เพื่อสร้างความมั่นใจ	1 (.6)	7 (2.3)	6 (2.8)	14 (2.1)
ออกหัก	5 (3.2)	10 (3.3)	9 (4.3)	24 (3.6)
กิจกรรมรับน้องใหม่	1 (.6)	2 (.7)	4 (1.9)	7 (1.0)
เทศกาลสำคัญ	1 (.6)	1 (.3)	1 (.5)	3 (.4)

ตารางที่ 31 สาเหตุที่ดื่มสุรา (ต่อ)

สาเหตุที่ดื่มสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
อยากดื่มเอง	0 (0.00)	3 (1.0)	2 (.9)	5 (.7)
ตามสังคมที่บ้าน	0 (0.00)	1 (.3)	2 (.9)	3 (.4)
เลี้ยงชีพบังคับ	3 (1.9)	1 (.3)	2 (.9)	6 (.9)
รวม	156 (100)	300 (100)	211 (100)	667 (100)

($p \geq .05$, $df = 32$, $Asymp.Sig = .582$, $\chi^2 = 29.731$)

จากตารางที่ 31 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ สาเหตุที่ดื่ม พบว่า สาเหตุที่ดื่มสุรา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

3) แหล่งที่ซื้อสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ แหล่งที่ซื้อสุรา ผลการศึกษาคือเป็นดังนี้(ตารางที่ 32)

ตารางที่ 32 แหล่งที่ซื้อสุรา

แหล่งที่ซื้อสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ร้านสะดวกซื้อ 24 น.	54 (29.8)	94 (26.3)	66 (26.8)	214 (27.3)
ร้านขายของชำ	34 (18.8)	94 (26.3)	63 (25.6)	191 (24.4)
ซูเปอร์มาร์เก็ต	30 (16.6)	63 (17.6)	40 (16.3)	133 (17.0)
ผับ/บาร์	32 (17.7)	57 (16.0)	43 (17.5)	132 (16.8)
ร้านอาหารที่มีสุราขาย	27 (14.9)	45 (12.6)	27 (11.0)	99 (12.6)
ไม่เคยซื้อเอง	4 (2.2)	4 (1.1)	7 (2.8)	15 (1.9)
รวม	181 (100)	357 (100)	246 (100)	784 (100)

($p \geq .05$, $df = 10$, Asymp.Sig = .654, $\chi^2 = 7.745$)

จากตารางที่ 32 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ แหล่งที่ซื้อสุรา พบว่า แหล่งที่ซื้อสุรา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4) บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของบุคคลที่ร่วมดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 33)

ตารางที่ 33 พฤติกรรมในการดื่มสุราในช่วงก่อนดื่มสุรา

บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
บิดา-มารดา	19 (14.1)	9 (3.8)	7 (4.5)	35 (6.7)
อาจารย์	3 (2.2)	1 (.4)	1 (.6)	5 (1.0)
เพื่อน	85 (63.0)	152 (64.1)	101 (65.6)	338 (64.3)
ญาติ-พี่น้อง	13 (9.6)	34 (14.3)	15 (9.7)	62 (11.8)
แฟน	7 (5.2)	30 (12.7)	24 (15.6)	61 (11.6)
คนเดียว	8 (5.9)	11 (4.6)	6 (3.9)	25 (4.8)
รวม	135 (100)	237 (100)	154 (100)	526 (100)

($p \geq .05$, $df = 10$, Asymp.Sig = .002, $\chi^2 = 28.483$)

จากตารางที่ 33 จากการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา พบว่า บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5) กิจกรรมระหว่างการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของกิจกรรมระหว่างการดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 34)

ตารางที่ 34 กิจกรรมระหว่างการดื่มสุรา

กิจกรรมระหว่างการดื่ม สุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ร้องเพลง	46 (28.2)	80 (21.2)	52 (23.3)	178 (23.3)
ฟังเพลง	48 (29.4)	107 (28.3)	77 (34.5)	232 (30.4)
ทำงานส่วนตัว	4 (2.5)	6 (1.6)	1 (.4)	11 (1.4)
ทำงานหารายได้	1 (.6)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (.1)
เล่นสนุกเกอร์	0 (0.00)	7 (1.9)	1 (.4)	8 (1.0)
ดูฟุตบอล	6 (3.7)	38 (10.1)	10 (4.5)	54 (7.1)
ทำรายงาน/ฝึกปฏิบัติงาน	1 (.6)	3 (.8)	1 (.4)	5 (.7)
ดูโคโยตี้	8 (4.9)	30 (7.9)	9 (4.0)	47 (6.2)
เล่นดนตรี	3 (1.8)	14 (3.7)	8 (3.6)	25 (3.3)
คุยกับเพื่อน	38 (23.3)	73 (19.3)	53 (23.8)	164 (21.5)

ตารางที่ 34 กิจกรรมระหว่างการดื่มสุรา (ต่อ)

กิจกรรมระหว่างการ ดื่มสุรา(ต่อ)	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เล่นกีฬา	0 (0.00)	3 (.8)	2 (.9)	5 (.7)
ไปศึกษาดูงาน/สัมมนา	1 (.6)	1 (.3)	1 (.4)	3 (.4)
ทำกิจกรรมใน มหาวิทยาลัย	0 (0.00)	3 (.8)	1 (.4)	4 (.5)
กิจกรรมรับน้องใหม่	0 (0.00)	2 (.5)	2 (.9)	4 (.5)
เล่นการพนัน	0 (0.00)	3 (.8)	2 (.9)	5 (.7)
ดูโทรทัศน์	1 (.6)	2 (.5)	1 (.4)	4 (.5)
คุยกับผู้ปกครอง	3 (1.8)	2 (.5)	0 (0.00)	5 (.7)
รวม	163 (100)	378 (100)	223 (100)	764 (100)

($p \geq .05$, $df = 34$, $Asymp.Sig = .115$, $\chi^2 = 44.109$)

จากตารางที่ 34 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ กิจกรรมระหว่างการดื่มสุรา พบว่า กิจกรรมระหว่างการดื่มสุรา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

6) วิธีการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของวิธีการดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 35)

ตารางที่ 35 วิธีการดื่มสุรา

วิธีการดื่มสุรา	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ดื่มโดยไม่ผสมอย่างอื่นหรือดื่มเพียวๆ	21 (14.5)	42 (16.5)	19 (11.5)	82 (14.5)
ผสมโซดา	60 (41.4)	113 (44.5)	64 (38.8)	237 (42.0)
ผสมน้ำเปล่า	20 (13.8)	39 (15.4)	24 (14.5)	83 (14.7)
ผสมน้ำอัดลม	44 (30.3)	57 (22.4)	57 (34.5)	158 (28.0)
อื่นๆโปรดระบุ - ผสมน้ำผลไม้	0 (0.00)	3 (1.2)	1 (.6)	4 (.7)
รวม	145 (100)	254 (100)	165 (100)	564 (100)

($p \geq .05$, $df = 8$, Asymp.Sig = .255, $\chi^2 = 10.145$)

จากตารางที่ 35 จากการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ วิธีการดื่มสุรา พบว่า วิธีการดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

7) ปริมาณการดื่มสุราในแต่ละครั้ง

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียน
ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของ ปริมาณการดื่มสุราในแต่ละครั้ง ผลการศึกษาเป็นดังนี้
(ตารางที่ 36)

ตารางที่ 36 ปริมาณการดื่มสุราในแต่ละครั้ง

ปริมาณการดื่มสุราใน แต่ละครั้ง	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
หนึ่งก๊	9 (8.9)	15 (9.4)	11 (9.6)	35 (9.4)
หนึ่งแก้ว	44 (43.6)	29 (18.2)	22 (19.3)	95 (25.4)
หนึ่งก๊	6 (5.9)	2 (1.3)	2 (1.8)	10 (2.7)
หนึ่งแบน	15 (14.9)	27 (17.0)	16 (14.0)	58 (15.5)
หนึ่งกลม/ขวด	17 (16.8)	43 (27.0)	43 (37.7)	103 (27.5)
สองกลม/ขวด	5 (5.0)	16 (10.1)	11 (9.6)	32 (8.6)
สามกลม/ขวด	3 (3.0)	22 (13.8)	7 (6.1)	32 (8.6)
3 - 4 แก้ว	1 (1.0)	2 (1.3)	0 (0.00)	3 (.8)
6 ขวด	0 (0.00)	1 (.6)	0 (0.00)	1 (.3)
5 - 6 ลัง	0 (0.00)	1 (.6)	0 (0.00)	1 (.3)

ตารางที่ 36 ปริมาณการดื่มสุราในแต่ละครั้ง (ต่อ)

ปริมาณการดื่มสุราใน แต่ละครั้ง (ต่อ)	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
แล้วแต่จำนวนเงิน	1 (1.0)	1 (.6)	2 (.5)	4 (1.1)
รวม	101 (100)	159 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 20$, $Asymp.Sig = .000$, $\chi^2 = 49.163$)

จากตารางที่ 36 จากการศึกษเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของปริมาณการดื่มสุราในแต่ละครั้ง พบว่า ปริมาณการดื่มสุราในแต่ละครั้ง กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8) การใช้สารเสพติดขณะดื่มสุรา

จากการศึกษาความเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับ การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของการใช้สารเสพติดขณะดื่มสุราผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 37)

ตารางที่ 37 การใช้สารเสพติดขณะดื่มสุรา

การใช้สารเสพติดขณะดื่ม สุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เคย	12 (11.8)	28 (17.7)	21 (18.4)	61 (16.3)
ไม่เคย	90 (88.2)	130 (82.3)	93 (81.6)	313 (83.7)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 2$, $Asymp.Sig = .342$, $\chi^2 = 2.147$)

จากตารางที่ 37 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ การใช้สารเสพติดขณะดื่มสุรา พบว่า การใช้สารเสพติดขณะดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

9) สารเสพติดที่ใช้ขณะดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของสารเสพติดที่ใช้ขณะดื่มสุราผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 38)

ตารางที่ 38 สารเสพติดใดที่ใช้ขณะดื่มสุรา

สารเสพติดใดที่ใช้ขณะดื่มสุรา	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
บุหรี่	10 (71.4)	28 (84.8)	21 (91.3)	59 (84.3)
กัญชา	4 (28.6)	5 (15.2)	2 (8.7)	11 (15.7)
รวม	14 (100)	33 (100)	23 (100)	70 (100)

($p \geq .05$, $df = 2$, $Asymp.Sig = .271$, $\chi^2 = 2.611$)

จากตารางที่ 38 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ สารเสพติดที่ใช้ขณะดื่มสุรา พบว่า สารเสพติดที่ใช้ขณะดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

10) พฤติกรรมในช่วงหลังดื่มสุรา

พฤติกรรมในการดื่มสุราในช่วงหลังดื่มสุรา ประกอบไปด้วย แหล่งเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา ระยะเวลาในการดื่มสุรา ความรู้สึกหลังจากดื่มสุรา ดื่มสุราเพียงใดถึงพอ การดื่มสุรากับผลการเรียน การดื่มสุราในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

11) ที่มาของเงินที่จ่ายในการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของ แหล่งเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 39)

ตารางที่ 39 แหล่งเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา

แหล่งเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
เงินส่วนตัวที่เก็บสะสม	69 (58.5)	104 (54.4)	74 (51.4)	247 (54.5)
เจียดเงินรายวันที่ใช้ไปเรียนหนังสือ	34 (28.8)	48 (25.1)	44 (30.6)	126 (27.8)
รายได้จากการทำงาน	3 (2.5)	13 (6.8)	10 (6.9)	26 (5.7)
ยืมจากเพื่อน	3 (2.5)	14 (6.8)	7 (6.9)	24 (5.3)
เงินจากการกู้ยืมการศึกษา/ เงินทุนการศึกษา	3 (2.5)	3 (1.6)	0 (0.00)	6 (1.3)
มีแต่เพื่อนเลี้ยง	2 (1.7)	5 (2.6)	7 (4.9)	14 (3.1)
ผู้ปกครอง ญาติ ชื้อ	4 (3.4)	4 (2.1)	2 (1.4)	10 (2.2)
รวม	118 (100)	191 (100)	144 (100)	453 (100)

($p \geq .05$, $df = 12$, $Asymp.Sig = .273$, $\chi^2 = 14.453$)

จากตารางที่ 39 จากการศึกษเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ แหล่งเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา พบว่า แหล่งเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

12) ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 40)

ตารางที่ 40 ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา

ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ฟรี	21 (20.6)	30 (19.0)	21 (18.4)	72 (19.3)
ต่ำกว่า 100 บาท	21 (20.6)	15 (9.5)	13 (11.4)	49 (13.1)
100 – 200 บาท	41 (40.2)	75 (47.5)	43 (37.7)	159 (42.5)
201 – 400 บาท	14 (13.7)	15 (9.5)	26 (22.8)	55 (14.7)
401 – 600 บาท	0 (0.00)	12 (7.6)	4 (3.5)	16 (4.3)
601 – 800 บาท	0 (0.00)	2 (1.3)	1 (.9)	3 (.8)
801 – 1,000 บาท	5 (4.9)	6 (3.8)	3 (2.6)	14 (3.7)
มากกว่า 1,000 บาท	0 (0.00)	3 (1.9)	3 (2.6)	6 (1.6)
รวม	101 (100)	159 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 14$, Asymp.Sig = .010, $\chi^2 = 29.106$)

จากตารางที่ 40 จากการศึกษเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

13) กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษากับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของกิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 41)

ตารางที่ 41 กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา

กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่ม สุรา	การเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
กลับบ้าน/หอพัก	50 (33.3)	92 (34.6)	78 (37.3)	220 (35.2)
เล่นเกม	9 (6.0)	9 (3.4)	9 (4.3)	27 (4.3)
กินข้าว	7 (4.7)	31 (11.7)	34 (16.3)	72 (11.5)
หารายได้พิเศษ	1 (.7)	1 (.4)	1 (.5)	3 (.5)
นอนหลับ	70 (46.7)	110 (41.4)	69 (33.0)	249 (39.8)
ทะเลาะวิวาท	1 (.7)	1 (.4)	0 (0.00)	2 (.3)
ทำรายงาน/ทำงานที่ เกี่ยวกับการเรียน	1 (.7)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (.2)
มีเพศสัมพันธ์	4 (2.7)	7 (2.6)	6 (2.9)	17 (2.7)
เล่นดนตรี	4 (2.7)	3 (1.1)	3 (1.4)	10 (1.6)
เล่นการพนัน	2 (1.3)	11 (4.1)	9 (4.3)	22 (3.5)
ร้องเพลง	1 (.7)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (.2)
โทรศัพท์หาแฟน	0 (0.00)	1 (.4)	0 (0.00)	1 (.2)
รวม	150 (100)	266 (100)	209 (100)	625 (100)

($p \geq .05$, $df = 22$, Asymp.Sig = .123, $\chi^2 = 29.826$)

จากตารางที่ 41 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา พบว่า กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

14) ระยะเวลาในการดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของ ระยะเวลาในการดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 42)

ตารางที่ 42 ระยะเวลาในการดื่มสุรา

ระยะเวลาในการดื่มสุรา	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง	20 (19.6)	14 (8.9)	13 (11.4)	47 (12.6)
มากกว่าครึ่งชั่วโมง – 1 ชั่วโมง	7 (6.9)	8 (5.1)	12 (10.5)	27 (7.2)
มากกว่า 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง	30 (29.4)	20 (12.7)	13 (11.4)	63 (16.8)
มากกว่า 2 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมง	20 (19.6)	41 (25.9)	30 (26.3)	91 (24.3)
มากกว่า 4 ชั่วโมง – 5 ชั่วโมง	20 (19.6)	34 (21.5)	21 (18.4)	75 (20.1)
มากกว่า 5 ชั่วโมง – 6 ชั่วโมง	5 (4.9)	41 (25.9)	25 (21.9)	71 (19.0)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 10$, Asymp.Sig = .000, $\chi^2 = 38.681$)

จากตารางที่ 42 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ ระยะเวลาในการดื่มสุรา พบว่า ระยะเวลาในการดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

15) ความรู้สึกลังจากดื่มสุรา

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษากับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของความรู้สึกลังจากดื่มสุรา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 43)

ตารางที่ 43 ความรู้สึกลังจากดื่มสุรา

ความรู้สึกลังจากดื่มสุรา	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
สนุกสนานรื่นเริง	41 (37.3)	81 (41.5)	64 (41.0)	186 (40.3)
พอใจในรสชาติ	17 (28.3)	25 (12.8)	18 (11.5)	60 (13.0)
ไม่ประทับใจ	16 (14.5)	24 (12.3)	21 (13.5)	61 (13.2)
เฉยๆ	35 (31.8)	60 (30.8)	51 (32.7)	146 (31.7)
ไม่คิดต่อร่างกาย	1 (.9)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (.2)
เมา	0 (0.00)	3 (1.5)	2 (1.3)	5 (.4)
อาเจียน	0 (0.00)	2 (1.0)	0 (0.00)	2 (.4)
รวม	110 (100)	195 (100)	156 (100)	461 (100)

($p \geq .05$, $df = 12$, Asymp.Sig = .700, $\chi^2 = 9.030$)

จากตารางที่ 43 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ ความรู้สึกล้างจากดื่มสุรา พบว่า ความรู้สึกล้างจากดื่มสุรา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

16) อาการที่ทำให้เลิกดื่มสุราในแต่ละครั้ง

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของอาการที่ทำให้เลิกดื่มสุราในแต่ละครั้ง ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ (ตารางที่ 44)

ตารางที่ 44 อาการที่ทำให้เลิกดื่มสุราในแต่ละครั้ง

อาการที่ทำให้เลิกดื่มสุราในแต่ละครั้ง	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ดื่มหนักน้อยเพียงรู้สึก	39 (38.2)	42 (26.6)	45 (39.5)	126 (33.7)
เริ่มรู้สึกมีศีรษะจึ้งพ้อ	47 (46.1)	69 (43.7)	40 (35.1)	156 (41.7)
ดื่มจนรู้สึกสนุก	8 (7.8)	28 (17.7)	23 (20.2)	59 (15.8)
ดื่มจนเมามาย	6 (5.9)	18 (11.4)	6 (5.3)	30 (8.0)
อาเจียน	1 (1.0)	1 (.6)	0 (0.00)	2 (.5)
ปวดหัว	1 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (.3)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 10$, $Asymp.Sig = .036$, $\chi^2 = 19.369$)

จากตารางที่ 44 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ อาการที่ทำให้เลิกดื่มสุราในแต่ละครั้งพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

17) สุรากับผลการเรียน

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของสุรากับผลการเรียน ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 45)

ตารางที่ 45 สุรากับผลการเรียน

สุรากับผลการเรียน	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ผลการเรียนดีขึ้น	5 (4.9)	7 (4.4)	4 (3.5)	16 (4.3)
ผลการเรียนแย่ลง	14 (13.7)	24 (15.2)	20 (17.5)	58 (15.5)
ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน	83 (81.4)	127 (80.4)	90 (78.9)	300 (80.2)
รวม	101 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 4$, $Asymp.Sig = .935$, $\chi^2 = .823$)

จากตารางที่ 45 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของ สุรากับผลการเรียน พบว่า สุรากับผลการเรียน กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

18) การดื่มสุราในอนาคต

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษากับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในเรื่องของการดื่มสุราในอนาคต ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (ตารางที่ 46)

ตารางที่ 46 การดื่มสุราในอนาคต

การดื่มสุราในอนาคต	การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน			รวม
	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศาสตร์	
ไม่ดื่มเลย	21 (20.6)	22 (17.2)	23 (16.0)	66 (17.6)
ดื่บบ้างเป็นบางครั้ง	79 (77.5)	131 (78.9)	90 (83.3)	300 (80.2)
ดื่มเป็นประจำ	2 (2.0)	5 (3.9)	1 (.7)	8 (2.1)
รวม	102 (100)	158 (100)	114 (100)	374 (100)

($p \geq .05$, $df = 4$, $Asymp.Sig = .363$, $\chi^2 = 4.322$)

จากตารางที่ 46 จากการศึกษเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษากับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันในเรื่องของการดื่มสุราในอนาคต พบว่า การดื่มสุราในอนาคตกับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้นโดยสรุป ในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ พบว่า

1) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในพฤติกรรมการดื่มสุรา เรื่องที่เกี่ยวกับ ช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่มสุรา ชนิดของสุราที่ดื่มในครั้งแรก บุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วยในครั้งแรก ความรู้สึกในการดื่มสุราในครั้งแรก ปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก ชนิดของสุราที่ดื่มในปัจจุบัน ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน ช่วงเวลาในการดื่มสุราในปัจจุบัน โอกาส/เหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การดื่มสุรา

บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา ปริมาณในการดื่มสุราในแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการดื่มสุราในแต่ละครั้ง อาการที่ทำให้เลิกดื่มสุราในแต่ละครั้ง

2) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ในพฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา ในเรื่องเกี่ยวกับ สาเหตุของการดื่มสุราในครั้งแรก รสชาติของสุราที่ดื่มครั้งแรก เหตุผลที่ชอบดื่มสุราในปัจจุบัน สถานที่ในการดื่มสุรา การดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัย สาเหตุที่ดื่มสุราในปัจจุบัน แหล่งที่ซื้อสุรา กิจกรรมที่ทำระหว่างดื่มสุรา วิธีการดื่มสุรา การใช้สาร หรือ สิ่งเสพติดที่ใช้ในขณะที่ดื่มสุรา แหล่งเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา ความรู้สึกหลังจากการดื่มสุรา สุรากับผลการเรียน การดื่มสุราในอนาคต

4.4 การอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาผลวิเคราะห์ การศึกษาพฤติกรรมกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2550 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์ในการดื่มสุรา จำนวน 374 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยพฤติกรรมกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมในการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์โดยลำดับดังนี้

4.4.1 พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในภาพรวมอภิปรายได้ดังนี้

1) ในภาพรวม จากการที่ค้นพบว่า ส่วนใหญ่เริ่มดื่มสุราครั้งแรกอายุ 18 ปี ซึ่งในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญอยู่ 2 อย่างคือ การเลิยงฉลองเข้ามหาวิทยาลัย และกิจกรรมรับน้อง และเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาส่วนใหญ่ มีอิสระในการดูแลตนเอง ซึ่งนักศึกษาบางคนอยู่ไกลจากผู้ปกครอง และเมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาทุกคนจะมีกิจกรรมรับน้อง และรุ่นพี่หลายคนจะมีการเลี้ยงน้อง ในการเลี้ยงน้องที่ปรากฏโดยทั่วไปจะมีการเลี้ยงสุรากับ โดยเฉพาะรุ่นพี่ผู้ชาย กับ รุ่นพี่ผู้ชาย เพราะการดื่มสุราเป็นเรื่องปกติของการเลี้ยงสังสรรค์ (พงษ์สันต์ เขียมอ่อน, 2550 อ้างถึง เทพินทร์ พัชราณรงค์, 2541) ในการรับน้องของนักศึกษาบางคนก็ยังมีแอบให้สุราน้องดื่มด้วย ซึ่งน่าจะมีการวิจัยในเชิงลึกว่าเหตุการณ์เหล่านี้สัมพันธ์กับอายุเริ่มต้นของการดื่มสุราของนักศึกษาจริงหรือไม่

2) การที่พบว่าสาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก เนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า อยากลอง สอดคล้องกับ ณัฐพงศ์ บุญโนนแต่ อ้างถึงทรงเกียรติ ปิยะกะ และเวทิน ศันสนียเวทย์ (2540) ที่กล่าวว่า วัยรุ่นชอบลองของแปลกๆใหม่ๆ ชอบเสี่ยงภัยและชอบความตื่นเต้นหวาดเสียว

3) กรณีที่พบว่านักศึกษาชอบดื่ม ไวน์/สเปย์ ซึ่งไม่ใช่สุราของไทยแต่เป็นเครื่องดื่มสุราของต่างประเทศ สอดคล้อง (ณัฐพงศ์ บุญโนนแต่และคณะ, 2546 อ้างถึงในสุวิทย์ รุ่งวิสัย) ได้กล่าวถึง ตัวอย่างจากสื่อ ได้แก่ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเครื่องดื่มไวน์/สเปย์ มีการโฆษณาในสื่อทางโทรทัศน์ ตามนิตยสารและหนังสือต่างๆเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีบรรจุกัญหาก็ดีหรือสวยงาม จึงอาจทำให้เกิดความอยากลอง และ ที่สำคัญ ไวน์/สเปย์ มีดีกรีของแอลกอฮอล์ค่อนข้างต่ำ เช่น ไวน์ขาว มีดีกรี 8 ดีกรี ไวน์แดง 6-14 ดีกรี (ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น สถาบันรัฐบุรุษ, 2548 อ้างถึงใน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า, 2547) ทำให้สามารถดื่มได้ง่ายดังนั้นจึงไม่แปลกที่นักศึกษาระบุว่าเมื่อดื่มสุราครั้งแรกรู้สึกเฉยๆ เพราะดีกรีของไวน์/สเปย์นั้นไม่แรงเมื่อเทียบกับพวกสุรา ซึ่งมีดีกรีตั้งแต่ 35 – 40 ดีกรีขึ้นไป แต่การดื่มในปัจจุบันนักศึกษส่วนใหญ่ชอบดื่มสุราต่างประเทศ (ริเคอร์) ซึ่งจะมีดีกรีตั้งแต่ 35 – 60 ดีกรี แสดงให้เห็นว่ายิ่งนักศึกษามีประสบการณ์มากขึ้นก็จะสามารถดื่มสุราที่มีดีกรีมากขึ้น (บทที่ 2)

4) จากการที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า เวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ดื่มสุรา คือ เวลากลางคืน ตามผับ หรือ เคาท์ และใช้เวลาครั้งละ 2 -3 ชั่วโมง ร้านขายสุราที่เปิดอยู่เป็นจำนวนมาก และ หาซื้อสุราได้ตามร้านสะดวกซื้อ ที่มีสุราขาย 24 ชั่วโมง ในกรณีนี้ผู้วิจัยพบว่า (ภาพที่ 8) บริเวณรอบรั้วด้านข้างมหาวิทยาลัย ฟังทางด้านคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ด้านตลาดเจ็พร์ จะมีผับ หรือ เคาท์ ร้านขายสุราเปิดอยู่เป็นจำนวนมากหลากหลายรูปแบบ ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเลือกดื่มได้ตามอัธยาศัย หรือถ้ามีอายุ 18 ปีขึ้นไป ระยะทางที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับตัวเมือง จังหวัดขอนแก่น ก็ไม่ไกลมาก นักศึกษาสามารถไปถึงได้อย่างสะดวกโดยใช้รถจักรยานยนต์ (บทที่ 2 หน้า 30)

5) การที่พบว่า นักศึกษาจำนวนเกินครึ่งหนึ่งเล็กน้อย (51.1%) เปิดเผยว่า เคยดื่มสุราในบริเวณ หอพักของมหาวิทยาลัย ในเรื่องนี้เมื่อศึกษาระบบหอพักของนักศึกษา พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสวัสดิการในการบริการหอพักในบริเวณมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา เป็นจำนวนมากเช่น หอพักชายมี 12 หอพัก หอพักหญิงมี 15 หอ หอแต่ละหอจะจุนักศึกษาได้ประมาณ 250 คน/หอ และราคาถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับหอพักเอกชนที่เปิดข้างๆบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งหอพักชาย ประตูหอพักชายจะไม่มีเวลาปิดเปิด จะเปิด 24 ชั่วโมง ในส่วนของหอพักหญิงจะมีเวลาเปิดปิดหอพัก คือ 05.00 – 23.00 น.ที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา

โตแล้ว มีความรับผิดชอบที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ ดังนั้นจึงไม่มีเวลาตรวจหอ หรือเข้มงวด กับ กิจกรรมที่นักศึกษาทำให้หอพักอย่างเคร่งครัดเหมือนกับหอพักของนักเรียน ดังนั้นจึงมีความ เป็นไปได้ที่จะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเปิดเผยว่า เคยดื่มสุราในบริเวณหอพักของมหาวิทยาลัย

6) จากการที่พบว่า นักศึกษาบอกว่าการดื่มแต่ละครั้งจะเป็นการดื่มในช่วงกลางคืน ใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง และเลิกดื่มเมื่อรู้สึกเริ่มมีน้ศีรษะ และเมื่อเลิกดื่มแล้วก็จะกลับไปนอนหลับ ในขณะที่นักศึกษา กลุ่มที่ดื่มสุรา (80.21%) บอกว่าการดื่มสุราไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา การค้นพบ ทั้งสองเรื่องขัดแย้งกันอยู่ในตัว ตามหลักวิชาการแล้ว การดื่มสุราตั้งแต่มีอาการมีนหรือเมา (ศูนย์บำบัด ยาเสพติดขอนแก่น สถาบันธัญญารักษ์, 2548) จะมีผลทำให้สมองเสื่อมนึกคิดอะไรได้ช้าลง ซึ่ง สอดคล้องกับจินตนา วงศ์วาน (2548) อ้างถึงใน สุพัฒน์ ชีรเวชเจริญชัย (2541) ดังนั้นน่าจะมผลกระทบต่อ ใช้สมองในการเรียนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างแน่นอน รวมทั้งการใช้เวลาดื่ม 2 - 3 ชั่วโมงใน เวลากลางคืนแล้ว ส่วนใหญ่กลับไปนอนหลับ ก็ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า เวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่มักใช้ ทบทวนการเรียนหรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจะขาดหายไป การดื่มสุราจึงน่าจะมผลกระทบต่อการศึกษา

7) จากการที่ค้นพบว่า นักศึกษากลุ่มที่มีประสบการณ์การดื่มสุราบอกว่าในอนาคต นักศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มที่ดื่มสุรา (80.2%) ก็ยังคงดื่มสุราต่อไป ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ รายงานขององค์การอนามัยโลก – WHO (อ้างถึงใน ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น สถาบันธัญญารักษ์, 2548) ซึ่งกล่าวว่า เมื่อดื่มจนติดนิสัยแล้วจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงการดื่มต่อไปเรื่อยๆ

4.4.2 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมในการดื่มสุราของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมในการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ อธิบายได้ดังต่อไปนี้

1) จากการที่พบว่า พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ ช่วงอายุที่มี ประสบการณ์ครั้งแรกในการดื่มสุรา ชนิดของสุราที่ดื่มในครั้งแรก บุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้วยในครั้งแรก ความรู้สึกในการดื่มสุราในครั้งแรก ปริมาณในการดื่มสุราในครั้งแรก ชนิดของสุราที่ดื่มใน ปัจจุบัน ความถี่ในการดื่มสุราในปัจจุบัน ช่วงเวลาในการดื่มสุราในปัจจุบัน โอกาส/เหตุการณ์ที่จะ นำไปสู่การดื่มสุรา บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา ปริมาณในการดื่มสุราในแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการดื่มสุรา ในแต่ละครั้ง อาการที่ทำให้เลิกดื่มสุราในแต่ละครั้ง กับ การเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำให้มองเห็นภาพว่า การที่นักศึกษาจะมี

พฤติกรรมการดื่มสุราข้างต้นเป็นอย่างไร จะขึ้นอยู่กับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาไหน ทั้งนี้สาเหตุประการหนึ่ง เป็นเพราะรูปแบบของการเรียนของกลุ่มสาขาวิชาของทั้ง 3 กลุ่ม สาขาวิชา ซึ่งการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาขานั้นมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีการเรียนการสอนที่เน้นไปทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการค้นคว้า ทดลองและประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุคสมัย และกลุ่มสังคมศาสตร์ จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านพัฒนาสังคม การเรียนรู้พฤติกรรมและศิลปะแขนงต่างๆ ดังนั้นสิ่งที่เรียน สิ่งรู้ ลักษณะของการใช้ชีวิต ในรูปแบบการเรียนการสอน เป็นอิทธิพลที่ทำให้แตกต่างกันได้

2) จากการที่พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกันใน พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ

(1) สาเหตุของการดื่มสุราในครั้งแรก รสชาติของสุราที่ดื่มครั้งแรก เหตุผลที่ชอบดื่มสุราในปัจจุบัน สถานที่ในการดื่มสุรา การดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย สถานที่ในการดื่มสุราในมหาวิทยาลัย สาเหตุที่ดื่มสุราในปัจจุบัน แหล่งที่ซื้อสุรา กิจกรรมที่ทำระหว่างดื่มสุรา วิธีการดื่มสุรา การใช้สาร/สิ่งเสพติดที่ใช้ในขณะที่ดื่มสุรา แหล่งเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรา กิจกรรมที่ทำหลังจากดื่มสุรา ความรู้สึกหลังจากการดื่มสุรา สุรากับผลการเรียน การดื่มสุราในอนาคต การที่ค้นพบเช่นนี้เป็นไปได้ว่า นักศึกษาเป็นคนที่มียุคอายุจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายกับวัยผู้ใหญ่ คนในวัยนี้มีความอยากรู้อยากทดลองในทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าวัยอื่น และวัยรุ่นระยะนี้จะต้องความเป็นอิสระ เพราะวัยรุ่นพยายามจะพิสูจน์ตัวเองกับกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมดังกล่าว เช่น การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด และขับรถโดยไม่มีความระมัดระวัง (ฉัฐพงศ์ บุญโนนแต่, 2546) ดังนั้นจึงพบว่าถึงแม้จะเรียนอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันแต่เหตุผลในการดื่มสุราในครั้งแรกนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกัน

(2) สถานที่ในการดื่มสุรา การดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย และแหล่งซื้อสุราพบว่า สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละหอพักจะมีหลายคณะวิชาพักปนกัน ไม่ได้แบ่งแยกหอพักออกเป็นแต่ละคณะ ที่น่าสังเกตพบว่าการร่วมวงดื่มสุราของไม่มีการแยกคณะวิชา ซึ่งใครถูกอภัยยศก็สามารถดื่มกินร่วมวงเดียวกันได้ ฉะนั้นเราจึงพบว่า ความแตกต่างเกี่ยวกับสถานที่ในการดื่มสุรา และการดื่มสุราในบริเวณมหาวิทยาลัย

(3) กิจกรรมที่ทำหลังดื่มสุราที่พบว่า นักศึกษาจะกลับไปนอนหลับคล้ายกันทุกกลุ่มสาขาวิชา น่าจะเป็นเรื่องของต่อร่างกายที่ทุกคนจะมีอาการเหมือนกัน คือ ง่วงนอน (จินตนา วงศ์วาน, 2548 อ้างถึงใน สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, 2541) พบว่าการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุรา

(4) สำหรับการที่พบว่า นักศึกษาที่เรียนอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน แต่จะให้คำตอบที่เหมือนกันว่า การดื่มสุรานั้น ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน และในอนาคตก็จะดื่มสุราต่อไปเรื่อยๆ ข้อค้นพบนี้ สนับสนุนผลการศึกษาของ WHO ที่ว่าผู้ดื่มสุราเป็นระยะเวลานานจะเพิ่มปริมาณการดื่มและดื่กรของสุรามากขึ้น (บทที่ 2) สำหรับความจริงที่พบว่า นักศึกษาที่กำลังดื่มสุราระบุว่า ในอนาคตที่จะดื่มสุรา ถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะของปัญญาชน ผู้ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นหลักของประเทศชาติ การค้นพบเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตก