

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ID No.

--	--	--

แบบสอบถามงานวิจัย

เรื่อง “พฤติกรรมการใช้บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน ตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”

คำชี้แจง

- แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน จำนวน 9 หน้า ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	มี 22 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	มี 16 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	มี 20 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	มี 15 ข้อ
- แบบสอบถามงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านในตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
- การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด โปรดตอบแบบสอบถามทุก
ข้อและให้ตรงตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะถือเป็นความลับ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำ
ข้อมูลไปศึกษาวิจัย และดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อไป

ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้

นายจิรวัฒน์ จิตตพัฒนานนท์

นักศึกษาปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง 1. ทำเครื่องหมาย X ในช่องว่าง () ของแต่ละข้อ ซึ่งตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
2. ในแต่ละข้อตอบได้ 1 คำตอบ ยกเว้น บางข้อตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และบางข้อสามารถเขียนคำตอบได้นอกเหนือจากคำตอบที่ให้ไว้

สำหรับผู้วิจัย

1. เพศ () 1 ชาย () 2 หญิง G1 []
2. ปัจจุบันท่านอายุ.....ปี G2 [] []
3. ปัจจุบันสถานภาพของท่าน G3 []
 - () 1. โสด () 3. หย่าร้าง
 - () 2. สมรส () 4. หม้าย
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน G4 []
 - () 1. ประถมศึกษา () 4. อนุปริญญา
 - () 2. มัธยมศึกษา () 5. ปริญญาตรี
 - () 3. ปวช./ปวส. () 6. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพปัจจุบันของท่าน G5 []
 - () 1. ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย () 4. บริษัทเอกชน
 - () 2. รับจ้าง () 5. เกษตรกรรม
 - () 3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ () 6. อื่นๆ (ระบุ).....
6. รายได้รวมทั้งหมดโดยเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัวของท่าน.....บาท/เดือน G6 [] [] [] [] []
7. สถานภาพรายได้ทางครอบครัว G7 []
 - () 1. ไม่พอใช้ () 2. พอใช้ง่าย () 3. พอใช้ง่ายและเหลือเก็บ
8. สถานภาพในชุมชน G8 []
 - () 1. ผู้นำชุมชน () 3. ประธานกลุ่มต่างๆในชุมชน
 - () 2. กรรมการหมู่บ้าน/กลุ่มต่างๆในชุมชน () 4. อื่น ๆ ระบุ.....
9. ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน G9 []
 - () 1. น้อยกว่า 5 ปี () 2. ตั้งแต่ 5 - 10 ปี () 3. มากกว่า 10 ปี

สำหรับผู้วิจัย

G10[]

10. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่

() 1. ไม่มี

() 2. มี โรคประจำตัว (อื่นๆ).....

() โรคเบาหวาน

() โรคความดันโลหิตสูง

() โรคหัวใจและหลอดเลือด

() โรคหอบหืด

() โรคปวดข้อ

() โรคกระเพาะ

11. ท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่

G11[]

() เคย

() ไม่เคย ข้ามไปข้อ 21

12. ในรอบ 6 เดือน ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่

G12[]

() ดื่ม

() ไม่ดื่ม

13. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ท่านดื่มประจำหรือนิยมดื่ม คือ

G13[]

() 1. เบียร์

() 2. เหล้าขาว

() 3. เหล้าสี

() 4. เหล้าเถื่อน

() 5. วิสกี้

() 6. ไวน์

() 7. อื่น ๆ ระบุ.....

14. สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ของท่านคือ

G14[]

() 1. อายากลอง

() 2. เพื่อเข้าสังคม

() 3. เพื่อนชวน

() 4. คลายเครียด

() 5. มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว

() 6. มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย () 7. อื่น ๆ ระบุ.....

15. ส่วนใหญ่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โอกาสใด

G15[]

() 1. งานเลี้ยง/สังสรรค์

() 2. กลุ่มใจ

() 3. เทศกาลต่าง ๆ

() 4. เวลาว่าง (ไม่มีอะไรทำ)

() 5. อื่นระบุ.....

16. ปริมาณในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ละครั้งของท่าน

() 1. เบียร์ ดื่มครั้งละ.....แก้ว.....กระป๋อง.....ขวด

G16A[]

() 2. เหล้าขาว ดื่มครั้งละ.....แก้ว.....ขวด

G16B[]

() 3. เหล้าสี ดื่มครั้งละ.....แก้ว.....ขวด

G16C[]

() 4. เหล้าเถื่อน ดื่มครั้งละ.....แก้ว.....ขวด

G16D[]

() 5. วิสกี้ ดื่มครั้งละ.....แก้ว.....ขวด

G16E[]

() 6. ไวน์ ดื่มครั้งละ.....แก้ว.....ขวด

G16F[]

() 7. อื่น ๆ ระบุ.....ดื่มครั้งละ.....แก้ว.....กระป๋อง.....ขวด

G16G[]

สำหรับผู้วิจัย

17. โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ ท่านค้เครื่องค้ที่มีแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน G17 []
- () 1. ค้ทุกวัน () 2. ค้ 1-2 วัน
- () 3. ค้ 3-4 วัน () 4. ค้ 5-6 วัน
18. ระยะเวลาที่ใช้ในการค้แต่ละครั้ง G18 []
- () 1. น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง () 2. ครึ่งชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง
- () 3. มากกว่า 1 ชั่วโมงถึง 6 ชั่วโมง () 4. มากกว่า 6 ชั่วโมง
19. ในเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาท่านเคยเลิกค้เครื่องค้ที่มีแอลกอฮอล์แล้วกลับมาค้ใหม่อีกหรือไม่ G19 []
- () 1. เคย เพราะ.....
- () 2. ไม่เคย
20. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการค้เครื่องค้ที่มีแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง จำนวน.....บาท/ครั้ง G20 [] [] []
21. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาท่านเคยประสบอุบัติเหตุหรือไม่ G21 []
- () ไม่เคย () เคย ระบุ
- () 1. อุบัติเหตุจากการจราจร G21A []
- () 2. อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ G21B []
- () 3. อุบัติเหตุ อื่น ๆ ระบุ..... G21C []
22. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาที่ท่านประสบอุบัติเหตุท่านค้เครื่องค้ที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ G22C []
- () ไม่ค้ () ค้

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

คำชี้แจง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ และกาเครื่องหมาย โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่องใช่หรือไม่ใช่

ตามความคิดเห็นของท่าน

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	สำหรับ ผู้วิจัย
1. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช่สารเสพติด			K1 []
2. สุรา หมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมไม่เกินร้อยละ 60			K2 []
3. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง			K3 []
4. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ละประเภทเช่นเหล้าขาว เหล้าสี เหล้านอก ในปริมาณเท่ากันทำให้เกิดอาการมาแตกต่างกัน			K4 []
5. แอลกอฮอล์จะถูกร่างกายดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดภายใน 20 นาที			K5 []
6. แอลกอฮอล์ทำให้ผู้ดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดสติได้			K6 []
7. แอลกอฮอล์ถ้าดื่มประจำทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม			K7 []
8. แอลกอฮอล์จะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะเท่านั้น			K8 []
9. ดับทำหน้าที่ยาจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย			K9 []
10. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรอันดับแรกของประเทศไทย เกิดจากผู้ขับขี่ดื่ม แอลกอฮอล์			K10 []
11. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ปี2522 กฎหมายได้กำหนดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์			K11 []
12. การตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด คือ การตรวจโดย การเป่าลมหายใจ			K12 []
13. การป้องกันโรคหรือพิษจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือการงดดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท			K13 []
14. ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี			K14 []
15. บทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำความผิดขายสุรา คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท			K15 []
16. บทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำความผิดจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี คือ จำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ			K16 []

ส่วนที่ 3 ทศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

คำชี้แจง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ และ โปรดทำเครื่องหมาย × ในช่อง ☐ ตามความคิดเห็น

ข้อ ที่	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับ ผู้วิจัย
1	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ผู้ ดื่มมีความสุข ผ่อนคลายความตึงเครียด						A1 []
2	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อน รับประทานอาหารจะช่วยทำให้เจริญ อาหาร						A2 []
3	การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของภาครัฐ ทำให้ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์						A3 []
4	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้เกิด การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ						A4 []
5	สมาชิกในครอบครัวควรจะช่วยตักเตือน ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้ ลด ละ เลิก						A5 []
6	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ สิ้นเปลืองเงินทอง						A6 []
7	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ ร่างกายเสื่อมโทรมและแก่เร็ว						A7 []
8	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะ นำไปสู่การทะเลาะวิวาท						A8 []
9	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้มี ผลเสียต่อการทำงาน						A9 []
10	การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์กับเพื่อนจะทำให้สัมพันธ ภาพระหว่างเพื่อนลดลง						A10 []
11	การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทาง สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม						A11 []
12	การที่รัฐบาลออกกฎหมายการจำกัดอายุผู้ ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีเป็นเรื่องที่ดี						A12 []

ข้อ ที่	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับ ผู้วิจัย
13	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวัด หรือสถานที่ราชการเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ						A13 []
14	การห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในงานบุญประเพณี เช่น งานทอดกฐิน เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม						A14 []
15	การห้ามไม่มีร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์อยู่ใกล้วัดและสถานศึกษา เป็นสิ่งเหมาะสม						A15 []
16	การกำหนดบทลงโทษโดยชุมชนแก่ผู้ เมาแล้วทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งที่เหมาะสม						A16 []
17	การที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการผลิตสุรา ในชุมชนเป็นสิ่งที่เหมาะสม						A17 []
18	การดื่มสุรามีผลต่อการเพิ่มอัตราเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุ						A18 []
19	ในการพบปะสังสรรค์มีความจำเป็นที่ ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์						A19 []
20	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นครั้ง คราวไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย						A20 []

ส่วนที่ 4 การปฏิบัติต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

คำชี้แจง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ และกาเครื่องหมาย โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่อง ☐ ตามความคิดเห็นของท่าน สำหรับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรม	การปฏิบัติ			สำหรับ ผู้วิจัย
	ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ	
1. เวลาที่มีเพื่อน/ญาติพี่น้องมาหาต้องมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์				P1 []
2. เวลาในงานเทศกาล, บุญประเพณีต้องมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์				P2 []
3. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่าน ได้มาโดยซื้อเอง				P3 []
4. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่าน ได้มาโดยเพื่อนซื้อ				P4 []
5. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีอาการเริ่มรู้สึกมึนศีรษะ				P5 []
6. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีอาการเริ่มรู้สึกเมา				P6 []
7. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีเมื่มีคนบอกหรือเตือน				P7 []
8. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดคือบ้าน/ที่พัก				P8 []
9. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดร้านค้า/ร้านขายของชำ				P9 []
10. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดสถานบันเทิง				P10 []
11. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะดื่มคนเดียว				P11 []
12. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะดื่มกับเพื่อน				P12 []
13. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะดื่มกับบิดามารดา/ญาติพี่น้อง				P13 []
14. ท่านสูบบุหรี่ ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์				P14 []
15. ท่านสูบบุหรี่ ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์				P15 []
16. ท่านเสพยาบ้า ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์				P16 []

พฤติกรรม	การปฏิบัติ			สำหรับผู้วิจัย
	ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ	
17.ท่านใช้สารระเหยร่วมกับการดัดแปลงที่มีแอลกอฮอล์				P17 []
18.อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดัดแปลงที่มีแอลกอฮอล์คือปวดท้อง				P18 []
19.อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดัดแปลงที่มีแอลกอฮอล์คือปวดศีรษะ				P19 []
20.อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดัดแปลงที่มีแอลกอฮอล์คือคลื่นไส้อาเจียน				P20 []
21. ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมาท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้จากการดัดแปลงที่มีแอลกอฮอล์				
1) ขาดงาน				P21.1 []
2) ทำงานไม่ได้				P21.2 []
3) ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา				P21.3 []
4) ทำงานขณะมึนเมา				P21.4 []
5) ถูกจับกุมขณะเมา				P21.5 []
6) ถูกตักเตือนเรื่องการดัดแปลงที่มีแอลกอฮอล์				P21.6 []
7) ทะเลาะวิวาท กับสมาชิกในครอบครัว				P21.7 []
8) ถูกสมาชิกในครอบครัวทำร้าย				P21.8 []
9) ถูกผู้อื่นทำร้าย				P21.9 []
10) ทำร้ายสมาชิกในครอบครัว				P21.10 []
11) ทำร้ายร่างกายผู้อื่น				P21.11 []

ภาคผนวก ข
การวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ

ตารางที่ 17 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ความรู้	จำนวน (ร้อยละ)			mean	S.D.
	n = 116				
	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ตอบ		
1. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช่สารเสพติด	68 (58.6)	48 (41.4)	0 (0.00)	0.41	0.046
2. สุรา หมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมไม่เกินร้อยละ 60	76 (65.5)	40 (34.5)	0 (0.00)	0.34	0.044
3. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง	4 (3.4)	112 (96.6)	0 (0.00)	0.97	0.017
4. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ละประเภทเช่น เหล้าขาว เหล้าสี เหล้านอก ในปริมาณเท่ากันทำให้เกิดอาการเมาแตกต่างกัน	17 (14.7)	99 (85.3)	0 (0.00)	0.85	0.033
5. แอลกอฮอล์จะถูกร่างกายดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดภายใน 20 นาที	101 (87.1)	15 (12.9)	0 (0.00)	0.13	0.031
6. แอลกอฮอล์ทำให้ผู้ดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดสติได้	4 (3.4)	112 (96.6)	0 (0.00)	0.97	0.017
7. แอลกอฮอล์ถ้าดื่มประจำทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม	15 (12.9)	101 (87.1)	0 (0.00)	0.87	0.031
8. แอลกอฮอล์จะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะเท่านั้น	84 (72.4)	32 (27.6)	0 (0.00)	0.28	0.042
9. คับทำหน้าที่กำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย	80 (69.0)	36 (31.0)	0 (0.00)	0.31	0.043
10. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรอันดับแรกของประเทศไทย เกิดจากผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์	5 (4.3)	111 (95.7)	0 (0.00)	0.96	0.019
11. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ปี2522 กฎหมายได้กำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์	6 (5.2)	110 (94.8)	0 (0.00)	0.95	0.021
13. การป้องกันโรคหรือพิษจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท	19 (16.4)	97 (83.6)	0 (0.00)	0.84	0.035

ตารางที่ 17 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ต่อ)

ความรู้	จำนวน (ร้อยละ)			mean	S.D.
	n = 116				
	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ตอบ		

14. ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี	25 (21.6)	91 (78.4)	0 (0.00)	0.78	0.038
15. บทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำผิดจำหน่ายสุราคือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท	2 (1.7)	114 (98.3)	0 (0.00)	0.98	0.012
16. บทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำผิดจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	114 (98.3)	2 (1.7)	0 (0.00)	0.02	0.012

ตารางที่ 18 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงทัศนคติของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		จำนวน (ร้อยละ)					mean	S.D.
		n = 116						
		เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง		
1.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ผู้ดื่มมีความสุข ผ่อนคลายความตึงเครียด	21 (18.1)	39 (33.6)	24 (20.7)	30 (25.9)	2 (1.7)	3.41	0.103
2.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารจะช่วยทำให้เจริญอาหาร	10 (8.6)	45 (38.8)	27 (23.3)	27 (23.3)	7 (6.0)	3.21	0.101
3.	การรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษาของภาครัฐทำให้ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	51 (44.0)	57 (49.1)	5 (4.3)	3 (2.6)	0 (0.00)	4.34	0.064
4.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ	24 (20.7)	44 (37.9)	45 (38.8)	3 (2.6)	0 (0.00)	3.77	0.075
5.	สมาชิกในครอบครัวควรจะช่วยตักเตือนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้ลด ละ เลิก	58 (50.0)	54 (46.6)	2 (1.7)	2 (1.7)	0 (0.00)	4.45	0.058
6.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้สิ้นเปลืองเงินทอง	60 (51.7)	51 (44.0)	2 (1.7)	1 (0.9)	2 (1.7)	4.43	0.068
7.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมและแก่เร็ว	65 (56.0)	38 (32.8)	12 (10.3)	1 (0.9)	0 (0.00)	4.44	0.066
8.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาท	74 (63.8)	29 (25.0)	11 (9.5)	1 (0.9)	1 (0.9)	4.50	0.072
9.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้มีผลเสียต่อการทำงาน	46 (39.7)	57 (49.1)	9 (7.8)	4 (3.4)	0 (0.00)	4.25	0.069

ตารางที่ 18 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงทัศนคติของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ต่อ)

ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์		จำนวน (ร้อยละ)					mean	S.D.	
		n = 116							
		เห็น	เห็น	ไม่	ไม่เห็น	ไม่เห็น			
		ด้วย	ด้วย	แน่ใจ	ด้วย	ด้วย			
		อย่างยิ่ง					อย่างยิ่ง		
10.	การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับเพื่อนจะทำให้สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนลดลง	4 (3.4)	41 (35.3)	40 (34.5)	21 (18.1)	10 (8.6)	3.07	0.094	
11.	การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ทีวี วิทยุ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม	36 (31.0)	38 (32.8)	7 (6.0)	20 (17.2)	15 (12.9)	3.52	0.132	
12.	การที่รัฐบาลออกกฎหมายการจำกัดอายุผู้ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี เป็นเรื่องที่ดี	42 (36.2)	57 (49.1)	3 (2.6)	10 (8.6)	4 (3.4)	4.06	0.095	
13.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวัดหรือสถานที่ราชการเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ	73 (62.9)	32 (27.6)	1 (0.9)	8 (6.9)	2 (1.7)	4.43	0.088	
14.	การห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี เช่น งานทอดกฐิน เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม	4 (3.4)	32 (27.6)	21 (18.1)	41 (35.3)	18 (15.5)	2.68	0.106	
15.	ท่านรู้สื่ออย่างไรที่ห้ามมีร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ใกล้วัดและสถานศึกษา	32 (27.6)	56 (48.3)	4 (3.4)	17 (14.7)	7 (6.0)	3.77	0.110	
16.	ท่านรู้สื่ออย่างไรถ้าในชุมชนของท่านจะกำหนดบทลงโทษแก่ผู้เมาแล้วทะเลาะวิวาท	52 (44.8)	54 (46.6)	4 (3.4)	3 (2.6)	3 (2.6)	4.28	0.080	

ตารางที่ 18 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงทัศนคติของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ต่อ)

ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์		จำนวน (ร้อยละ)					mean	S.D.
		n = 116						
		เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง		
17.	ท่านรู้สึกอย่างไรที่รัฐบาล สนับสนุนให้มีการผลิตสุราใน ชุมชนได้	26 (22.4)	42 (36.2)	13 (11.2)	24 (20.7)	11 (9.5)	3.41	0.121
18.	การดื่มสุรามีผลต่อการเพิ่มอัตรา เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	55 (47.4)	48 (41.4)	2 (1.7)	6 (5.2)	5 (4.3)	4.22	0.095
19.	ในการพบปะสังสรรค์เป็น สถานการณ์ที่ต้องดื่มเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์	4 (3.4)	41 (35.3)	18 (15.5)	43 (37.1)	10 (8.6)	2.88	0.102
20.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นครั้งคราวไม่ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อร่างกายแต่อย่างใด	6 (5.2)	17 (14.7)	35 (30.2)	38 (32.8)	20 (17.2)	2.58	0.102

ตารางที่ 19 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการปฏิบัติตนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การปฏิบัติ	จำนวน (ร้อยละ)			mean	S.D.
	n = 116				
	ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ		
1. เวลาที่มีเพื่อน/ญาติพี่น้องมาหาต้องมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	7 (6.0)	84 (72.4)	25 (21.6)	1.16	0.50
2. เวลาในงานเทศกาล, บุญประเพณีต้องมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	34 (29.3)	60 (51.7)	22 (19.0)	0.90	0.69
3. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านได้มาโดยซื้อเอง	13 (11.2)	69 (59.5)	34 (29.3)	1.18	0.61
4. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านได้มาโดยเพื่อนซื้อ	11 (9.5)	79 (68.1)	26 (22.4)	1.13	0.55
5. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีอาการเริ่มรู้สึกมึนศีรษะ	42 (36.2)	42 (36.2)	32 (27.6)	1.09	0.80
6. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีอาการเริ่มรู้สึกเมา	33 (28.4)	26 (22.4)	57 (49.1)	0.79	0.86
7. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีเมื่อกับคนบอกหรือเตือน	43 (37.1)	45 (38.8)	28 (24.1)	1.13	0.77
8. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดคือบ้าน/ที่พัก	17 (14.7)	63 (54.3)	36 (31.0)	1.16	0.66
9. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดร้านค้า/ร้านขายของชำ	1 (0.9)	57 (49.1)	58 (50.0)	1.49	0.52
10. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดสถานบันเทิง	5 (4.3)	39 (33.6)	72 (62.1)	1.58	0.58
11. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะดื่มคนเดียว	2 (1.7)	56 (48.3)	58 (50.0)	1.48	0.54
12. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะดื่มกับเพื่อน	42 (36.2)	48 (41.4)	26 (22.4)	0.86	0.76
13. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะดื่มกับบิดามารดา/ญาติพี่น้อง	6 (5.2)	74 (63.8)	36 (31.0)	1.26	0.55

ตารางที่ 19 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการปฏิบัติตนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ต่อ)

การปฏิบัติ	จำนวน (ร้อยละ)			mean	S.D.
	n = 116				
	ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ		
14. ท่านสูบบุหรี่ ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	22 (19.0)	4 (3.4)	90 (77.6)	1.59	0.79
15. ท่านสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	0 (0.00)	3 (2.6)	113 (97.4)	1.97	0.16
16. ท่านเสพยาบ้าร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	0 (0.00)	0 (0.00)	116 (100)	2.00	0.00
17. ท่านใช้สารระเหยร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	0 (0.00)	1 (0.9)	115 (99.1)	1.99	0.00
18. อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์คือปวดท้อง	10 (8.6)	51 (44.0)	55 (47.4)	1.39	0.64
19. อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์คือปวดศีรษะ	15 (12.9)	66 (56.9)	35 (30.2)	1.17	0.64
20. อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์คือคลื่นไส้อาเจียน	18 (15.5)	38 (32.8)	60 (51.7)	1.36	0.74
21. ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมามีท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์					
1) ขาดงาน	3 (2.6)	23 (19.8)	90 (77.6)	1.75	0.49
2) ทำงานไม่ได้	4 (3.4)	44 (37.9)	68 (58.6)	1.55	0.56
3) ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา	18 (15.5)	18 (15.5)	80 (69.0)	1.53	0.75
4) ทำงานขณะมึนเมา	9 (7.8)	26 (22.4)	81 (69.8)	1.62	0.63
5) ถูกจับกุมขณะเมา	1 (0.9)	16 (13.8)	99 (85.3)	1.84	0.39

ตารางที่ 19 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงการปฏิบัติตนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ต่อ)

การปฏิบัติ	จำนวน (ร้อยละ)			mean	S.D.
	n = 116				
	ทุกครั้ง	บางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ		
6) ถูกตักเตือนเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์	9 (7.8)	21 (18.1)	86 (74.1)	1.66	0.62
7) ทะเลาะวิวาท กับสมาชิกในครอบครัว	0 (0.00)	24 (20.7)	92 (79.3)	1.79	0.41
8) ถูกสมาชิกในครอบครัวทำร้าย	1 (0.9)	10 (8.6)	105 (90.5)	1.90	0.33
9) ถูกผู้อื่นทำร้าย	0 (0.00)	10 (8.6)	106 (91.4)	1.91	0.28
10) ทำร้ายสมาชิกในครอบครัว	0 (0.00)	11 (9.5)	105 (90.5)	1.91	0.29
11) ทำร้ายร่างกายผู้อื่น	1 (0.9)	8 (6.9)	107 (92.2)	1.91	0.31