

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) ซึ่งได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 116 คน แล้วรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และนำเสนอผลการศึกษาเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. ลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคั้มที่มีแอลกอฮอล์ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
3. พหุสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
4. การปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
5. ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

1. ลักษณะข้อมูลทั่วไปทางประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 85 คน (ร้อยละ 73.3) มีอายุเฉลี่ย 42.6 ปี (S.D. = 7.0 ปี) กว่าครึ่ง จำนวน 65 คน (ร้อยละ 56.0) มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกือบทั้งหมด จำนวน 105 คน (ร้อยละ 90.5) มีสถานภาพสมรสคู่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 78 คน (ร้อยละ 67.2) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จำนวน 34 คน (ร้อยละ 29.3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนมาก จำนวน 72 คน (ร้อยละ 62.1) มีอาชีพในภาคเกษตรกรรม รองลงมาอาชีพรับจ้าง จำนวน 36 คน (ร้อยละ 31.0) รายได้ของครอบครัวของอสม. อยู่ระหว่าง 1,000 บาท ถึง 15,000 บาทต่อเดือน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 4,495 บาท (S.D. = 3,850 บาท) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 47 คน (ร้อยละ 40.5) มีรายได้ระหว่าง 3,000 – 5,999 บาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนมากระบุว่า มีรายได้พอใช้จ่าย จำนวน 82 คน (ร้อยละ 70.7) รองลงมาไม่พอใช้ จำนวน 26 คน (ร้อยละ 22.4) และรายได้พอใช้และเหลือเก็บ จำนวน 8 คน (ร้อยละ 6.9) ส่วนใหญ่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เหล่านี้เป็นกรรมการหมู่บ้านหรือกรรมการกลุ่มอื่น ๆ ในหมู่บ้าน จำนวน 77 คน (ร้อยละ 66.4) และ เป็นผู้นำชุมชน จำนวน 7 คน (ร้อยละ 6.0) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกือบครึ่ง จำนวน 54 คน (ร้อยละ 46.6) เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมานานน้อยกว่า 5 ปี รองลงมา ดำรงตำแหน่ง 5-10 ปี จำนวน 46 คน ร้อยละ 39.7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนมาก ไม่มีโรคประจำตัว จำนวน 81 คน (ร้อยละ 69.8) และโรคประจำตัวที่พบมากที่สุดคือโรคเบาหวาน และโรคกระเพาะอาหารอักเสบ จำนวน 13 คน (ร้อยละ 37.1) เท่ากัน รองลงมาโรคปวดข้อ จำนวน 4 คน (ร้อยละ 11.4) (รายละเอียดดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำแนกตามลักษณะ
ของประชากร

ลักษณะทางประชากร	จำนวน (N = 116)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	31	26.7
หญิง	85	73.3
อายุ		
20 – 30 ปี	4	3.4
31 – 40 ปี	34	29.3
41 – 50 ปี	65	56.0
50 ปี ขึ้นไป	13	11.2
Mean = 42.66 ปี S.D. = 7.04 ปี Min = 22 ปี Max = 66 ปี		
สถานภาพสมรส		
โสด	3	2.6
คู่	105	90.5
หย่าร้าง	4	3.4
หม้าย	4	3.4

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำแนกตามลักษณะ
ของประชากร (ต่อ)

ลักษณะทางประชากร	จำนวน (N = 116)	ร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	78	67.2
มัธยมศึกษา	34	29.3
ปวช./ปวส.	2	1.7
อนุปริญญา	1	0.9
ปริญญาตรี	1	0.9
อาชีพหลัก		
เกษตรกรรวม	72	62.1
รับจ้าง	36	31.0
ค้าขาย	5	4.3
บริษัทเอกชน	2	1.7
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	0.9
รายได้ต่อเดือน		
1000 – 3,000 บาท	31	31.0
3,001 – 6,000 บาท	47	40.5
มากกว่า 6,000 บาทขึ้นไป	33	28.4
Mean = 4,494.83 บาท S.D. = 2,774.85 บาท Max = 15,000 บาท Min = 1,000 บาท		
Median = 3,850 บาท		
สถานภาพรายได้		
ไม่พอใช้	26	22.4
พอใช้	82	70.7
พอใช้และเหลือเก็บ	8	6.9

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำแนกตามลักษณะ
ของประชากร (ต่อ)

ลักษณะทางประชากร	จำนวน (N = 116)	ร้อยละ
สถานภาพในชุมชน		
ผู้นำชุมชน	7	6.0
กรรมการหมู่บ้าน/กลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน	77	66.4
ประธานกลุ่มต่าง ๆ	3	2.6
อื่น ๆ	29	25.0
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		
น้อยกว่า 5 ปี	54	46.6
5 – 10 ปี	46	39.7
มากกว่า 10 ปี	16	13.8
การมีโรคประจำตัว		
ไม่มี	81	69.8
มี โดยป่วยเป็นโรค	35	30.2
โรคเบาหวาน	13	37.1
โรคความดันโลหิตสูง	3	8.6
โรคหัวใจและหลอดเลือด	2	5.8
โรคปวดข้อ	4	11.4
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ	13	37.1

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนมาก จำนวน 85 คน (ร้อยละ 73.3) เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่นิยมดื่ม เบียร์ จำนวน 59 คน (ร้อยละ 50.9) เหล้าขาว จำนวน 22 คน (ร้อยละ 19.0) และเหล้าสี จำนวน 4 คน (ร้อยละ 4.7) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่บอกว่าดื่มเพื่อเข้าสังคม จำนวน 61 คน (ร้อยละ 71.8) รองลงมา คือเพื่อนชวน จำนวน 8 คน (ร้อยละ 9.4) และคลายเครียด จำนวน 7 คน (ร้อยละ 8.2) และส่วนมาก ดื่มในโอกาสงานเลี้ยงและสังสรรค์ จำนวน 62 คน (ร้อยละ 72.9) รองลงมาคือ เวลาว่างไม่มีอะไรทำ จำนวน 18 คน (ร้อยละ 21.2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประมาณ

ครั้งหนึ่ง จำนวน 42 คน (ร้อยละ 49.4) ดื่มเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอล์ในระยะ 1-2 วัน รองลงมาคือ 3-4 วัน และ 5-6 วัน ในสัดส่วนจำนวน 21 คน (ร้อยละ 18.1) เท่ากัน ส่วนใหญ่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใช้ระยะเวลาในการดื่ม ตั้งแต่ ครั้ง – 1 ชั่วโมง จำนวน 36 คน (ร้อยละ 42.4) รองลงมา คือน้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จำนวน 30 คน (ร้อยละ 35.3) มากกว่า 1-6 ชั่วโมง จำนวน 14 คน (ร้อยละ 16.5) และมากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป จำนวน 5 คน (ร้อยละ 5.9) ตามลำดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ จำนวน 74 คน (ร้อยละ 87.1) ใช้จ่ายในการดื่ม แต่ละครั้งน้อยกว่า 100 บาท รองลงมา คือ 100-500 บาท จำนวน 9 คน (ร้อยละ 10.6)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 16 คน (ร้อยละ 13.8) เคยประสบอุบัติเหตุ เป็นอุบัติเหตุจากการจราจร จำนวน 12 คน (ร้อยละ 75.0) และอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ จำนวน 4 คน (ร้อยละ 25.0) จากจำนวนผู้เคยประสบอุบัติเหตุ พบว่าเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 37.5) และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 10 คน (ร้อยละ 62.5) (รายละเอียดดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับประวัติการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ประวัติการดื่ม	จำนวน	ร้อยละ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		
เคยดื่ม	85	73.3
ไม่เคยดื่ม	31	26.7
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่ม		
เบียร์	59	50.9
เหล้าขาว	22	19.0
เหล้าสี	4	4.7
สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		
อยากลอง	6	7.1
เพื่อเข้าสังคม	61	71.8
เพื่อนชวน	8	9.4
คลายเครียด	7	8.2

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับประวัติการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ต่อ)

ประวัติการดื่ม	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย	2	2.4
อื่น ๆ	1	1.2
โอกาสในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		
งานเลี้ยงสังสรรค์	62	72.9
กลุ่มใจ	1	1.2
เวลาว่าง (ไม่มีอะไรทำ)	18	21.2
อื่น ๆ	4	4.7
ความถี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 1 สัปดาห์		
ทุกวัน	1	1.2
1 - 2 วัน	42	49.4
3 - 4 วัน	21	24.7
5 - 6 วัน	21	24.7
ระยะเวลาในการดื่ม		
น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง	30	35.3
ครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง	36	42.4
มากกว่า 1-6 ชั่วโมง	14	16.5
มากกว่า 6 ชั่วโมง	5	5.9
ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้ง		
น้อยกว่า 100 บาท	74	87.1
100-500 บาท	9	10.6
มากกว่า 500 บาท	2	2.3
การประสบอุบัติเหตุในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา		
ไม่เคย	100	86.2
เคย ประเภทอุบัติเหตุ	16	13.8
การจราจร	12	75.0
การประกอบอาชีพ	4	25.0

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ต่อ)

ประวัติการดื่ม	จำนวน	ร้อยละ
การประสบอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		
ดื่ม	6	37.5
ไม่ดื่ม	10	62.5

2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลาง จำนวน 63 คน (ร้อยละ 54.3) รองลงมาคือความรู้ระดับต่ำ จำนวน 47 คน (ร้อยละ 40.5) และความรู้ระดับสูง จำนวน 6 คน (ร้อยละ 5.2) (รายละเอียดดังตารางที่ 4)

2.2 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

จำแนกตามเพศ

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศชายและเพศหญิง พบว่า ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศหญิงมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระดับสูงกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศชาย (รายละเอียดดังตารางที่ 5)

2.3 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

จำแนกตามกลุ่มที่ดื่มและไม่ดื่ม

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ดื่มแอลกอฮอล์มีความรู้ในระดับสูงกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)

2.4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้มากที่สุดในเรื่องบทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำความผิดขับรถขณะเมาสุรา คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000–10,000 บาท จำนวน 114 คน

ร้อยละ 98.3 รองลงมาเท่ากันคือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง และแอลกอฮอล์ทำให้ผู้ดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดสติได้ จำนวน 112 คน ร้อยละ 96.6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ที่น้อยที่สุดในเรื่องบทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำผิดจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จำนวน 114 คน ร้อยละ 98.3 และพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเรื่อง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช่สารเสพติด จำนวน 68 คน ร้อยละ 58.6 สุราหมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมไม่เกิน ร้อยละ 60 จำนวน 76 คน ร้อยละ 65.5 แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดภายใน 20 นาที จำนวน 101 คน ร้อยละ 87.1 แอลกอฮอล์จะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะเท่านั้น จำนวน 84 คน ร้อยละ 72.4 ตั้บทำหน้าที่กำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย จำนวน 80 คน ร้อยละ 69.0 ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 25 คน ร้อยละ 21.6 และบทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำผิดจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จำนวน 114 คน ร้อยละ 98.3 (รายละเอียดดังตารางที่ 7)

ตารางที่ 4 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำแนกตามความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ระดับความรู้		จำนวน (n = 116)	ร้อยละ
ระดับสูง	(13 – 16 คะแนน)	6	5.2
ระดับปานกลาง	(10 – 12 คะแนน)	63	54.3
ระดับต่ำ	(0 - 10 คะแนน)	47	40.5
รวม		116	100.0
$\bar{X}$ = 10.6 S.D. = 1.3 Min = 7 Max = 14			

ตารางที่ 5 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามความรู้เกี่ยวกับเครื่องคั้มที่มีแอลกอฮอล์และเพศ

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคั้มที่มีแอลกอฮอล์	ชาย		หญิง		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความรู้ระดับสูง	1	3.3	5	5.9	6	5.2
ความรู้ระดับปานกลาง	21	67.7	42	49.4	63	54.3
ความรู้ระดับต่ำ	9	29.0	38	44.7	47	40.5
รวม	31	100.0	85	100.0	116	100.0

ตารางที่ 6 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามความรู้เกี่ยวกับเครื่องคั้มที่มีแอลกอฮอล์และการคั้มเครื่องคั้มที่มีแอลกอฮอล์

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคั้มที่มีแอลกอฮอล์	คั้ม		ไม่คั้ม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความรู้ระดับสูง	5	5.9	1	3.2	6	5.2
ความรู้ระดับปานกลาง	49	57.6	14	45.2	63	54.3
ความรู้ระดับต่ำ	31	36.5	16	51.6	47	40.5
รวม	85	100.0	31	100.0	116	100.0

ตารางที่ 7 ร้อยละ ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับเครื่องคั้มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกรายข้อ

ความรู้	จำนวน (ร้อยละ)	
	n = 116	
	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง
1. เครื่องคั้มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช่สารเสพติด	68 (58.6)	48 (41.4)
2. สุรา หมายถึงเครื่องคั้มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมไม่เกินร้อยละ 60	76 (65.5)	40 (34.5)

ตารางที่ 7 ร้อยละ ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกรายข้อ (ต่อ)

ความรู้	จำนวน (ร้อยละ)	
	n = 116	
	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง
3. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำอาจทำให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง	4 (3.4)	112 (96.6)
4. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ละประเภทเช่นเหล้าขาว เหล้าสีเหล้านอก ในปริมาณเท่ากันทำให้เกิดอาการเมาแตกต่างกัน	17 (14.7)	99 (85.3)
5. แอลกอฮอล์จะถูกร่างกายดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดภายใน 20 นาที	101 (87.1)	15 (12.9)
6. แอลกอฮอล์ทำให้ผู้ดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดสติได้	4 (3.4)	112 (96.6)
7. แอลกอฮอล์ถ้าดื่มประจำทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม	15 (12.9)	101 (87.1)
8. แอลกอฮอล์จะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะเท่านั้น	84 (72.4)	32 (27.6)
9. ดับทำหน้าที่กำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย	80 (69.0)	36 (31.0)
10. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรอันดับแรกของประเทศไทย เกิดจากผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์	5 (4.3)	111 (95.7)
11. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ปี2522 กฎหมายได้กำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์	6 (5.2)	110 (94.8)
13. การป้องกันโรคหรือพิษจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท	19 (16.4)	97 (83.6)
14. ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี	25 (21.6)	91 (78.4)
15. บทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำความผิดขบถขณะเมาสุราคือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท	2 (1.7)	114 (98.3)

ตารางที่ 7 ร้อยละ ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกรายข้อ (ต่อ)

ความรู้	จำนวน (ร้อยละ)	
	n = 116	
	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง
16. บทลงโทษสูงสุดของผู้กระทำผิดจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี	114	2
คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	(98.3)	(1.7)

3. ทักษะเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

3.1 ทักษะที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

พบว่าส่วนมากมีทัศนคติเชิงลบในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 97 คน ร้อยละ 83.7 รองลงมาคือ ทัศนคติระดับปานกลาง จำนวน 19 คน ร้อยละ 16.4 รายละเอียด ดังตารางที่ 8

3.2 ทักษะที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามเพศ

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศชายและเพศหญิง พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศหญิงมีทัศนคติเชิงลบต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศชาย รายละเอียดดังตารางที่ 9

3.3 ทักษะที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามกลุ่มที่ดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่ดื่มแอลกอฮอล์พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีทัศนคติเชิงลบต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีมากกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีทัศนคติปานกลาง รายละเอียดดังตารางที่ 10

3.4 ทักษะที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีทักษะเชิงลบต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากที่สุดคือ ท่านรู้สึกอย่างไรที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการผลิตสุราในชุมชนได้ จำนวน 68 คน ร้อยละ 58.6 รองลงมาคือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ผู้ดื่มมีความสุข ผ่อนคลายความตึงเครียด จำนวน 60 คน ร้อยละ 51.7 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร จะช่วยทำให้เจริญอาหาร จำนวน 55 คน ร้อยละ 47.4 การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับเพื่อนจะทำให้สัมพันธ์ภาพระหว่างเพื่อนลดลง และการพบปะสังสรรค์เป็นสถานการณ์ที่ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 45 คน ร้อยละ 38.7 การห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี เช่น งานทอดกฐิน เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม จำนวน 36 คน ร้อยละ 31.0 การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ทีวี วิดีโอ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม จำนวน 35 คน ร้อยละ 30.0 ท่านรู้สึกอย่างไรที่ห้ามมีร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ใกล้วัดและสถานศึกษา จำนวน 24 คน ร้อยละ 20.7 และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราวไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใด จำนวน 23 คน ร้อยละ 19.9 ส่วนความคิดเห็นเชิงบวกต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากที่สุดคือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาท จำนวน 103 คน ร้อยละ 88.8 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวควรจะช่วยตักเตือนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้ลด ละ เลิก จำนวน 112 คน ร้อยละ 96.6 (รายละเอียดดังตารางที่ 11)

ตารางที่ 8 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามทักษะต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ระดับทักษะ		จำนวน (n = 116)	ร้อยละ
ทักษะเชิงลบ	(3.6 – 5.0 คะแนน)	97	83.6
ทักษะปานกลาง	(2.6 – 3.5 คะแนน)	19	16.4
ทักษะเชิงบวก	(1.0 – 2.5 คะแนน)	0	0.00
รวม		116	100.00

$\bar{X} = 3.7$ S.D. = 0.3 Min = 2.5 Max = 4.5

ตารางที่ 9 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามทัศนคติต่อการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเพศ

ทัศนคติต่อการบริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	ชาย		หญิง		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทัศนคติเชิงลบ	24	77.4	73	85.9	97	83.6
ทัศนคติปานกลาง	7	22.6	12	14.1	19	16.4
รวม	31	100.0	85	100.0	116	100.0

ตารางที่ 10 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามทัศนคติต่อการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ทัศนคติต่อการบริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	ดื่ม		ไม่ดื่ม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทัศนคติเชิงลบ	70	82.3	27	87.1	97	83.6
ทัศนคติปานกลาง	15	17.7	4	12.9	19	16.4
รวม	85	100.0	31	100.0	116	100.0

ตารางที่ 11 ร้อยละ ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์จำแนกรายข้อ

ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		จำนวน (ร้อยละ)		
		n = 116		
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ
1.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ผู้ดื่มมีความสุข	60	24	32
	ผ่อนคลายความตึงเครียด	(51.7)	(20.7)	(27.6)
2.	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร	55	27	34
	อาหารจะช่วยทำให้เจริญอาหาร	(47.4)	(23.3)	(46.6)
3.	การรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษาของภาครัฐทำให้ลด	108	5	3
	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	(93.1)	(4.3)	(2.6)

ตารางที่ 11 ร้อยละ ทศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำแนกรายข้อ (ต่อ)

ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	จำนวน (ร้อยละ)		
	n = 116		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ
4. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ	68 (58.6)	45 (38.8)	3 (2.6)
5. สมาชิกในครอบครัวควรจะช่วยตักเตือนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้ลด ละ เลิก	112 (96.6)	2 (1.7)	3 (2.6)
6. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้สิ้นเปลืองเงินทอง	111 (95.7)	2 (1.7)	3 (2.6)
7. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมและแก่เร็ว	103 (88.8)	12 (10.3)	1 (0.9)
8. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาท	103 (88.8)	11 (9.5)	2 (1.7)
9. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้มีผลเสียต่อการทำงาน	103 (88.8)	9 (7.8)	4 (3.4)
10. การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับเพื่อนจะทำให้สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนลดลง	45 (38.7)	40 (34.5)	31 (26.7)
11. การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม	74 (63.8)	7 (6.0)	35 (30.1)
12. การที่รัฐบาลออกกฎหมายการจำกัดอายุผู้ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี เป็นเรื่องที่ดี	99 (85.3)	3 (2.6)	14 (12.0)
13. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวัดหรือสถานที่ราชการเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ	105 (90.5)	1 (0.9)	10 (8.6)
14. การห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี เช่น งานทอดกฐิน เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม	36 (31.0)	21 (18.1)	59 (50.8)

ตารางที่ 11 ร้อยละ ทศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำแนกรายข้อ (ต่อ)

ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	จำนวน (ร้อยละ)		
	n = 116		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
15. ท่านรู้สึกอย่างไรที่ห้ามมีร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ใกล้วัดและสถานศึกษา	88 (75.9)	4 (3.4)	24 (20.7)
16. ท่านรู้สึกอย่างไรถ้าในชุมชนของท่านจะกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่เมาแล้วทะเลาะวิวาท	106 (91.4)	4 (3.4)	6 (5.2)
17. ท่านรู้สึกอย่างไรที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการผลิตสุราในชุมชนได้	68 (58.6)	13 (11.2)	35 (30.2)
18. การดื่มสุรามีผลต่อการเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	103 (88.8)	2 (1.7)	11 (9.5)
19. ในการพบปะสังสรรค์เป็นสถานการณ์ที่ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	45 (38.7)	18 (15.5)	53 (45.7)
20. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราวไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใด	23 (19.9)	35 (30.2)	58 (50.0)

4. การปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4.1 การปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

การปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 85 คน ร้อยละ 73.3 ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 31 คน ร้อยละ 26.7 ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในระดับดี จำนวน 82 คน ร้อยละ 86.2 และระดับปานกลาง จำนวน 34 คน ร้อยละ 13.8 (รายละเอียดดังตารางที่ 12)

4.2 การปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามเพศ

เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศชายและเพศหญิง พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศหญิงมีการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ดีกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพศชาย (รายละเอียดดังตารางที่ 13)

4.3 การปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำแนกตามกลุ่มที่ดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ดื่มแอลกอฮอล์มีการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระดับดีมีมากกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีการปฏิบัติตนในระดับปานกลาง (รายละเอียดดังตารางที่ 14)

4.4 การปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

พบว่าการปฏิบัติตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เวลาว่างมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องมาหา จำนวน 84 คน ร้อยละ 72.4 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ได้มาส่วนมากโดยเพื่อนซื้อ จำนวน 79 ร้อยละ 68.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนมากไม่สูบบุหรี่ กล้วยา ยาบ้า หรือสารระเหยร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 90, 113, 116 และ 115 คน ร้อยละ 77.6, 97.3, 100 และ 99.1 ตามลำดับ อาการผิดปกติทุกครั้งจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดท้อง จำนวน 18, 15 และ 10 คน ร้อยละ 15.5, 12.9 และ 8.6 ตามลำดับ ส่วนปัญหาที่ประสบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่คือ ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา จำนวน 18 คน ร้อยละ 15.5 ทำงานขณะมึนเมา และถูกตักเตือนเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 9 คน ร้อยละ 7.8 ทำงานไม่ได้ จำนวน 4 คน ร้อยละ 3.4 และขาดงาน จำนวน 3 คน ร้อยละ 2.6 การทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไม่เคยทะเลาะวิวาท จำนวน 92 คน ร้อยละ 79.3 ทะเลาะบางครั้ง จำนวน 24 คน ร้อยละ 20.7 การทำร้ายผู้อื่นและถูกทำร้าย พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้านเคยถูกสมาชิกในครอบครัวทำร้าย และทำร้ายผู้อื่นทุกครั้ง มีจำนวน 1 คน ร้อยละ 0.9 (รายละเอียดดังตารางที่ 15)

ตารางที่ 12 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กับการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ระดับการปฏิบัติ	จำนวน (n = 116)	ร้อยละ
ระดับดี (1.34 – 2.00 คะแนน)	82	86.2
ระดับปานกลาง (0.67 – 1.33 คะแนน)	34	13.8
รวม	116	100.00
$\bar{X}$ = 1.49 S.D. = 0.46 Min = 0.87 Max = 2.00		

ตารางที่ 13 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านจำแนกตามการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเพศ

การปฏิบัติตนต่อการบริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	ชาย		หญิง		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับดี	22	71.0	60	70.6	82	70.7
ระดับปานกลาง	9	29.0	25	29.4	34	29.3
รวม	31	100.0	85	100.0	116	100.0

ตารางที่ 14 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านจำแนกตามการปฏิบัติตนต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์

การปฏิบัติตนต่อการบริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	ดื่ม		ไม่ดื่ม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับดี	58	68.2	24	77.4	82	70.7
ระดับปานกลาง	27	31.8	7	22.6	34	29.3
รวม	85	100.0	31	100.0	116	100.0

ตารางที่ 15 ร้อยละการปฏิบัติตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำแนกรายข้อ

การปฏิบัติ	จำนวน (ร้อยละ)		
	n = 116		
	ปฏิบัติประจำ	บางครั้ง	ไม่เคย
1. เวลาที่มีเพื่อน/ญาติพี่น้องมาหาต้องมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	7 (6.0)	84 (72.4)	25 (21.6)
2. เวลาในงานเทศกาล, บุญประเพณีต้องมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	34 (29.3)	60 (51.7)	22 (19.0)
3. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านได้มาโดยซื้อเอง	13 (11.2)	69 (59.5)	34 (29.3)
4. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านได้มาโดยเพื่อนซื้อ	11 (9.5)	79 (68.1)	26 (22.4)
5. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีอาการเริ่มรู้สึกมึนศีรษะ	42 (36.2)	42 (36.2)	32 (27.6)
6. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีอาการเริ่มรู้สึกเมา	33 (28.4)	26 (22.4)	57 (49.1)
7. ท่านจะหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อท่านมีเมื่มีคนอื่นบอกหรือเตือน	43 (37.1)	45 (38.8)	28 (24.1)
8. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดคือบ้าน/ที่พัก	17 (14.7)	63 (54.3)	36 (31.0)
9. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดร้านค้า/ร้านขายของชำ	1 (0.9)	57 (49.1)	58 (50.0)
10. สถานที่ที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดสถานบันเทิง	5 (4.3)	39 (33.6)	72 (62.1)
11. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะดื่มคนเดียว	2 (1.7)	56 (48.3)	58 (50.0)

ตารางที่ 15 ร้อยละการปฏิบัติตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำแนกรายข้อ (ต่อ)

การปฏิบัติ	จำนวน (ร้อยละ)		
	n = 116		
	ปฏิบัติประจำ	บางครั้ง	ไม่เคย
12. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะ ดื่มกับเพื่อน	42 (36.2)	48 (41.4)	26 (22.4)
13. ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่านจะ ดื่มกับบิดามารดา/ญาติพี่น้อง	6 (5.2)	74 (63.8)	36 (31.0)
14. ท่านสูบบุหรี่ ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	22 (19.0)	4 (3.4)	90 (77.6)
15. ท่านสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	0 (0.00)	3 (2.6)	113 (97.4)
16. ท่านเสพยาบ้าร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	0 (0.00)	0 (0.00)	116 (100)
17. ท่านใช้สารระเหยร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์	0 (0.00)	1 (0.9)	115 (99.1)
18. อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์คือปวดท้อง	10 (8.6)	51 (44.0)	55 (47.4)
19. อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์คือปวดศีรษะ	15 (12.9)	66 (56.9)	35 (30.2)
20. อาการผิดปกติของท่านที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์คือคลื่นไส้อาเจียน	18 (15.5)	38 (32.8)	60 (51.7)
21. ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมามีท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์			
1) ขาดงาน	3 (2.6)	23 (19.8)	90 (77.6)

ตารางที่ 15 ร้อยละการปฏิบัติตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำแนกรายข้อ (ต่อ)

การปฏิบัติ	จำนวน (ร้อยละ)		
	n = 116		
	ปฏิบัติประจำ	บางครั้ง	ไม่เคย
2) ทำงานไม่ได้	4 (3.4)	44 (37.9)	68 (58.6)
3) ขับขี่ยานพาหนะขณะมีเมเา	18 (15.5)	18 (15.5)	80 (69.0)
4) ทำงานขณะมีเมเา	9 (7.8)	26 (22.4)	81 (69.8)
5) ถูกจับกุมขณะเมเา	1 (0.9)	16 (13.8)	99 (85.3)
6) ถูกคัดเตือนเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	9 (7.8)	21 (18.1)	86 (74.1)
7) ทะเลาะวิวาท กับสมาชิกในครอบครัว	0 (0.00)	24 (20.7)	92 (79.3)
8) ถูกสมาชิกในครอบครัวทำร้าย	1 (0.9)	10 (8.6)	105 (90.5)
9) ถูกผู้อื่นทำร้าย	0 (0.00)	10 (8.6)	106 (91.4)
10) ทำร้ายสมาชิกในครอบครัว	0 (0.00)	11 (9.5)	105 (90.5)
11) ทำร้ายร่างกายผู้อื่น	1 (0.9)	8 (6.9)	107 (92.2)

5. ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คือ เพศ พบว่าเพศชายที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 28 คน (ร้อยละ 90.3) เพศหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 57 คน (ร้อยละ 67.0) เพศชายที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 3 คน (ร้อยละ 9.7) เพศหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 32.9) เมื่อเปรียบเทียบการดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเพศชายและเพศหญิง พบว่าเพศชายมีโอกาสเสี่ยงที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็น 4.585 เท่าของเพศหญิง (95 % CI = 1.283 - 16.386) (รายละเอียดดังตารางที่ 16)

ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ปัจจัย	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์			Odd Ratio	95 % CI	p-value
	ดื่ม	ไม่ดื่ม	รวม			
ความรู้				0.533	0.060–4.754	1.000
ระดับสูง	5(5.9)	1(0.3)	6(5.2)			
ระดับปานกลาง	80(94.1)	30(96.7)	110(94.8)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
ทัศนคติ				1.446	0.440–4.750	0.777
เชิงลบ	70(82.3)	27(87.1)	97(83.6)			
เชิงบวก	15(17.7)	4(12.9)	19(16.4)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
เพศ				4.585	1.283–16.386	0.016
ชาย	28(5.9)	3(0.3)	31(5.2)			
หญิง	57(94.1)	28(96.7)	85(94.8)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			

ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ต่อ)

ปัจจัย	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์			Odd Ratio	95 % CI	p-value
	ดื่ม	ไม่ดื่ม	รวม			
อายุ				0.672	0.267–1.687	0.501
ต่ำกว่า 45 ปี	56(65.9)	23(74.2)	79(68.1)			
สูงกว่า 45 ปี	29(34.1)	8(25.8)	37(31.9)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
สถานภาพสมรส				0.395	0.111 – 1.402	0.160
อยู่คนเดียว	6(7.1)	5(16.1)	11(9.5)			
อยู่คู่	79(92.9)	26(83.9)	105(90.5)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
การศึกษา				1.181	0.497–2.809	0.823
ประถมศึกษา	58(68.2)	20(64.5)	78(67.2)			
สูงกว่า	27(31.8)	11(35.5)	38(32.8)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
อาชีพ				1.400	0.587–3.339	0.520
เกษตรกร	51(60.0)	21(67.7)	72(62.1)			
อาชีพอื่น ๆ	34(40.0)	10(32.3)	44(37.9)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
รายได้เฉลี่ย				0.789	0.312–1.995	0.818
< 5,000 บาท	59(69.4)	23(74.2)	82(70.7)			
> 5,000 บาท	26(30.6)	8(25.8)	34(29.3)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
สถานภาพรายได้				1.706	0.581–5.007	0.452
พอใช้	64(75.3)	26(83.9)	90(76.6)			
ไม่พอใช้	21(24.7)	5(16.1)	26(22.4)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			

ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ต่อ)

ปัจจัย	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์			Odd Ratio	95 % CI	p-value
	ดื่ม	ไม่ดื่ม	รวม			
สถานภาพในชุมชน				0.489	0.168–1.421	0.230
ผู้นำชุมชน	61(71.8)	26(83.9)	87(75.0)			
อื่น ๆ	24(28.2)	5(16.1)	29(25.0)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
ระยะเวลาเป็น อสม.				1.547	0.669 – 3.577	0.401
น้อยกว่า 5 ปี	42(49.4)	12(38.7)	54(5.2)			
มากกว่า 5 ปี	43(50.6)	19(61.3)	62(94.8)			
รวม	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			
การมีโรคประจำตัว				0.928	0.377 – 2.289	1.000
มี						
ไม่มี	26(30.6)	9(29.0)	35(30.2)			
รวม	59(69.4)	22(71.0)	81(69.8)			
	85(100.0)	31(100.0)	116(100.0)			

การอภิปรายผล

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 73.3 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2546 ในกลุ่มประชากรอายุมากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 48) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และหาแนวทางแก้ไขปัญหามาให้อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนนำด้านสุขภาพอย่างมีคุณค่า ศักดิ์ศรีในบทบาทหน้าที่ต่อไป

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากการศึกษาพบว่า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่ม คือ เบียร์ รองลงมาคือเหล้าขาว และเหล้าสี

ตามลำดับ สำหรับสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่คือ เพื่อเข้าสังคม รองลงมาคือเพื่อนชวน และคลายเครียด ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประกิจ โพธิ์อาสน์ (2541), จิราภรณ์ เทพหนู (2540) ซึ่งพบว่าเครื่องดื่มที่นักเรียนนิยมดื่มส่วนใหญ่คือเบียร์ สาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ อันดับแรก คืออยากลอง เพื่อนชักชวน และดื่มเพื่อเข้าสังคม ตามลำดับ ส่วนโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนมากคืองานเลี้ยงสังสรรค์ รองลงมาคือว่างไม่มีอะไรจะทำ ความถี่ห่างในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 1 สัปดาห์ส่วนใหญ่จะดื่ม 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ดื่มส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง ครึ่ง – 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 100 บาท สำหรับการเกิดอุบัติเหตุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ พบว่าที่ประสบอุบัติเหตุสาเหตุเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 37.5

สรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีดังนี้

เพศ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศชายดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 5.9 เพศหญิงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 94.1 จากการศึกษาพบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเพศชายมีโอกาสเสี่ยงที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงกว่าเพศหญิง 4.585 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประกิจ โพธิ์อาสน์ (2541), จิราภรณ์ เทพหนู (2540) พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากสังคมไทยที่มองว่าเพศชายดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ เพศหญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่ดี จึงทำให้มีการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เพศชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง

ส่วนปัจจัยอื่น ๆ คือความรู้ ทักษะ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย สถานภาพรายได้ สถานภาพในชุมชน ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข และการมีโรคประจำตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุข

สรุปได้ว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีจากหลายสาเหตุอาจเนื่องมาจากค่านิยมทางสังคม การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งส่วนใหญ่เป็นแกนนำของชุมชนต้องมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เกิดความเคยชินและเป็นค่านิยมเรื่อย ๆ มา ดังนั้น จึงไม่เป็นการแปลกที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในอัตราที่สูง