

170711

ฟ้าใส ภูเกียรติ : ความรู้และความคิดเห็นต่อการนอนกัดฟันของผู้ป่วยที่มาได้รับการรักษาทางทันตกรรม (KNOWLEDGES AND OPINIONS OF DENTAL PATIENTS TO BRUXISM)
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ทญ.วันทนี มุทิตางกูร, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อ.ทญ.อดิษฐ์ มาลากุล
ณ อายุรยา 80 หน้า. ISBN 974-17-6835-4

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สํารวจระดับความรู้และความคิดเห็นต่อการนอนกัดฟันของผู้ป่วยที่มา
รับการรักษาทางทันตกรรม และ(2) ศึกษาผลของปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
นอนกัดฟัน และการรายงานการนอนกัดฟันต่อระดับความรู้และความคิดเห็น ทำการศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2547 โดยผู้ป่วยจำนวน 450 คนตอบแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วยแบบวัดความรู้จำนวน 25 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ของการนอนกัดฟัน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการนอนกัดฟันในด้านต่างๆ จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามนี้ผ่านการประเมินความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาทันตแพทยศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ และผ่านการทดสอบความเที่ยง โดยแบบวัดความรู้มีค่าความ
เชื่อมั่น .8778 และแบบสอบถามความคิดเห็นมีค่าความเชื่อมั่น .8224 ผลศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีคะแนนรวมในด้านความรู้
เรื่องนอนกัดฟันโดยเฉลี่ยร้อยละ 39.8 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับน้อย ผู้ป่วยร้อยละ 51.6-81.9 เห็นว่าการนอนกัดฟันมี
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่มากนัก และผู้ป่วยร้อยละ 50.7-68.9ไม่ค่อยสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
การนอนกัดฟัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มาได้รับการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 78.9 ตระหนักถึงความสำคัญของการ
รักษาการนอนกัดฟัน ในส่วนของความรู้พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่มีเพศ อายุ และการ
รายงานการนอนกัดฟันต่างกัน ผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับสูงและผู้ป่วยที่เคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนอนกัดฟันจะมี
ความรู้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ($p < .01$) ในส่วนของความคิดเห็นพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนอนกัดฟันต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่รายงาน
การนอนกัดฟันต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนอนกัดฟันต่างกันบ้างอย่างมีนัยสำคัญ ($p < .01$)

โดยสรุปพบว่าถึงแม้ผู้ป่วยที่มาได้รับการรักษาทางทันตกรรมจะตระหนักถึงความสำคัญในการรักษา แต่
ผู้ป่วยก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนอนกัดฟันระดับน้อย เห็นว่าการนอนกัดฟันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันไม่มากนัก
และไม่ค่อยสนใจติดตามข่าวสารเรื่องการนอนกัดฟัน

ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
ปีการศึกษา 2547

ลายมือชื่อนิติต..... ฟ้าใส ภูเกียรติ.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... มุทิตางกูร.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... อดิษฐ์ มาลากุล.....

170711

4676117032 : MAJOR OCCLUSION

KEYWORD : KNOWLEDGE/ OPINION/ BRUXISM

FASAI PUKIAT : KNOWLEDGES AND OPINIONS OF DENTAL PATIENTS TO BRUXISM

THESIS ADVISOR : PROFESSOR ASSISTANCE WANTANEE MUTIRANGURA,

THESIS CO-ADVISOR : ATINUCH MALAKUL, 80 pp. ISBN 974-17-6835-4

This purpose of this study were (1) to survey knowledge level and opinions of dental patients to bruxism and (2) to study the effect of gender, age, education, perception about bruxism and self report of bruxism to the knowledge level and the opinions. The study was conducted between October to December 2004. Total of 450 patients were included. A 25-item test for measuring the knowledge and a 20-item questionnaire for the opinion assessment were developed. The validity of the scale was approved by experts in the fields of dental sciences and social sciences. The reliability of the scale was .8778 in knowledge test and .8224 in opinion questionnaire. The result of this study revealed that the dental patients had low knowledge score as average of 39.8%. In addition 51.6-81.9% of the patients felt that bruxism had minor impact on daily life and 50.7-68.9% of them had few interests in seeking information about bruxism. However 78.9% of the dental patients realized the importance of bruxism treatment. In knowledge component, no significant difference was found between patients with different gender, age and perception about bruxism. Patients with higher education and patient who were informed previously about bruxism had more knowledge level ($p < .01$). In opinion component, no significant difference was found in patient with different gender, age, education and perception about bruxism. However patients with different self report of bruxism had some different opinions ($p < .01$).

In conclusion, it was found that although most patients realized the importance of bruxism treatment, they had little knowledge about bruxism, minor impact on daily life, and few interests in seeking information about bruxism.

Department of Occlusion

Field of Study Occlusion

Academic year 2004

Student *Fasai Pukit*

Advisor *Wantanee Mutirangura*

Co-advisor *A. Malakul*