

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา: กรณีศึกษาศาลจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิตนักโทษคดีอาญา
- 2) เพื่อศึกษาการกระทำความผิดหรือมูลเหตุการกระทำความผิดที่มีโทษประหารชีวิต
- 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา กรณีศึกษาศาลจังหวัดขอนแก่น
- 4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิตนักโทษคดีอาญา มูลเหตุแห่งการกระทำความผิดของนักโทษประหารชีวิตกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการลงโทษประหารชีวิต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ พนักงานสอบสวน และเภสัชกร จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 201 คน ผู้วิจัยเน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows วิเคราะห์โดยใช้สถิติ หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร (Independent t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way Anova) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน คือ 37,764.46 บาท รายจ่ายต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป และรายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน คือ 27,075.87 บาท

5.1.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิตนักโทษคดีอาญา

ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องการประหารชีวิตนักโทษจะต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลโดยผู้พิพากษาเท่านั้น รองลงมา มีความรู้เรื่องแพทย์ที่ได้รับมอบหมายชันสูตรศพเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง คือ พิสูจน์ศพก่อนนำไปเผา

5.1.3 มลเหตุการณ์กระทำความผิดของนักโทษประหารชีวิต

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าความต้องการทางด้านเศรษฐกิจเป็นมูลเหตุสำคัญของการกระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยารองลงมาคิดว่าการติดยาเสพติดอย่างรุนแรงอาจเป็นมูลเหตุสำคัญของการกระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา คิดว่าความขัดแย้งหรือการล้างแค้นส่วนตัวเป็นมูลเหตุสำคัญของการกระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา คิดว่าความหึงหวงชั้นคู่สาวเป็นมูลเหตุสำคัญของการกระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา

5.1.4 แนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา พบว่า

1) การพัฒนาด้านคุณภาพยาที่ใช้ฉีดยานักโทษประหารชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในภาพรวมมีความคิดเห็นด้วยระดับมาก ในประเด็นย่อยพบว่าเห็นด้วยระดับมากที่ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของยาที่ใช้ฉีดยานักโทษประหารชีวิตก่อนเสมอ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{x}=4.50$) รองลงมาคือควรใช้เข็มฉีดยาใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการลงโทษนักโทษประหารชีวิตคดีอาญา คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{x}=4.34$) รองลงมาควรมีการตรวจสอบ

2) การพัฒนาปริมาณของยาที่ใช้ฉีดยานักโทษ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในภาพรวมเห็นด้วยระดับมาก สำหรับประเด็นย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยที่ควรมีการทดสอบก่อนว่าปริมาณของยาที่ใช้ถูกต้องหรือไม่ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{x}=4.45$) รองลงมา ก่อนการผสมยาฉีดและใช้เข็มฉีดยาควรให้แพทย์ตรวจสอบก่อนทุกครั้งที่ใช้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{x}=4.37$)

3) การพัฒนาด้านความเชี่ยวชาญของเจ้าพนักงานเรือนจำที่ทำหน้าที่ฉีดยาเข้าสู่ร่างกายนักโทษประหารชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในภาพรวมเห็นด้วยระดับมาก สำหรับประเด็นย่อยเห็นด้วยในเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยากับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เป็นประจำทุกเดือน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{x}=4.35$) รองลงมาควรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ศพหลังการฉีดยาเข้าสู่ร่างกายนักโทษประหารชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{x}=4.34$)

4) การพัฒนาชนิดของยาที่ใช้ฉีดยานักโทษประหารชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในภาพรวมเห็นด้วยระดับมาก ประเด็นย่อยพบว่าในเรื่องควรมีการคิดค้นชนิดของยาที่ใช้ฉีดยานักโทษประหารชีวิตเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{x}=4.38$) รองลงมายาที่ใช้ฉีดยานักโทษประหารชีวิตควรได้รับคำรับรองจากคณะแพทย์ที่เป็นคณะกรรมการการลักขีพยานก่อนฉีดยาเข้าสู่ร่างกายนักโทษประหารชีวิตก่อนเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ($\bar{x}=4.35$)

5.1.5 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิตนักโทษคดีอาญา มูลเหตุแห่งการกระทำความผิดของนักโทษคดีอาญากับแนวทางการพัฒนาพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา

วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ตัวแปร ด้วย (Independent t-test)

ตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยทดสอบโดยใช้ การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 ตัวแปร ด้วย (Independent-t t-test) สรุปผลดังนี้

เพศ พบว่า เพศชายต่างกันมีแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เพศชายมีแนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพยาที่ใช้ฉีดยานักโทษประหารชีวิตน้อยกว่าเพศหญิง แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน แนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ตำแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีแนวทางการพัฒนารูปแบบการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ความรู้ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาแตกต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ตัวแปร อายุ สถานภาพสมรส รายได้ รายจ่าย และมูลเหตุของการกระทำความผิดของนักโทษประหารชีวิต ผู้วิจัยทดสอบโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน แนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาปริมาณของยาที่ใช้ฉีดยานักโทษประหารชีวิต แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านความความเชี่ยวชาญของเจ้าพนักงานเรือนจำที่ทำหน้าที่ฉีดยาเข้าสู่ร่างกายนักโทษประหารชีวิต แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา

ปริมาณของยาที่ใช้ฉีดนักโทษประหารชีวิต ด้านการพัฒนาด้านความเชี่ยวชาญของเจ้าพนักงานเรือนจำที่ทำหน้าที่ฉีดยาเข้าสู่ร่างกายนักโทษประหารชีวิต แตกต่างกันในระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่างกันแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันในระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

รายจ่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายจ่ายต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันในระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

มูลเหตุของการกระทำความผิดของนักโทษแตกต่างกับแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา แตกต่างกัน

มูลเหตุแห่งการกระทำความผิดของนักโทษประหารชีวิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมูลเหตุแห่งการกระทำความผิดของนักโทษต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา โดยรวมแตกต่างกันในระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมูลเหตุแห่งการกระทำความผิดของนักโทษแตกต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาการพัฒาชนิดของยาที่ใช้ฉีดนักโทษประหารชีวิต แตกต่างกันในระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

5.1.6 ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆต่อแนวทางการพัฒนาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะ คือ ผู้ฉีดยาต้องเป็นผู้มีวิชาชีพทางพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 55.5 สามารถลดขั้นตอนการฉีดยา และถ่ายทอดสด คิดเป็นร้อยละ 54.7 แจ้งสิทธิ, ประชาสัมพันธ์, แนะนำสื่อมวลชน คิดเป็นร้อยละ 45.0 การฉีดยาทำให้ไม่ทรมาน คิดเป็นร้อยละ 51.7 ควรใช้ยาคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 25.6 ทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และผลกระทบต่ำ คิดเป็นร้อยละ 16.3 ทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และผลกระทบต่ำ การประหารเก็บเป็นความลับ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดำเนินการตามกฎหมายที่เคยใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.3 ไม่ควรใช้การลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 1.0

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะคือผู้ฉีดยาต้องเป็นผู้มีความรู้มีวิชาชีพทางพยาบาล รวมถึงควรลดขั้นตอนการฉีดยา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณและเพิ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพพยาบาลรวมถึงการฝึกอบรมเป็นประจำเพื่อช่วยในการดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยวิธีการฉีดยาให้มีความชำนาญมากขึ้น

2) จากการวิจัยพบว่า การติดยาเสพติดอย่างรุนแรง ความขัดแย้งหรือการล้างแค้นส่วนตัว รวมไปถึงความหึงหวงชั้นคู่สาว เป็นมูลเหตุของการกระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดยา ดังนั้นรัฐควรมีนโยบายในการรณรงค์และการป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา, ศีลธรรม และจริยธรรมเพื่อให้ประชาชนรู้สำนึกในการกระทำความผิดมากขึ้น

3) จากผลการวิจัยที่พบว่า มูลเหตุสำคัญของการกระทำความผิดของนักโทษคดีอาญาที่สำคัญได้แก่ความต้องการด้านเศรษฐกิจ รัฐจึงควรมีการวางแผนพัฒนาและสร้างงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ตลอดจนการกระจายรายได้และสวัสดิการของรัฐด้านต่าง ๆ ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนยากจน

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป

- 1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณของยาที่ใช้ฉีดให้เหมาะสม
- 2) ควรทำการวิจัยเชิงสหวิทยาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล อัยการ ตำรวจราชทัณฑ์ หน่วยงาน แพทย์ เภสัชกร เป็นต้น เพื่อปรับปรุงกระบวนการลงโทษผู้กระทำความผิดที่มีโทษประหารชีวิตและพัฒนาความเชี่ยวชาญของเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับการฉีดยาเข้าสู่ร่างกายนักโทษประหาร
- 3) ควรมีการศึกษาวิจัยจากเอกสารคำพิพากษาการลงโทษผู้กระทำความผิดคดีอาญาที่มีโทษประหารชีวิต เกี่ยวกับมูลเหตุการกระทำความผิดและผลจากการกระทำความผิด