

ตารางผนวกที่ 41 ปริมาณธาตุอาหารในซากพืชในแต่ละเดือนของป่า 5 ชนิด

ชนิดป่า	เดือน	(%)				
		N	P	K	Ca	Mg
ป่าเบญจพรรณชื้น	เม.ษ 44	1.26	0.09	0.57	1.20	0.36
	พ.ค	1.56	0.08	0.15	2.80	0.32
	มิ.ย	1.58	0.10	0.19	2.40	0.32
	ก.ค	1.4	0.07	0.19	2.00	0.24
	ส.ค	1.33	0.08	0.51	2.21	0.16
	ก.ย	1.25	0.10	0.44	2.82	0.18
	ต.ค	1.29	0.08	0.37	2.20	0.23
	พ.ย	1.18	0.08	0.46	1.78	0.17
	ธ.ค	0.77	0.10	0.03	0.95	0.10
	ม.ค 45	0.69	0.10	0.04	1.12	0.13
	ก.พ	0.72	0.08	0.05	0.94	0.12
	มี.ค	0.66	0.07	0.03	0.69	0.08
	เม.ย	0.73	0.10	0.05	0.96	0.13
	พ.ค	1.25	0.09	0.05	0.90	0.12
	มิ.ย	1.42	0.10	0.05	0.95	0.11
ป่าเบญจพรรณ	เม.ษ 44	1.14	0.01	0.25	1.20	0.16
	พ.ค	1.23	0.04	0.12	2.00	0.16
	มิ.ย	0.99	0.04	0.12	2.40	0.16
	ก.ค	1.04	0.04	0.11	1.20	0.20
	ส.ค	0.77	0.04	0.15	1.24	0.12
	ก.ย	0.87	0.03	0.27	2.00	0.12
	ต.ค	0.77	0.04	0.41	2.01	0.16
	พ.ย	0.77	0.03	0.37	1.82	0.16
	ธ.ค	1.46	0.05	0.02	0.73	0.07
	ม.ค 45	1.32	0.08	0.06	0.83	0.11
	ก.พ	1.43	0.06	0.04	0.90	0.11
	มี.ค	1.32	0.09	0.04	1.00	0.08
	เม.ย	1.65	0.08	0.06	0.71	0.11
	พ.ค	1.41	0.07	0.06	0.63	0.09
	มิ.ย	1.07	0.07	0.05	0.72	0.11

ตารางผนวกที่ 41 (ต่อ)

ชนิดป่า	เดือน	(%)				
		N	P	K	Ca	Mg
ป่าเต็งรังที่พัฒนา	เม.ษ 44	0.78	0.03	0.13	0.80	0.16
	พ.ค	0.68	0.02	0.10	0.80	0.16
	มิ.ย	0.88	0.02	0.07	0.80	0.12
	ก.ค	0.74	0.02	0.06	0.80	0.16
	ส.ค	0.66	0.01	0.06	0.59	0.10
	ก.ย	0.66	0.01	0.05	0.58	0.07
	ต.ค	0.84	0.03	0.11	0.63	0.09
	พ.ย	0.84	0.02	0.13	0.71	0.08
	ธ.ค	0.87	0.04	0.01	0.37	0.06
	ม.ค 45	0.80	0.05	0.03	0.24	0.06
	ก.พ	0.83	0.05	0.02	0.28	0.06
	มี.ค	0.87	0.05	0.03	0.29	0.06
	เม.ย	0.90	0.05	0.02	0.36	0.07
	พ.ค	0.52	0.05	0.02	0.36	0.07
	มิ.ย	0.81	0.05	0.03	0.30	0.06
ป่าเต็งรังแควะ	เม.ษ 44	1.36	0.02	0.08	0.80	0.20
	พ.ค	0.58	0.01	0.04	0.80	0.16
	มิ.ย	0.74	0.02	0.06	0.80	0.16
	ก.ค	0.64	0.01	0.05	0.80	0.16
	ส.ค	0.59	0.01	0.11	0.69	0.10
	ก.ย	0.59	0.01	0.08	0.59	0.09
	ต.ค	0.56	0.01	0.10	0.60	0.12
	พ.ย	0.63	0.01	0.07	0.74	0.12
	ธ.ค	0.8	0.04	0.01	0.42	0.07
	ม.ค 45	0.72	0.10	0.03	0.33	0.10
	ก.พ	0.66	0.08	0.03	0.35	0.11
	มี.ค	0.7	0.08	0.02	0.30	0.07
	เม.ย	0.8	0.12	0.04	0.42	0.14
	พ.ค	0.7	0.11	0.04	0.38	0.12
	มิ.ย	0.72	0.10	0.04	0.39	0.12

ตารางผนวกที่ 41 (ต่อ)

ชนิดป่า	เดือน	(%)				
		N	P	K	Ca	Mg
ป่าเต็งรังรุ่น 2	เม.ษ 44	0.68	0.02	0.11	0.80	0.16
	พ.ค	0.68	0.01	0.05	0.80	0.16
	มิ.ย	0.78	0.02	0.07	0.80	0.16
	ก.ค	0.88	0.02	0.06	0.80	0.16
	ส.ค	0.66	0.01	0.06	0.61	0.10
	ก.ย	0.69	0.01	0.02	0.57	0.08
	ต.ค	0.59	0.01	0.14	0.56	0.12
	พ.ย	0.73	0.02	0.16	0.57	0.11
	ธ.ค	0.89	0.04	0.01	0.22	0.05
	ม.ค 45	0.87	0.04	0.01	0.31	0.07
	ก.พ	0.73	0.05	0.01	0.30	0.06
	มี.ค	0.90	0.05	0.01	0.24	0.07
	เม.ย	1.05	0.05	0.03	0.33	0.07
	พ.ค	0.91	0.05	0.01	0.32	0.06
	มิ.ย	0.83	0.05	0.01	0.35	0.07

ตารางผนวก1 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้น (แปลงวิจัยที่ A1) ในป่าเบญจพรรณชื้น (Lower Mixed Deciduous Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 620 - 638 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	จากโคนถึงกิ่ง แรก (นิ้ว)
01	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	7.50	3.70	1.47	5.00
02	มะหิมน้ำ	<i>Irvingia malayana</i>	10.00	10.30	4.10	9.00
03	เป่าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	56.00	22.29	3.00
04	ยางยาย	<i>Colona flagrocarpa</i> (Tiliaceae),	12.00	26.20	10.43	2.00
05	Unknown	-	2.00	2.00	0.79	0.70
06	มะโจก	<i>Schleicheraoleosa</i>	1.80	2.00	0.79	0.60
07	เปกล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	14.00	5.57	1.50
08	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	8.00	6.00	2.39	-
09	ชะเงะ	<i>Millettia</i> spp.,	1.50	2.00	0.79	1.20
10	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	8.00	6.00	2.39	-
12	ปี่ไผ่	<i>Dalbergia cana</i>	5.00	6.50	2.59	0.70
13	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i>	5.00	10.50	4.18	0.50
14	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i>	5.00	10.00	3.98	0.50
15	มะกายขัด	<i>Mallotus philippensis</i>	8.00	37.00	14.73	5.00
16	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	7.00	15.00	5.97	5.00
17	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	13.00	5.18	-
18	เม่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.00	5.50	2.19	1.50
19	เม่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.00	4.00	1.59	1.50
20	แดง	<i>Xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	2.50	4.00	1.59	1.82
21	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	15.00	33.00	13.14	6.00
22	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	15.00	13.50	5.37	-
23	เตมิม	<i>Bischofia javanica</i>	15.00	35.00	13.93	1.17
25	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	8.00	12.00	4.78	7.00
26	สักเครือทอง	-	3.40	4.00	1.59	-
27	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	6.00	9.50	3.78	3.00
28	แดง	<i>Xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	15.00	25.00	9.95	8.00
29	ไม้เลื้อย	<i>Lagerstromia tomentosa</i> Presl	16.00	3.50	1.39	10.00
30	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	15.50	6.17	-
31	เครือมะน้า	-	10.00	15.00	5.97	-
32	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	4.00	1.59	-

ตารางผนวก1 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	จากโคนถึงกิ่งแรก (นิ้ว)
33	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	6.50	2.59	-
34	แห่น	<i>Terminalia belerica roxb.</i>	18.00	630	157.50	8.00
35	เครือมะนาว	-	14.00	11.00	4.38	-
36	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	10.00	25.00	9.95	6.00
37	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	10.00	21.00	8.36	6.00
38	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	10.00	12.00	4.78	3.00
39	ปี่ไฉง	<i>Dalbergia cana</i>	10.00	14.00	5.57	1.20
40	ปี่ไฉง	<i>Dalbergia cana</i>	8.00	21.00	8.36	4.00
41	สมอภิกษา	<i>Terminalia belerica roxb.</i>	1.50	3.50	1.39	1.20
42	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea,</i>	1.50	3.50	1.39	1.30
43	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	15.00	31.00	12.34	1.00
44	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	14.00	24.00	9.55	1.00
45	ปอผี	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	6.00	9.00	3.58	2.50
46	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	15.00	28.00	11.15	0.80
47	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	14.00	23.00	9.16	0.80
48	ปอผี	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	15.00	35.00	13.93	0.30
49	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	5.00	8.00	3.19	2.00
50	ขางหัวหมู	<i>Milusa velutina</i> ,Hoo. f. & t homs.	10.00	21.00	8.36	6.00
51	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	6.00	9.00	3.58	0.80
52	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	16.00	27.50	10.95	5.00
53	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	2.50	4.00	1.59	0.70
54	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	16.00	38.00	15.13	4.00
55	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	8.00	20.00	7.96	1.00
57	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	7.00	10.00	3.98	1.50
58	ข่างหัวหมู	<i>Milusa velutina,</i>	6.00	9.00	3.58	1.10
59	มะโจก	<i>Schleicheraoleosa</i>	2.50	5.00	1.99	2.00
61	ปอผี	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	7.00	7.50	2.99	1.00
62	จิวป่า	<i>Bombax valetonii</i> Hochr.	10.00	7.00	6.77	9.00
63	ตาเสือป่า	<i>Morinda Coreia</i> Ham.	1.60	40.50	16.12	1.30
64	ปอผี	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	2.00	5.00	1.99	1.50
66	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	2.00	24.00	9.55	1.00

ตารางผนวก1 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	จากโคนถึงกิ่งแรก (นิ้ว)
67	ชะเงาะ	<i>Millettia</i> spp.,	5.00	6.50	2.59	1.50
68	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	8.00	12.00	4.78	6.00
69	เปล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	1.20	32.00	12.74	0.80
70	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	1.20	27.00	10.75	0.80
71	ซ้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	8.00	10.50	4.18	1.80
72	ปอมีน,	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	2.00	22.50	8.96	0.20
73	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata</i> ,	3.50	12.00	4.78	3.00
74	หนามหัน	<i>Acacia comosa</i> Gagnep	1.50	12.00	4.78	-
75	เปล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	17.00	6.77	2.50
76	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata</i> ,	8.00	9.00	3.58	3.00
77	ห้าดวง	<i>Syzygium albiflorum</i>	12.00	16.00	6.37	6.00
78	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	12.00	63.00	25.08	10.00
79	เปล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	5.00	16.00	6.37	2.00
80	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	6.00	7.50	2.99	-
81	ดงดำ	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	11.00	22.50	8.96	4.00
82	ดงดำ	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	11.00	37.00	14.73	4.00
83	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	4.00	13.50	5.37	1.50
85	มะไฟ	<i>Paccaurea ramiflora</i>	6.00	18.50	7.37	3.00
86	Unknown	-	8.00	31.00	12.34	4.00
87	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	1.00	10.00	3.98	-
88	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	2.00	7.00	2.79	-
89	เปล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	12.00	24.00	9.55	6.00
90	เปล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	3.00	6.50	2.59	0.70
91	ชะมวง	<i>Garcinia acuminata</i> planch	3.00	7.00	2.79	-
92	เมาสาย	<i>Antidesma acidum</i>	6.00	10.50	4.18	4.00
93	ชะเงาะ, ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	11.00	31.00	12.34	6.00
94	ชะเงาะ, ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	4.00	12.00	4.78	2.00
95	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	3.00	12.00	4.78	-
96	เปล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	3.00	18.50	7.37	1.80
97	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i>	12.00	10.50	4.18	-

ตารางผนวก1 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	จากโคนถึงกิ่งแรก (นิ้ว)
98	ปีโปง	<i>Dalbergia cana</i>	3.00	6.00	2.39	0.50
99	เมาสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.50	4.50	1.79	1.50
100	ซ้อเสียน	<i>Gmelina arborea,</i>	7.00	14.00	5.57	6.00
101	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	22.00	8.76	6.00
102	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i>	12.00	6.50	2.59	-
103	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	13.00	7.00	2.79	4.00
104	ชะแจะ, ปี่จั่น	<i>Millettia spp.,</i>	4.00	9.00	3.58	2.00
105	ชะแจะ, ปี่จั่น	<i>Millettia spp.,</i>	3.00	16.00	6.37	2.00
106	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i>	3.00	4.50	1.79	-
107	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	3.00	6.00	2.39	1.50
108	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	3.50	7.00	2.79	2.00
109	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	3.00	4.50	1.79	0.80
110	มะดุก	<i>Xanthophyllum virens Roxb</i>	2.00	6.00	2.39	1.50
111	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	2.50	3.00	1.19	1.52
112	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	2.50	4.00	1.59	1.80
113	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	2.00	8.00	3.19	1.80
114	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i>	3.00	4.50	1.79	-
115	ปอมีน	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	3.00	8.00	3.19	2.00
117	ชะแจะ, ปี่จั่น	<i>Millettia spp.,</i>	3.00	5.00	1.99	2.00
118	ชะแจะ, ปี่จั่น	<i>Millettia spp.,</i>	3.50	5.50	2.19	1.80
119	รางจืด	<i>Thunbergia lourifolia linn</i>	8.00	4.00	1.59	-
122	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i>	15.00	17.00	6.77	-
123	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i>	20.00	12.00	4.78	-
124	Unknown	-	21.00	9.00	3.58	3.00
125	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	4.50	7.00	2.79	2.80
126	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i>	15.00	6.00	2.39	-
127	ฮ้อยช้าง, กูก	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	9.00	17.00	6.77	8.00
128	เครือตีนตุ๊ก	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	15.00	16.00	6.37	-
129	ยางนา	<i>Dipterocarpus alata</i>	28.00	78.00	31.05	10.00
131	เมาสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.00	2.00	0.79	0.95
132	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata,</i>	2.50	2.00	0.79	1.50

ตารางผนวก1 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	จากโคนถึงกิ่งแรก (นิ้ว)
133	ยางนา	<i>Dipterocarpus alata</i>	2.50	5.00	1.99	1.80
134	ชะแจะ, ปี่จั่น	<i>Millettia spp.</i> ,	3.00	3.50	1.39	2.00
135	ชะแจะ, ปี่จั่น	<i>Millettia spp.</i> ,	3.00	5.00	1.99	2.00
136	เครือตีนตั่ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	10.00	3.98	-
137	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	2.50	3.00	1.19	0.80
138	ตีนจ้ำ	<i>Ardisia polycephala</i> Wall.	3.50	18.00	7.17	0.70
139	ชะแจะ, ปี่จั่น	<i>Millettia spp.</i> ,	9.00	11.50	4.58	4.50
140	หัสไฮ	-	15.00	45.00	17.91	5.00
141	เครือตีนตั่ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	11.00	4.38	-
142	ดงดำ	<i>Alphonsea boniana</i>	8.50	15.00	5.97	4.50
143	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata</i> ,	15.00	31.00	12.34	4.50
145	แคทราย	<i>S. neuranthum</i> ,	2.50	4.50	1.79	1.30
147	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	15.00	23.00	9.16	7.00
149	ติ่ม	<i>Bischofia Javanica</i> Blume	4.50	9.50	3.78	1.00
150	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	7.00	10.50	4.18	3.50
151	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	8.50	21.00	8.36	2.58
152	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	9.00	25.00	9.95	2.50
153	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	15.00	30.50	12.14	0.70
154	ชะแจะ, ปี่จั่น	<i>Millettia spp.</i> ,	3.00	4.00	1.59	0.80
155	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	15.00	46.50	18.51	1.80
156	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	15.50	6.17	2.50
157	ปีบ	<i>Millingtonia hortensis</i> (Bignoniaceae),	9.00	16.00	6.37	8.00
158	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	21.00	8.36	3.50
159	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> , Kurz.	3.00	5.00	1.99	1.80
160	หนามหัน	<i>Acacia comosa</i> Gagnep	30.00	16.00	6.37	-
161	แสลงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae)	8.00	13.00	5.18	0.50
162	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	8.00	13.50	5.37	0.80
163	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	2.00	4.00	1.59	0.80
164	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	18.00	7.17	6.00
165	เครือตีนตั่ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	7.50	9.50	3.78	-

ตารางผนวก1 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	จากโคนถึงกิ่งแรก (นิ้ว)
166	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	8.00	53.00	21.10	1.40
167	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	9.50	36.00	14.33	3.00
168	หัลไฮ	-	2.50	9.00	3.58	1.50
169	ชะเงะ, ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	2.50	4.00	1.59	1.80
170	ช่อย	<i>Streblus asper</i> var. <i>asper</i>	2.50	8.00	3.19	1.20
171	ปอมีน	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	2.50	5.00	1.99	1.45
172	แคทราย	<i>S. neuranthum</i> ,	2.30	4.00	1.59	1.20
173	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	2.50	6.00	2.39	1.80
174	นมวัว	<i>Cyathostemma micranthum</i> (A.DC)j.sinel	1.90	4.50	1.79	0.60
175	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	12.00	35.00	13.93	2.30
176	ชะเงะ, ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	11.00	26.00	10.35	4.00
177	เปิ้ล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	24.00	9.55	3.00
178	ช้อยช้าง, กูก	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	2.00	5.00	1.99	-
179	เครือตีนต้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	7.00	8.00	3.19	-
180	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	11.00	15.00	5.97	1.80
181	ปี่พัง	<i>Dalbergia cana</i>	14.00	24.00	9.55	12.00
182	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	2.50	4.00	1.59	0.80
183	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	11.00	21.00	8.36	0.80
184	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	25.00	77.00	30.65	3.00
185	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	11.00	26.00	10.35	4.00
186	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	2.50	2.00	0.80	1.50
188	แหนน	<i>T.glaucifolia</i>	2.50	5.00	1.99	1.50
189	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	7.50	27.00	10.75	2.10
190	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	8.50	19.00	7.56	6.00
191	กระดังงาป่า	<i>Cananga latatifolia</i>	15.00	50.50	20.10	4.50
192	แคทราย	<i>S. neuranthum</i> ,	13.00	13.00	5.18	3.00
193	ดุ่มคำ	<i>A.phanamixis polystachya</i>	10.00	34.00	13.54	10.00
194	เครือตีนต้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	3.50	5.00	1.99	-
195	แคทราย	<i>S. neuranthum</i> ,	8.00	8.00	3.19	1.80
196	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	8.00	20.00	7.96	0.35
197	เครือตีนต้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	2.20	5.00	1.99	-

ตารางผนวก1 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	จากโคนถึงกิ่งแรก (นิ้ว)
198	ตุ่มคำ	<i>A.phanamixis polystachya</i>	6.00	2.00	0.80	1.50
199	มะดูก	<i>Xanthophyllum virens</i> Roxb	-	18.00	7.17	0.20
200	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i>	4.00	18.00	7.17	-
201	ดงดำ	<i>Alphonsea boniana</i>	2.00	3.00	1.19	1.50
202	ดงดำ	<i>Alphonsea boniana</i>	8.00	37.00	14.73	2.50
203	เตม	<i>Bischofia Javanica</i> Blume	2.00	6.00	2.39	0.70
204	ยางนา	<i>Dipterocarpus alata</i>	9.00	23.00	9.16	1.80
205	มะกายขัด	<i>Mallotus philippensis</i>	6.00	20.00	7.96	3.00
206	มะกายขัด	<i>Mallotus philippensis</i>	7.00	26.00	10.35	0.80
207	ชะเงะ, ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	2.50	7.00	2.79	1.80
208	ชะเงะ, ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	2.10	5.00	1.99	0.80
209	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	7.00	12.00	4.78	3.00
210	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A.Benn	4.00	15.00	5.97	0.80
211	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	15.00	62.00	24.68	-
212	unknown	-	6.00	16.00	6.37	2.50
213	ชะเงะ, ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	8.00	5.00	1.99	3.00
214	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	-	6.00	2.39	-
215	มะกอกหลวง	<i>Choerospondias axillaris</i>	4.00	11.00	4.38	1.30
216	ผีเสื้อ	<i>A.chinense</i>	4.00	5.00	1.99	2.00
217	มะกายขัด	<i>Mallotus philippensis</i>	5.00	6.00	2.39	2.00
218	ช้อยช้าง, กูก	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	8.00	15.00	5.97	6.00
219	ชะเงะ ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	15.00	33.00	13.14	7.00
220	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	8.00	10.00	3.98	3.00
221	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	1.90	4.00	1.59	-
222	โมกหลวง	<i>Holarrhena pubescens</i> Wall.ex G.Don	2.20	5.00	1.99	1.20
223	ก่อ	<i>Quercus semiserrata</i>	13.00	38.00	15.13	0.80
224	เปล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	4.00	9.00	3.58	0.80
225	เปล้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	13.00	26.00	10.35	10.00
226	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak.Var.extensa Benth	-	13.00	5.18	-
227	ยางพาย	<i>Polyalthia uiridis</i>	6.00	10.00	3.98	2.00
228	ชะเงะ, ปี่จั่น	<i>Millettia</i> spp.,	11.00	28.00	11.15	0.10

ตารางผนวก1 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	จากโคนถึงกิ่งแรก (นิ้ว)
230	ขะแจะ	<i>Millettia</i> spp.,	-	11.00	4.38	2.00
231	มะกายขัด	<i>Mallotus philippensis</i>	6.00	18.00	7.17	0.56
232	ต้นต้ง	-	2.00	5.00	1.99	0.50
233	ตะเคียน	<i>Anogeissus acuminata</i> ,	20.00	955.00	380.18	10.00
234	แคทราย	<i>S. neuranthum</i> ,	13.00	19.00	7.56	8.00
235	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A.Benn	3.00	27.00	10.75	0.80
237	หนามมะเกิด	<i>C.paruifolium</i>	1.80	3.00	1.19	0.80
238	ซ้อเสียน	<i>Gmelina arborea</i> ,	12.00	19.00	7.56	4.00
239	เครือขอนแก่น	<i>Congea tomentosa</i>	-	13.00	5.18	-
240	ขะแจะ	<i>Millettia</i> spp.,	8.00	19.00	7.56	1.60

ตารางผนวก2 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ยืนต้น (แปลงทดลอง A) ในป่าเบญจพรรณชื้น (Lower Mixed Deciduous Forest) ที่ระดับความสูง
จากน้ำทะเล 620 –638 เมตร

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย	ความหนาแน่น	ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ (IVI)
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD) (RDO _A)	
เพกา	6.000	6.510	4.000	1.500	0.240	2.564	16.000	2.484	7.776 1.010	6.058
มะหมื่นน้ำ	5.000	7.813	2.000	2.500	0.200	2.137	8.000	1.242	11.980 1.556	4.935
เป่าหลวง	21.000	1.860	12.000	1.750	0.840	8.974	48.000	7.453	15.321 1.989	18.417
ยางพาย	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	8.229 1.069	2.117
ยางยาย	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	21.559 2.799	3.848
unknown	4.000	9.766	3.000	1.333	0.160	1.709	12.000	1.863	11.827 1.536	5.109
มะโจ๊ก	2.000	19.531	2.000	1.000	0.080	0.855	8.000	1.242	2.468 0.320	2.417
เครือตีนตั้ง	22.000	1.776	16.000	1.375	0.880	9.402	64.000	9.938	9.519 1.236	20.576
ชะเง้อ, ปี่จั่น	21.000	1.860	19.000	1.105	0.840	8.974	76.000	11.801	9.750 1.266	22.042
ปี่พวง	4.000	9.766	1.000	4.000	0.160	1.709	4.000	0.621	11.827 1.536	3.866
แดง	10.000	3.906	5.000	2.000	0.400	4.274	20.000	3.106	26.176 3.399	10.778
สัก	15.000	2.604	9.000	1.667	0.600	6.410	36.000	5.590	17.251 2.240	14.240
สักเครือทอง	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	3.291 0.427	1.476
ไม้เตม	2.000	19.531	1.000	2.000	0.080	0.855	4.000	0.621	30.734 3.991	5.467

ตารางผนวก2 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
ไม้เลื้อย	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	2.863	0.372	1.420	
เครือมะนาวป่า	2.000	19.531	1.000	2.000	0.080	0.855	4.000	0.621	10.697	1.389	2.865	
แหวน	4.000	9.766	3.000	1.333	0.160	1.709	12.000	1.863	4.033	0.524	4.096	
ตีนเป็ด	4.000	9.766	2.000	2.000	0.160	1.709	8.000	1.242	15.908	2.066	5.017	
เครือปี	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	11.519	1.496	2.544	
ปอหมี	7.000	5.580	5.000	1.400	0.280	2.991	20.000	3.106	10.815	1.404	7.501	
ขางหัวหมู	2.000	19.531	1.000	2.000	0.080	0.855	4.000	0.621	12.342	1.603	3.078	
มะไฟ	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	15.223	1.977	3.025	
มะแฟน	10.000	3.906	4.000	2.500	0.400	4.274	16.000	2.484	8.059	1.047	7.804	
จิวป่า	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	13.989	1.817	2.865	
ตาเสือป่า	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	33.326	4.327	5.376	
ข้อเสียน	13.000	3.005	10.000	1.300	0.520	5.556	40.000	6.211	9.531	1.238	13.004	
หนามหัน	2.000	19.531	1.000	2.000	0.080	0.855	4.000	0.621	11.519	1.496	2.972	
ปวยเล็ด	4.000	9.766	2.000	2.000	0.160	1.709	8.000	1.242	10.903	1.416	4.367	
มะกร่อนนก	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	13.165	1.709	2.758	

ตารางผนวก2 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย	ความหนาแน่น	ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ (IVI)	
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)		(RDO _A)
เครือจาย	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	5.349	0.695	1.743
พวงประดิมขี้	8.000	4.883	3.000	2.667	0.320	3.419	12.000	1.863	7.268	0.944	6.226
มะดุก	2.000	19.531	2.000	1.000	0.080	0.855	8.000	1.242	4.938	0.641	2.738
รางจืด	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	3.291	0.427	1.476
หัสเฒ	1.000	39.063	2.000	0.500	0.040	0.427	8.000	1.242	9.874	1.282	2.952
อ้อยช้าง, กูก	3.000	13.021	2.000	1.500	0.120	1.282	8.000	1.242	8.229	1.069	3.593
ยางนา	4.000	9.766	4.000	1.000	0.160	1.709	16.000	2.484	29.074	3.775	7.969
เฒ่าสาย	5.000	7.813	2.000	2.500	0.200	2.137	8.000	1.242	4.196	0.545	3.924
ดงดำ	5.000	7.813	3.000	1.667	0.200	2.137	12.000	1.863	18.843	2.447	6.447
แคทราย	5.000	7.813	3.000	1.667	0.200	2.137	12.000	1.863	7.981	1.036	5.036
ปีบ	2.000	19.531	2.000	1.000	0.080	0.855	8.000	1.242	13.165	1.709	3.806
ประดู่	3.000	13.021	3.000	1.000	0.120	1.282	12.000	1.863	29.622	3.846	6.992
แสงใจ	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	10.614	1.378	2.427
นมวัว	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	3.702	0.481	1.529
ดุ่มคำ	2.000	19.531	1.000	2.000	0.080	0.855	4.000	0.621	14.812	1.923	3.399

ตารางผนวก2 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย			ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิด
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	พรรณ(IVI)
ก่อ	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	31.268	4.060	5.109
ต้นต้ง	3.000	13.021	2.000	1.500	0.120	1.282	8.000	1.242	4.113	0.534	3.058
ตะเคียน	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	65.658	8.526	9.574
มะกอกหลวง	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	9.051	1.175	2.224
ฝั่เสื่อ	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	4.113	0.534	1.583
ตีนจាំ	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	14.812	1.923	2.972
ข่อย	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	6.583	0.855	1.903
กระดังงาป่า	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	41.555	5.396	6.444
มะกายขัด	5.000	7.813	3.000	1.667	0.200	2.137	12.000	1.863	22.423	2.912	6.912
โม่งหลวง	2.000	19.531	2.000	1.000	0.080	0.855	8.000	1.242	4.113	0.534	2.631
เครือกวาว	2.000	19.531	2.000	1.000	0.080	0.855	8.000	1.242	10.697	1.389	3.486
แหenna	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	10.697	1.389	2.437
หนามมะเก็ด	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.427	4.000	0.621	2.468	0.320	1.369
รวม	234.000	1252.037		80.430	9.360	100.000	644.000	100.000	770.110	100.000	300.000

ตารางผนวก 3 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้นที่ใช้ในการวิจัยโครงสร้างป่า ในป่าเบญจพรรณชื้น (Lower Mixed Deciduous Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 620 -638 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m.)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(c.m.)	ขนาดทรง พุ่ม(m.)
01	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	7.50	3.70	1.47	5.00	3.5
02	มะหมื่นน้ำ	<i>Irvingia malayana</i>	10.00	10.30	4.10	9.00	3.20
03	เป้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	56.00	22.29	3.00	7.30
04	ยางยาย	<i>Colona flagrocarpa</i> (Tiliaceae),	12.00	26.20	10.43	2.00	5.20
05	Unknown	-	2.00	1.50	0.60	0.70	10.00
06	มะโจก	<i>Schleicheraleosa</i>	1.80	1.00	0.40	0.60	1.40
07	เป้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	8.00	14.00	5.57	1.50	1.40
08	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	8.00	6.00	2.39	3.00	4.00
09	ชะเงะ	<i>Millettia</i> spp.,	1.50	1.00	0.40	1.20	-
10	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	8.00	6.00	2.39	3.00	1.10
12	ปีโปง	<i>Dalbergia cana</i>	5.00	6.50	2.59	0.70	-
13	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i>	5.00	10.50	4.18	0.50	4.00
14	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i>	5.00	10.00	3.98	0.50	4.00
15	มะกายขัด	<i>Mallotus philippensis</i>	8.00	37.00	14.73	5.00	4.00
16	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	7.00	15.00	5.97	5.00	3.50
17	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	13.00	5.18	1.00	3.00
18	เมาสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.00	5.50	2.19	1.50	-
19	เมาสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.00	4.00	1.59	1.50	6.00
20	แดง	<i>Xylocarpa</i> var.kerrii	2.50	4.00	1.59	1.82	4.00
21	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	15.00	33.00	13.14	6.00	4.00
22	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	15.00	13.50	5.37	7.00	-
23	เตม	<i>Bischofia javanica</i>	15.00	35.00	13.93	1.17	8.00
25	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	8.00	12.00	4.78	7.00	6.00
26	สักเครือทอง	-	3.40	4.00	1.59	2.00	-
27	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	6.00	9.50	3.78	3.00	3.00
28	แดง	<i>Xylocarpa</i> var.kerrii	15.00	25.00	9.95	8.00	3.50
29	ไม้เลื้อย	<i>Lagerstromia tomentosa</i> Presl	16.00	3.50	1.39	10.00	6.00
30	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	15.50	6.17	8.00	4.00
31	เครือมะน้า	-	10.00	15.00	5.97		-

ตารางผนวก3 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m.)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(c.m)	ขนาดทรง พุ่ม(m)
32	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	4.00	1.59		-
33	เครือตีนตั้ง	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	10.00	6.50	2.59	8.00	-
34	เหิน	<i>Terminalia belerica roxb.</i>	18.00	63.0	157.50	8.00	15.00
35	เครือมะนาวป่า -		14.00	11.00	4.38	8.00	-
36	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	10.00	25.00	9.95	6.00	4.00
37	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	10.00	21.00	8.36	6.00	4.50
38	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	10.00	12.00	4.78	3.00	4.00
39	เครือปี่	<i>Dalbergia cana</i>	10.00	14.00	5.57	1.20	-
40	ปี่โพง	<i>Dalbergia cana</i>	8.00	21.00	8.36	4.00	9.00
41	สมอภิกษา	<i>Terminalia belerica roxb.</i>	1.50	3.50	1.39	1.20	1.30
42	ข้อเสียน	<i>Gmelina arborea,</i>	1.50	3.50	1.39	1.30	1.50
43	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i>	15.00	31.00	12.34	1.00	4.00
44	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i>	14.00	24.00	9.55	1.00	6.00
45	ปอมีน	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	6.00	9.00	3.58	2.50	4.00
46	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	15.00	28.00	11.15	0.80	6.00
47	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	14.00	23.00	9.16	0.80	4.00
48	ปอมีน	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	15.00	35.00	13.93	0.30	7.00
49	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	5.00	8.00	3.18	2.00	4.50
50	หางวัวหมู	<i>Milusa velutina</i> ,Hoo.	10.00	21.00	8.36	6.00	7.00
51	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	6.00	9.00	3.58	0.80	7.00

ตารางผนวก4 แสดงข้อมูลไม้ชั้นล่าง แปลงวิจัย ในป่าเบญจพรรณชื้น (Lower Mixed Deciduous Forest) ที่
ระดับความสูงจากน้ำทะเล 620 - 638 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (c.m)
01	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	3.00	-	-
02	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
03	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
04	เป่าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	1.30	1.30	0.52
05	มะมื่นน้ำ	<i>Irvingia malayana</i>	1.10	2.50	1.00
06	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	1.30	2.00	0.80
07	เป่าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	1.00	2.00	0.80
08	มะกายขัด	<i>Mallotus philippensis</i> Muell.Arg.	1.10	2.00	0.80
09	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.50	-	-
10	เม่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	1.00	1.50	0.60
11	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	3.20	-	-
12	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	1.30	1.00	0.40
13	ตาเสือป่า	<i>Morinda Coreia</i> Ham.	0.50	1.00	0.40
14	ตาเสือป่า	<i>Morinda Coreia</i> Ham.	1.10	1.00	0.40
15	มะมื่นน้ำ	<i>Irvingia malayana</i>	1.20	1.50	0.60
16	ปี่โพง	<i>Dalbergia cana</i>	1.30	1.50	0.60
17	เม่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	0.70	1.40	0.56
18	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.50	-	-
19	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	1.00	1.00	0.40
20	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.50	-	-
21	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
22	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	0.60	1.30	0.52
23	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	0.80	1.60	0.64
24	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	1.20	2.00	0.80
25	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	0.80	2.50	1.00
26	ขอเลี้ยว	<i>Gmelina arborea</i> ,	1.40	2.00	0.80
27	ตาเสือป่า	<i>Morinda Coreia</i> Ham.	1.30	2.00	0.80
28	เป่าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	1.70	2.00	0.80
29	ปี่โพง	<i>Dalbergia cana</i>	1.00	1.50	0.60
30	เป่าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	1.30	1.00	0.40

ตารางผนวก4 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (c.m)
31	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.50	-	-
32	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.30	-	-
33	ปื้โพง	<i>Dalbergia cana</i>	0.50	1.00	0.40
34	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	0.70	1.00	0.40
35	แห่น	<i>Terminalia belerica roxb.</i>	1.20	1.50	0.60
36	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	1.00	1.00	0.40
37	ปอหมื่น	<i>B. mollis</i> (Tiliaceae),	1.20	1.00	0.40
38	เป้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	1.00	1.00	0.40
39	จิ้งป่า	<i>Bombax valetonii Hochr.</i>	0.50	0.50	0.20
40	จิ้งป่า	<i>Bombax valetonii Hochr.</i>	1.20	1.00	0.40
41	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	1.00	1.00	0.40
42	ช่างหัวหมู	<i>Milusa velutina</i> ,Hoo. f. & t homs.	1.00	1.00	0.40
43	ช่างหัวหมู	<i>Milusa velutina</i> ,Hoo. f. & t homs.	1.00	1.00	0.40
44	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.00	-	-
45	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	0.50	0.50	0.20
46	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.00	-	-
47	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.30	-	-
48	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.30	-	-
49	ตาเสือป่า	<i>Morinda Coreia</i> Ham.	0.60	1.50	0.60
50	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.50	-	-
51	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.50	-	-
52	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata,</i>	2.50	-	-
53	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	0.60	1.50	0.60
54	ปื้โพง	<i>Dalbergia cana</i>	0.90	1.50	0.60
55	เป้าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	0.60	1.00	0.40
56	อ้อยช้าง	<i>Lanea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	1.00	2.00	0.80
57	ยางนา	<i>Dipterocarpus alata</i>	0.45	1.00	0.40
58	ยางนา	<i>Dipterocarpus alata</i>	0.60	1.00	0.40
59	แคทราย	<i>S. neuranthum,</i>	1.20	2.50	1.00
60	เดียม	<i>Bischofia Javanica</i> Blume	1.00	2.00	0.80
61	ป้วยเลือด	<i>T. mucronata,</i>	1.30	2.00	0.80

ตารางผนวก4 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (c.m)
62	ยางนา	<i>Dipterocarpus alata</i>	1.30	1.50	0.60
63	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	1.00	1.00	0.40
64	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> , Kurz.	0.50	1.00	0.40
65	แคทราาย	<i>S. neuranthum</i> ,	0.90	1.50	0.60
66	อ้อยช้าง	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	0.40	1.00	0.40
67	อ้อยช้าง	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	0.65	1.00	0.40
68	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	1.00	2.50	1.00
69	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
70	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
71	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
72	เป่าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	0.60	1.00	0.40
73	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
74	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.50	-	-
75	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	1.20	2.00	0.80
76	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	1.00	2.00	0.80
77	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> , Kurz.	1.40	1.50	0.60
78	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	1.00	1.00	0.40
79	ยางนา	<i>Dipterocarpus alata</i>	0.60	0.50	0.20
80	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.)Vrnt	0.70	1.00	0.40
81	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.30	-	-
82	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
83	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
84	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.00	-	-
85	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	1.20	1.50	0.60
86	ไผ่	<i>Vietnamosasa ciliata</i> ,	2.50	1.30	0.52
87	สัก	<i>Tectona grandis</i> ,	0.60	1.50	0.60
88	ช่างหัวหมู	<i>Milusa velutina</i> ,Hoo. f. & t homs.	1.30	1.20	0.48
89	เหิน	<i>Terminalia belerica</i> roxb.	1.10	2.00	0.80
90	จิ้งป่า	<i>Bombax valetonii</i> Hochr.	0.40	1.30	0.52
91	เหิน	<i>Terminalia belerica</i> roxb.	0.80	2.00	0.80

ตารางผนวก5 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ชั้นล่าง (แปลงทดลอง A) ในป่าเบญจพรรณชื้น (Lower Mixed Deciduous Forest) ที่ระดับความสูง
จากน้ำทะเล 620 –638 เมตร

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน (ต้น)	พื้นที่เฉลี่ย (M)	แปลงที่ขึ้น (จำนวน)	ความมากมาย (A)	ความหนาแน่น (D)	(RD _A)	ความถี่ (F)	(RF _A)	ความเด่น (RD)	(RDO _A)	ความสำคัญของชนิด พรรณ(IVI)
ไผ่	27.000	0.083	12.000	2.250	1.800	29.670	80.000	19.355	-	0.000	49.025
เป่าหลวง	7.000	0.321	5.000	1.400	0.467	7.692	33.333	8.065	1.093	3.969	19.726
มะหมื่นน้ำ	2.000	1.125	2.000	1.000	0.133	2.198	13.333	3.226	1.645	5.972	11.396
เพกา	3.000	0.750	3.000	1.000	0.200	3.297	20.000	4.839	1.098	3.984	12.120
มะกายขัด	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.099	6.667	1.613	1.645	5.972	8.684
เฒ่าสาย	2.000	1.125	2.000	1.000	0.133	2.198	13.333	3.226	1.193	4.329	9.753
แดง	8.000	0.281	6.000	1.333	0.533	8.791	40.000	9.677	1.182	4.292	22.760
ตาเสือป่า	4.000	0.563	3.000	1.333	0.267	4.396	20.000	4.839	1.131	4.104	13.338
ปี่พอง	4.000	0.563	3.000	1.333	0.267	4.396	20.000	4.839	1.131	4.104	13.338
ดินเบ็ด	4.000	0.563	3.000	1.333	0.267	4.396	20.000	4.839	0.905	3.286	12.521
ชอเลี้ยว	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.099	6.667	1.613	1.645	5.972	8.684
แหน	3.000	0.750	2.000	1.500	0.200	3.297	13.333	3.226	1.509	5.477	12.000
สัก	3.000	0.750	2.000	1.500	0.200	3.297	13.333	3.226	1.370	4.974	11.497
ปอหมื่น	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.099	6.667	1.613	0.823	2.986	5.698

ตารางผนวก5 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย	ความหนาแน่น	ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิด	
	(ต้น)	(M)	(จำนวน)	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD) (RDO _A)	พรรณ(IVI)	
จิวป่า	3.000	0.750	2.000	1.500	0.200	3.297	13.333	3.226	0.769	2.791	9.314
ช่างหัวหมู	3.000	0.750	2.000	1.500	0.200	3.297	13.333	3.226	0.878	3.189	9.711
ยางนา	4.000	0.563	3.000	1.333	0.267	4.396	20.000	4.839	0.823	2.986	12.221
อ้อยช้าง	3.000	0.750	2.000	1.500	0.200	3.297	13.333	3.226	1.098	3.984	10.507
แคทราย	2.000	1.125	2.000	1.000	0.133	2.198	13.333	3.226	1.645	5.972	11.396
มะแฟน	2.000	1.125	1.000	2.000	0.133	2.198	6.667	1.613	1.645	5.972	9.783
ประดู่	2.000	1.125	2.000	1.000	0.133	2.198	13.333	3.226	1.029	3.736	9.160
เต็ง	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.099	6.667	1.613	1.645	5.972	8.684
ปวยเล็ด	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.099	6.667	1.613	1.645	5.972	8.684
รวม		24.311		29.817	6.067	100.000	413.333	100.000	27.549	100.000	300.000

ตารางผนวก 6 แสดงข้อมูลไม้คลุมดิน ในป่าเบญจพรรณชั้น (Lower Mixed Deciduous Forest)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	แขมหลวง	<i>Themeda arundinacea</i>	33	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
2	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	34	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
3	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	36	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
4	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	37	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
5	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	38	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>
6	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>	39	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
7	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	40	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
8	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin	41	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
9	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin	42	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
10	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	43	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
12	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	44	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
13	พลูป่า	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	45	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>
14	ติงูเห่า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.	46	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
15	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin	47	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
16	อังกาบเมือง	<i>Barleria cristata</i> Linn.	48	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
17	ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.	49	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>
18	ติงูเห่า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.	50	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
19	ติงูเห่า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.	51	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
20	รางจืด	<i>Thumbergia grandiflora</i>	52	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
21	มะลิดิน	<i>Geophila repens</i>	53	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
22	ตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	54	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>
23	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	55	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
24	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	57	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>
25	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	58	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
26	ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.	59	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
27	ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.	61	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
28	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	62	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
29	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	63	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
30	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	64	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
31	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	66	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin
32	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	67	เครือคันทา	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin

ตารางผนวก 6 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
68	อังกาบเมือง	<i>Barleria cristata</i> Linn.	100	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
69	.ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.	101	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
70	ดิงูเหว้า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.	102	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>
71	ดิงูเหว้า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.	103	อังกาบเมือง	<i>Barleria cristata</i> Linn.
72	รางจืด	<i>Thumbergia grandiflora</i>	104	.ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.
73	มะลิดิน	<i>Geophila repens</i>	105	ดิงูเหว้า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.
74	ตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	106	ดิงูเหว้า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl..
75	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	107	รางจืด	<i>Thumbergia grandiflora</i>
76	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	108	อังกาบเมือง	<i>Barleria cristata</i> Linn.
77	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	109	.ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.
78	ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.	110	ดิงูเหว้า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.
79	ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.	111	ดิงูเหว้า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.
80	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	112	รางจืด	<i>Thumbergia grandiflora</i>
81	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	113	มะลิดิน	<i>Geophila repens</i>
82	เคลือบตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	114	ตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
83	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	115	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
85	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	117	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
86	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	118	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
87	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	119	ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.
88	เครือตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	122	ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.
89	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	123	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
90	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	124	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
91	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>	125	เคลือบตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
92	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	126	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
93	เครือคั่นขาว	<i>Cayratia trifolia</i> (L.)Domin	127	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
94	เครือตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	128	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
95	เครือตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	129	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
96	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	131	อังกาบเมือง	<i>Barleria cristata</i> Linn.
97	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	132	.ผักปราบ	<i>Commeliana</i> sp.
98	กล้วยไม้ดิน	<i>Habenaria dentata</i>	133	ดิงูเหว้า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.
99	เครือตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	134	ดิงูเหว้า	<i>Tacca intergrifolia</i> Ker-Gawl.

ตารางผนวก 6 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
135	อังกาบเมือง	Barleria cristata Linn.
136	.ผักปราบ	Commeliana sp.
137	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia Ker-Gawl.
138	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia Ker-Gawl.
140	มะลิดิน	Geophila repens
141	อังกาบเมือง	Barleria cristata Linn.
142	.ผักปราบ	Commeliana sp.
143	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia Ker-Gawl.
145	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia Ker-Gawl.
147	รางจืด	Thumbergia grandiflora
149	มะลิดิน	Geophila repens
150	ตีนตั่ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
151	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
152	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
153	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
154	อังกาบเมือง	Barleria cristata Linn.
155	.ผักปราบ	Commeliana sp.
156	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia Ker-Gawl.
157	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia Ker-Gawl.
158	รางจืด	Thumbergia grandiflora

ตารางผนวก 7 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้น (แปลงวิจัยที่ B1) ในป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ที่
ระดับความสูงจากน้ำทะเล 720 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
01	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	8.50	26.80	10.67	3.50
02	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	15.00	52.00	20.70	7.00
03	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	15.00	22.40	8.92	4.50
04	จ้าว	<i>Bombax anceps pierre</i>	8.50	28.40	11.31	5.00
05	ตะแบกเกียบ	<i>L. cochinchinensis var.oualifolia</i>	8.00	26.80	10.67	5.00
06	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	9.00	25.60	10.19	4.00
07	ไผ่	<i>Schleichera oleosa merr</i>	3.50	16.80	6.69	1.50
08	อ้อยช้าง	<i>Lannea</i> <i>coromandelica</i> (Anacardiaceae),	3.00	7.20	2.87	2.00
09	ประดู่เลือด	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	16.00	60.00	23.89	8.00
10	ตะแบกเกียบ	<i>L. cochinchinensis var.oualifolia</i>	12.50	38.80	15.45	6.50
11	ตูมเหลือง	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	3.50	14.00	5.57	2.00
12	จ้าว	<i>Bombax anceps pierre</i>	10.00	17.60	7.01	1.95
13	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	15.00	28.80	11.46	9.00
14	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	6.30	20.00	7.96	3.00
15	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	16.00	44.80	17.83	5.00
16	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.50	9.20	3.66	4.50
17	ตะแบกเกียบ	<i>L. cochinchinensis var.oualifolia</i>	11.00	39.20	15.61	2.50
18	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	5.00	14.00	5.57	2.00
19	ช่อเลี่ยน	<i>Gmelina arborea</i> ,	12.00	23.20	9.24	5.00
20	มะกิม	<i>Canariun subulatum</i>	15.00	20.00	7.96	7.00
21	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	10.00	15.60	6.21	6.50
22	ไผ่	<i>Schleichera oleosa Merr</i>	4.50	8.40	3.34	3.00
23	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	8.00	25.60	10.19	6.50
24	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	7.50	36.00	14.33	6.50
25	ช่อเลี่ยน	<i>Gmelina arborea</i> ,	6.00	8.00	3.18	3.50
26	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	4.50	7.20	2.87	4.00
27	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	16.00	42.80	17.04	4.50
28	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	15.50	37.20	14.81	5.00

29 สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	7.00	9.20	3.66	6.00
-----------	-------------------------	------	------	------	------

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
30	แฉะ	<i>Shorea obtusa,</i>	9.00	38.00	15.13	0.90
31	แฉะ	<i>Shorea obtusa,</i>	5.00	10.80	4.30	2.00
32	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	14.50	30.00	11.94	3.00
33	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	10.00	17.20	6.85	7.00
34	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	5.50	15.20	6.05	5.00
35	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	13.00	24.00	9.55	3.50
36	สีนํ้า	<i>Dillenia aurea var.aurea</i>	15.00	12.80	5.10	3.00
37	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	16.00	14.40	5.73	8.00
38	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	4.50	13.20	5.25	2.50
39	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	7.50	12.00	4.78	3.00
40	จิ้ง	<i>Bombax ceiba,</i>	12.00	19.20	7.64	7.50
41	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	4.50	6.80	2.71	2.50
42	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	8.00	16.00	6.37	6.00
43	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	5.00	15.20	6.05	3.00
44	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	5.00	39.60	15.76	0.60
45	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	15.00	10.80	4.30	6.00
46	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	8.00	14.40	5.73	5.00
47	ชอเลี่ยน	<i>Gmelina arborea,</i>	7.00	19.20	7.64	4.00
48	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	7.00	7.20	2.87	3.00
49	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	8.00	21.60	8.60	5.00
50	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	16.00	66.00	26.27	11.00
51	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	10.00	23.60	9.39	3.00
52	ประดู่เลือด	<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	13.00	30.00	11.94	8.00
53	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	15.00	30.80	12.26	6.00
54	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	18.00	32.00	12.74	12.00
55	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	11.00	17.20	6.85	5.00
56	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	15.00	32.00	12.74	9.00
57	มะกิม	<i>Canariun subulatum</i>	15.00	19.60	7.80	13.00
58	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	4.00	7.60	3.03	2.00

59	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	12.00	20.00	7.96	2.50
----	--------	-------------------------	-------	-------	------	------

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง าง(นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
60	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	7.00	20.80	8.28	1.50
61	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	6.50	13.60	5.41	6.00
62	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	15.00	28.40	11.31	10.00
63	ปอผี	<i>Colona floribunda</i>	16.00	31.20	12.42	5.00
64	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	12.00	19.20	7.64	4.50
65	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	5.50	8.80	3.50	2.50
66	กระแจะ	<i>Ochna integerrima merr.</i>	3.50	13.20	5.25	1.00
67	มะนัง	<i>Terminalia chebula</i> Retz. Syn.	15.00	28.40	11.31	10.00
68	ประดู่เลือด	<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	6.50	8.00	3.18	5.00
69	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	7.00	23.60	9.39	6.00
70	ประดู่เลือด	<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	4.50	6.80	2.71	1.00
71	มะกิม	<i>Canariun subulatum</i>	12.00	22.80	9.08	9.00
72	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	6.50	9.60	3.82	4.00
73	รพีฟ้า	<i>Terminalia alata</i>	13.00	33.60	13.38	8.00
74	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	13.00	24.40	9.71	6.00
75	ปอผี	<i>Colona floribunda</i>	10.50	20.80	8.28	1.00
76	ปอผี	<i>Colona floribunda</i>	7.00	13.60	5.41	3.00
77	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	18.00	40.00	15.92	12.00
78	อ้อยช้าง	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	9.00	14.40	5.73	2.00
79	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	10.50	16.80	6.69	2.00
80	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	11.00	33.60	13.38	1.00
81	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	7.00	15.60	6.21	2.00
82	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	4.50	6.40	2.55	2.00
83	ตูมเหลือง	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	7.00	16.00	6.37	4.00
84	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	16.50	52.00	20.70	4.00
85	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	12.40	4.94	4.00
86	สักทอง	<i>Tectona grandis,</i>	12.00	21.20	8.44	7.00
87	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	6.50	10.00	3.98	4.50
88	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	11.00	22.80	9.08	6.00

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
89	ปีบ	<i>Millingtonia hortensis</i> (Bignoniaceae),	12.00	13.60	5.41	6.00
90	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	15.00	43.20	17.20	7.00
91	छอยช้าง	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	5.50	11.60	4.62	3.50
92	छอยช้าง	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	5.50	15.20	6.05	4.50
93	ประดู่เลือด	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	13.00	19.60	7.80	8.00
94	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	17.00	28.40	11.31	12.00
95	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	4.00	6.80	2.71	1.50
96	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	15.50	36.00	14.33	11.00
97	ตุ้มเหือง	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	4.00	6.80	2.71	1.50
98	ประดู่เลือด	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	18.00	68.00	27.07	5.00
99	โศก	<i>Schleichera oleosa</i> merr	15.00	29.60	11.78	3.50
100	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	4.00	6.80	2.71	2.50
101	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	13.50	20.80	8.28	8.50
102	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	16.00	43.60	17.36	10.00
103	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	12.00	4.78	3.00
104	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	16.00	38.00	15.13	8.00
105	ปอผี	<i>Colona floribunda</i>	7.00	10.80	4.30	5.50
106	จ้าว	<i>Bombax anceps</i> pierre	15.00	23.20	9.24	10.00
107	มะคังดง	<i>Ostodes paniculata</i>	6.50	11.60	4.62	4.00
108	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> var. <i>kerrii</i> (Leguminosae),	5.50	6.40	2.55	3.50
109	ขวางหัวหมู	<i>Milusa uelutina</i>	3.50	6.40	2.55	3.00
110	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	8.50	11.20	4.46	6.00
111	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Burseraceae),	8.00	9.20	3.66	4.00
112	จ้าว	<i>Bombax anceps</i> pierre	14.00	19.60	7.80	12.00
113	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	16.00	26.80	10.67	13.00
114	รพี	<i>Terminalia alata</i>	8.00	13.20	5.25	6.00
115	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	15.00	22.80	9.08	4.00
116	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	19.00	40.00	15.92	12.00
117	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	10.00	17.60	7.01	8.00

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ง(นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
118	ดุ่มเหลือง	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	8.00	11.60	4.62	5.50
119	ผีเสื้อ	<i>A.chinense</i>	2.50	7.20	2.87	2.00
120	ปอผี	<i>Colona floribunda</i>	10.00	34.80	13.85	2.50
121	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	8.00	8.00	3.18	5.00
122	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	7.50	12.80	5.10	3.00
123	ติ้วแดง	<i>Cratoxylum formosum</i>	12.00	24.40	9.71	8.00
124	ประดู่เลือด	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	12.00	14.80	5.89	5.00
125	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i>	15.00	27.60	10.99	10.00
126	แข่งกวาว	<i>Wendlandia tinctoria</i>	8.50	16.40	6.53	5.00
127	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	10.00	30.80	12.26	8.00
128	จ้าว	<i>Bombax anceps pierre</i>	10.00	13.20	5.25	9.50
129	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	6.50	6.80	2.71	5.00
130	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	14.00	46.00	18.31	3.50
131	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	8.40	3.34	5.50
132	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	16.00	49.20	19.59	11.00
133	จ้าว	<i>Bombax anceps pierre</i>	8.00	9.60	3.82	6.00
134	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	5.00	11.60	4.62	3.50
135	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	15.00	20.80	8.28	12.50
136	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	15.00	19.60	7.80	12.00
137	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	17.00	42.40	16.88	12.50
138	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	10.00	18.80	7.48	8.00
139	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	10.50	12.00	4.78	9.50
140	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	8.50	14.80	5.89	5.00
141	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	8.00	15.20	6.05	5.50
142	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	3.50	5.60	2.23	1.50
143	จ้าว	<i>Bombax anceps pierre</i>	2.00	4.80	1.91	1.50
144	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	5.50	10.40	4.14	3.00
145	จ้าว	<i>Bombax anceps pierre</i>	4.50	5.20	2.07	4.00
146	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	5.50	8.00	3.18	3.50

147 สะเกี่ย	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	8.50	22.40	8.92	5.00
-------------	--	------	-------	------	------

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง วง(นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
148	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	8.50	16.00	6.37	6.00
149	ดีวชน	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	17.00	28.80	11.46	8.50
150	โชค	<i>Schleichera oleosa merr</i>	14.00	30.40	12.10	3.50
151	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	6.00	10.80	4.30	2.00
152	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	3.00	4.80	1.91	1.00
153	ชื้อาย	<i>Wasura robusta Roxb</i>	15.00	16.40	6.53	6.00
154	แสลงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	2.50	7.60	3.03	1.00
155	โชค	<i>Schleichera oleosa merr .</i>	9.00	22.00	8.76	4.50
156	ชื้อาย	<i>Wasura robusta Roxb</i>	10.00	19.20	7.64	6.00
157	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	9.50	15.20	6.05	6.50
158	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	3.00	6.80	2.71	1.00
159	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	14.50	26.00	10.35	8.00
160	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	15.00	28.40	11.31	4.50
161	รกฟ้า	<i>Terminalia alata</i>	5.00	9.20	3.66	5.00
162	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	11.00	13.60	5.41	4.00
163	ไม้ต่างกลม	-	2.00	6.40	2.55	0.20
164	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	15.00	26.80	10.67	10.00
165	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	4.00	6.40	2.55	2.00
166	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	8.00	12.40	4.94	4.50
167	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	16.00	31.60	12.58	6.50
168	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.50	5.20	2.07	1.00
169	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	2.00	4.80	1.91	0.50
170	รกฟ้า	<i>Terminalia alata</i>	8.50	16.80	6.69	3.00
171	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	8.00	13.60	5.41	2.50
172	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	8.50	14.00	5.57	6.00
173	ช่างหัวหมู	<i>Milusa velutina,</i>	5.00	8.40	3.34	4.80
174	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	10.00	28.40	11.31	6.00
175	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	7.00	17.20	6.85	6.00
176	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	5.00	8.40	3.34	4.00

177 มะเกี๋ย	<i>Canarium subulatum</i>	3.50	6.00	2.39	3.00
-------------	---------------------------	------	------	------	------

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคอก (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
178 เหียง		<i>D. obtusifolius,</i>	16.00	23.60	9.39	10.00
179 รัง		<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	16.50	32.40	12.90	8.00
180 เหียง		<i>D. obtusifolius,</i>	10.00	16.80	6.69	6.00
181 จ้าว		<i>Bombax anceps pierre</i>	2.00	6.00	2.39	1.00
182 กระแจะ		<i>Ochna integerrima merr.</i>	2.50	7.20	2.87	1.20
183 แะ		<i>Shorea obtusa,</i>	1.80	25.60	10.19	0.10
184 แะ		<i>Shorea obtusa,</i>	8.00	10.80	4.30	3.00
185 แะ		<i>Shorea obtusa,</i>	7.50	14.80	5.89	5.00
186 เหียง		<i>D. obtusifolius,</i>	18.00	46.40	18.47	13.00
187 รัง		<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	17.00	51.60	20.54	3.00
188 ประดู่		<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	8.00	16.00	6.37	5.00
189 แะ		<i>Shorea obtusa,</i>	12.00	26.40	10.51	7.00
190 ตีนนก		<i>V. pinnata,</i>	6.50	8.80	3.50	3.50
191 แะ		<i>Shorea obtusa,</i>	4.50	7.20	2.87	1.50
192 แดง		<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	6.50	6.40	2.55	2.00
193 หาดง		<i>Syzygium albiflorum</i>	8.50	14.80	5.89	5.00
194 สะกีย		<i>Morinda tomentosa Heyne ex Roth</i>	8.00	22.40	8.92	3.00
195 แะ		<i>Shorea obtusa,</i>	15.00	24.80	9.87	1.00
196 แผลงใจ		<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	9.00	12.00	4.78	3.00
197 จ้าว		<i>Bombax anceps pierre</i>	2.00	4.00	1.59	1.50
198 แะ		<i>Shorea obtusa,</i>	8.00	18.80	7.48	6.50
199 แะ		<i>Shorea obtusa,</i>	3.00	8.00	3.18	1.50
200 ไม้สาบ		<i>Lyonia ovalifolia</i>	2.50	4.00	1.59	1.00
201 รกฟ้า		<i>Terminalia alata</i>	4.00	7.20	2.87	1.00
202 แผลงใจ		<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	6.00	13.20	5.25	2.50
203 เหียง		<i>D. obtusifolius,</i>	14.00	21.20	8.44	6.00
204 ประดู่		<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	4.00	6.40	2.55	1.00
205 แผลงใจ		<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	6.00	9.60	3.82	1.50
206 มะนะ		<i>Terminalia chebula</i> Retz. Syn.	2.00	4.80	1.91	1.00

207 รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	18.00	34.00	13.54	12.00
----------	--	-------	-------	-------	-------

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
208	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	14.00	23.20	9.24	12.00
209	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	15.00	27.20	10.83	5.00
210	มะคังคง	<i>Ostodes paniculata</i>	5.50	10.00	3.98	1.00
211	รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	15.00	22.40	8.92	8.00
212	รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	13.00	22.40	8.92	6.00
213	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	9.00	19.20	7.64	3.00
214	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	17.00	41.60	16.56	1.00
215	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	19.00	39.20	15.61	1.30
216	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	15.00	23.20	9.24	6.00
217	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	10.40	4.14	2.00
218	มะเกี๋ย	<i>Canariun subulatum</i>	15.00	32.80	13.06	7.00
219	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	5.00	11.60	4.62	1.00
220	รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	18.00	30.40	12.10	6.00
221	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	6.00	8.80	3.50	1.00
222	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	4.00	7.60	3.03	1.00
223	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	5.00	15.20	6.05	2.50
224	มะเกี๋ย	<i>Canariun subulatum</i>	6.00	10.00	3.98	2.50
225	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	3.00	9.20	3.66	1.00
226	รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	10.00	20.40	8.12	7.00
227	รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	6.00	8.00	3.18	3.00
228	รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	16.00	31.20	12.42	1.00
229	ไซค	<i>Schleichera oleosa</i> merr .	18.00	64.40	25.64	6.00
230	ยมหิน	<i>Acrocarpus fraxinifolius</i>	4.00	6.40	2.55	4.00
231	มะนะ	<i>Terminalia chebula</i> Retz. Syn.	15.00	21.20	8.44	1.00
232	มะโจก	<i>Schleicheraoleosa</i>	3.00	6.80	2.71	1.50
233	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	5.20	2.07	1.00
234	ปู้พง	<i>Dalbergia cana</i>	2.50	4.00	1.59	1.00
235	รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	10.00	16.80	6.69	2.00
236	รั้ง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	14.00	26.40	10.51	8.00

237 กระเจาะ	<i>Ochna integerrima</i> Merr	5.00	7.60	3.03	1.00
-------------	-------------------------------	------	------	------	------

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง าง(นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
238	ติ้วแดง	<i>cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.)Bl.	3.50	8.40	3.34	2.00
239	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	8.50	12.80	5.10	5.00
240	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	8.00	18.00	7.17	4.00
241	ไช้ค	<i>Schleichera oleosa</i> merr.	3.00	5.60	2.23	1.50
242	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.00	4.80	1.91	1.50
243	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	6.00	17.60	7.01	5.00
244	มะคังดง	<i>Ostodes paniculata</i>	7.00	17.60	7.01	2.00
245	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	5.00	9.60	3.82	1.00
246	มะเกี๋ย	<i>Canarium subulatum</i>	7.00	24.40	9.71	1.00
247	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	18.50	42.00	16.72	7.00
248	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	16.50	35.60	14.17	8.00
249	มะเกี๋ย	<i>Canarium subulatum</i>	6.00	12.00	4.78	2.00
250	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	8.00	16.80	6.69	3.00
251	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	16.00	18.40	7.32	8.00
252	ง้าว	<i>Bombax anceps pierre</i>	18.00	19.60	7.80	14.00
253	ตองหอม	<i>Phoebe lanceolata</i>	9.00	19.60	7.80	5.00
254	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	16.00	34.40	13.69	8.00
255	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	11.00	16.80	6.69	6.00
256	มะเกวณ	<i>Flacourtia indica</i>	6.50	8.80	3.50	1.50
257	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	14.00	17.20	6.85	2.50
258	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	20.50	41.60	16.56	10.00
259	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	7.00	17.20	6.85	3.00
260	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	10.00	17.20	6.85	8.00
261	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	5.00	10.40	4.14	2.00
262	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	18.00	26.00	10.35	1.00
263	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	22.00	50.80	20.22	16.00
264	ปอมน	<i>Colona floribunda</i>	2.50	9.20	3.66	2.00
265	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	16.00	25.20	10.03	1.00
266	ปอมน	<i>Colona floribunda</i>	4.00	5.20	2.07	2.00

267 แกะ	<i>Shorea obtusa,</i>	7.00	12.40	4.94	6.00
---------	-----------------------	------	-------	------	------

ตารางผนวก7 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
268 รั้ง		<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	7.50	12.80	5.10	6.00
269 ตะแบกเลื้อย		<i>Terminalia mucronata</i> Pierre ex Laness	16.00	26.00	10.35	6.50
270 มะกึ่ม		<i>Canariun subulatum</i>	8.00	14.80	5.89	5.00
271 จ้าว		<i>Bombax anceps pierre</i>	6.00	9.60	3.82	5.50
272 รกฟ้า		<i>Terminalia alata</i>	18.00	38.00	15.13	1.00

ตารางผนวกที่ 8 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ยืนต้น (แปลงทดลอง B) ในป่าเบญจพรรณ (Lower Mixed Deciduous Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 720 – 739 เมตร

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย	ความหนาแน่น	ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ	
	(ต้น)	(M)	(จำนวน)	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD) (RDO _A)		(IVI)
ตะแบกเลือด	26.000	1.502	20.000	1.300	1.040	9.559	80.000	13.889	18.454	3.309	26.757
สักทอง	34.000	1.149	21.000	1.619	1.360	12.500	84.000	14.583	19.672	3.527	30.611
จ้าว	12.000	3.255	5.000	2.400	0.480	4.412	20.000	3.472	11.526	2.067	9.951
ตะแบกเกียบ	3.000	13.021	2.000	1.500	0.120	1.103	8.000	1.389	28.752	5.156	7.647
โชค	7.000	5.580	3.000	2.333	0.280	2.574	12.000	2.083	18.409	3.301	7.958
อ้อยช้าง	4.000	9.766	2.000	2.000	0.160	1.471	8.000	1.389	9.957	1.785	4.645
ประดู่เลือด	13.000	3.005	4.000	3.250	0.520	4.779	16.000	2.778	24.353	4.367	11.924
ดุ่มเหลือง	3.000	13.021	2.000	1.500	0.120	1.103	8.000	1.389	9.438	1.692	4.184
เหียง	27.000	1.447	10.000	2.700	1.080	9.926	40.000	6.944	20.563	3.687	20.558
ชอเลี่ยน	3.000	13.021	2.000	1.500	0.120	1.103	8.000	1.389	17.266	3.096	5.588
มะกึ่ม	9.000	4.340	4.000	2.250	0.360	3.309	16.000	2.778	14.847	2.662	8.749
รัง	26.000	1.502	8.000	3.250	1.040	9.559	32.000	5.556	19.140	3.432	18.546
แงะ	30.000	1.302	15.000	2.000	1.200	11.029	60.000	10.417	13.249	2.376	23.822
ส้าน	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	10.583	1.898	2.960

ตารางผนวกที่ 8 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
แดง	5.000	7.813	2.000	2.500	0.200	1.838	8.000	1.389	6.325	1.134		4.361
จืด	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	15.794	2.832		3.894
ตีนนก	9.000	4.340	5.000	1.800	0.360	3.309	20.000	3.472	16.424	2.945		9.726
มะแฟน	2.000	19.531	2.000	1.000	0.080	0.735	8.000	1.389	9.705	1.740		3.864
ปอหมี	7.000	5.580	2.000	3.500	0.280	2.574	8.000	1.389	14.760	2.647		6.609
แจ้	4.000	9.766	2.000	2.000	0.160	1.471	8.000	1.389	7.683	1.378		4.237
มะนัง	3.000	13.021	2.000	1.500	0.120	1.103	8.000	1.389	20.412	3.660		6.152
รกฟ้า	7.000	5.580	4.000	1.750	0.280	2.574	16.000	2.778	17.117	3.069		8.421
เก็ดแดง	4.000	9.766	2.000	2.000	0.160	1.471	8.000	1.389	14.810	2.656		5.515
ปีบ	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	11.182	2.005		3.067
ฝั่	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	5.932	1.064		2.126
ติ้วขน	2.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	23.688	4.247		5.310
ติ้วแดง	2.000	19.531	1.000	2.000	0.080	0.735	4.000	0.694	13.539	2.428		3.857
แข่งกวาง	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	13.498	2.420		3.482

ตารางผนวกที่ 8 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
สะกึ๊ย	2.000	19.531	1.000	2.000	0.080	0.735	4.000	0.694	9.550	1.712		3.142
แสงใจ	4.000	9.766	2.000	2.000	0.160	1.471	8.000	1.389	8.723	1.564		4.424
ขี้ยาย	3.000	13.021	2.000	1.500	0.120	1.103	8.000	1.389	9.591	1.720		4.212
หนามแท่ง	4.000	9.766	2.000	2.000	0.160	1.471	8.000	1.389	6.170	1.106		3.966
ไม้ต่างกลม	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	5.271	0.945		2.007
ข้างหัวหมู	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	5.271	0.945		2.007
มะคังดง	4.000	9.766	2.000	2.000	0.160	1.471	8.000	1.389	11.348	2.035		4.894
ยมหิน	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	5.271	0.945		2.007
มะเกวน	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	7.235	1.297		2.359
ตองหอม	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	16.123	2.891		3.953
มะเฒ่าสาย	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	3.287	0.589		1.651
ห้ำดง	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	9.539	1.710		2.773
เหมือดโคน	1.000	39.063	1.000	1.000	0.040	0.368	4.000	0.694	9.550	1.712		2.774
รวม	272.000	814.626	144.000	70.152	10.880	100.000	576.000	100.000	557.691	100.000		300.000

ตารางผนวกที่ 9 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้นที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 720 – 739 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง วง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก (m)	ขนาดทรง พุ่ม (m)
01	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata</i> ,	8.50	26.80	10.67	3.50	3.00
02	ตะแบกเลือด	<i>Lagerstroemia mucronata</i>	15.00	52.00	20.70	7.00	4.00
03	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	15.00	22.40	8.92	4.50	5.00
04	จ้าว	<i>bombax anceps pierre</i>	8.50	28.40	11.31	5.00	5.00
05	ตะแบกเกียบ	<i>L. cochinchinensis var.oualifolia</i>	8.00	26.80	10.67	5.00	7.00
85	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	12.40	4.94	4.00	6.00
86	สักทอง	<i>Tectona grandis</i> ,	12.00	21.20	8.44	7.00	7.00
87	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	6.50	10.00	3.98	4.50	3.00
88	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata</i> ,	11.00	22.80	9.08	6.00	6.00
89	ปีบ	<i>Millingtonia hortensis</i> (Bignoniaceae),	12.00	13.60	5.41	6.00	4.00
90	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata</i> ,	15.00	43.20	17.20	7.00	8.00
91	อ้อยช้าง	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	5.50	11.60	4.62	3.50	4.50
92	อ้อยช้าง	<i>Lannea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	5.50	15.20	6.05	4.50	5.00
93	ประดู่เลือด	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> ,	13.00	19.60	7.80	8.00	4.00
94	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	17.00	28.40	11.31	12.00	4.00
95	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	4.00	6.80	2.71	1.50	4.00
96	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	15.50	36.00	14.33	11.00	4.50
97	ตูมเหลือง	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	4.00	6.80	2.71	1.50	3.20
140	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	8.50	14.80	5.89	5.00	4.00
141	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	8.00	15.20	6.05	5.50	5.00
142	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata</i> ,	3.50	5.60	2.23	1.50	3.10
143	จ้าว	<i>bombax anceps pierre</i>	2.00	4.80	1.91	1.50	2.10
144	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	5.50	10.40	4.14	3.00	5.00
145	จ้าว	<i>bombax anceps pierre</i>	4.50	5.20	2.07	4.00	3.00
146	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	5.50	8.00	3.18	3.50	2.50
255	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	11.00	16.80	6.69	6.00	6.00
256	มะกวน	<i>Flacourtia indica</i>	6.50	8.80	3.50	1.50	3.00
257	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	14.00	17.20	6.85	2.50	4.00
258	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	20.50	41.60	16.56	10.00	5.00

ตารางผนวกที่ 10 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
259	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	7.00	17.20	6.85	3.00	5.50
260	ตะแบกเลือด	T. mucronata,	10.00	17.20	6.85	8.00	3.50
261	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	10.40	4.14	2.00	4.00
262	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	18.00	26.00	10.35	1.00	6.00
263	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	22.00	50.80	20.22	16.00	4.50
264	ปอผี	Colona floribunda	2.50	9.20	3.66	2.00	2.30
265	เหียง	D. obtusifolius,	16.00	25.20	10.03	1.00	6.00
266	ปอผี	Colona floribunda	4.00	5.20	2.07	2.00	3.40
267	แฉะ	Shorea obtusa,	7.00	12.40	4.94	6.00	5.10
268	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	7.50	12.80	5.10	6.00	8.00
269	ตะแบกเลือด	T. mucronata,	16.00	26.00	10.35	6.50	8.00
270	มะกิม	Canarium subulatum	8.00	14.80	5.89	5.00	5.00

ตารางผนวก10 แสดงข้อมูลไม้ชั้นล่าง แปลงวิจัย ในป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ที่
ระดับความสูงจากน้ำทะเล 720 – 739 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (c.m.)
1	ตะแบกเกียบ	<i>L. cochinchinensis var. ovalifolia</i>	2.50	2.00	0.796
2	มะกิม	<i>Canarium subulatum</i>	1.30	1.50	0.597
3	ลำนำ	<i>Dillenia aurea var. aurea</i>	1.30	1.00	0.398
4	ชอเลี่ยน	<i>Gmelina arborea,</i>	1.50	1.20	0.478
5	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	1.80	1.70	0.677
6	ตะแบกเลื้อย	<i>T. mucronata,</i>	1.50	1.00	0.398
7	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	0.70	1.00	0.398
8	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	1.50	1.00	0.398
9	ตะแบกเลื้อย	<i>T. mucronata,</i>	1.30	1.50	0.597
10	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	1.00	1.50	0.597
11	ตะแบกเลื้อย	<i>T. mucronata,</i>	1.20	1.00	0.398
12	มะกิม	<i>Canarium subulatum</i>	1.30	0.50	0.199
13	ตะแบกเลื้อย	<i>T. mucronata,</i>	0.90	0.50	0.199
14	ลำนำ	<i>Dillenia aurea var. aurea</i>	1.90	2.50	0.995
15	ลำนำ	<i>Dillenia aurea var. aurea</i>	1.30	1.50	0.597
16	จิง	<i>Bombax ceiba,</i>	0.50	0.50	0.199
17	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	1.00	1.50	0.597
18	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	1.20	2.00	0.796
19	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii</i> (Leguminosae),	1.50	2.00	0.796
20	ชอเลี่ยน	<i>Gmelina arborea,</i>	1.00	1.50	0.597
21	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	1.00	2.00	0.796
22	ตะแบกเลื้อย	<i>T. mucronata,</i>	0.80	2.00	0.796
23	ตะแบกเลื้อย	<i>T. mucronata,</i>	0.50	2.50	0.995
24	ตุ้มเหลือง	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	1.00	1.50	0.597
25	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	0.90	0.80	0.318
26	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	0.40	1.00	0.398
27	อ้อยช้าง	<i>Lanea coromandelica</i> (Anacardiaceae),	0.50	1.50	0.597
28	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	0.70	0.50	0.199
29	ติ้ว	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	1.50	2.00	0.796

ตารางผนวก10 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (c.m)
30	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	1.30	2.50	0.995
31	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	0.80	2.00	0.796
32	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	1.40	2.00	0.796
33	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i>	0.60	1.50	0.597
34	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.20	1.00	0.398
35	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.10	1.00	0.398
36	แดง	<i>Xylia xylocarpa var. kerrii (Leguminosae),</i>	1.20	1.00	0.398
37	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.00	1.00	0.398
38	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus,</i>	0.50	1.50	0.597
39	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i>	1.00	1.00	0.398
40	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	0.80	2.00	0.796
41	หำดง	<i>Syzygium albiflorum</i>	0.50	2.50	0.995
42	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata,</i>	0.70	2.50	0.995
43	มะกึ่ม	<i>Canariun subulatum</i>	1.20	2.00	0.796
44	มะเกว่น	<i>Flacourtia indddica</i>	1.00	1.50	0.597
45	ตะแบกเลือด	<i>T. mucronata,</i>	0.60	1.00	0.398
46	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	1.20	1.20	0.478
47	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	1.00	1.50	0.597
48	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	1.40	1.50	0.597
49	ลำน	<i>Dillenia aurea var.aurea</i>	1.00	1.50	0.597
50	สัก	<i>Tectona grandis,</i>	1.20	2.00	0.796
51	ชอเลี่ยน	<i>Gmelina arborea,</i>	0.50	2.50	0.995

ตารางผนวกที่ 11 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ชั้นล่าง (แปลงทดลอง B) ในป่าเบญจพรรณ (Lower Mixed Deciduous Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 720 – 739 เมตร

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
ตะแบกเกียบ	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.961	6.667	2.439	1.645	7.215		11.615
มะเกี๋ย	3.000	0.750	3.000	1.000	0.200	5.882	20.000	7.317	1.098	4.813		18.013
ส้าน	4.000	0.563	3.000	1.333	0.267	7.843	20.000	7.317	1.071	4.695		19.856
ชอเสี้ยน	3.000	0.750	3.000	1.000	0.200	5.882	20.000	7.317	1.426	6.255		19.454
ตีนนก	6.000	0.375	3.000	2.000	0.400	11.765	20.000	7.317	1.399	6.137		25.218
ปวยเล็ด	8.000	0.281	7.000	1.143	0.533	15.686	46.667	17.073	1.234	5.412		38.171
แดง	5.000	0.450	3.000	1.667	0.333	9.804	20.000	7.317	1.151	5.049		22.170
สัก	6.000	0.375	4.000	1.500	0.400	11.765	26.667	9.756	1.399	6.137		27.658
จืด	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.961	6.667	2.439	0.411	1.804		6.204
ดุ่มเหลือง	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.961	6.667	2.439	1.234	5.412		9.811
ประดู่	2.000	1.125	2.000	1.000	0.133	3.922	13.333	4.878	0.823	3.608		12.407
เหียง	2.000	1.125	2.000	1.000	0.133	3.922	13.333	4.878	0.823	3.608		12.407
หนามแท่ง	2.000	1.125	2.000	1.000	0.133	3.922	13.333	4.878	1.234	5.412		14.211

ตารางผนวก11 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
เก็ดแดง	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.961	6.667	2.439	0.657	2.883	7.282	
อ้อยช้าง	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.961	6.667	2.439	1.234	5.412	9.811	
ติ้ว	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.961	6.667	2.439	1.645	7.215	11.615	
รกฟ้า	2.000	1.125	1.000	2.000	0.133	3.922	6.667	2.439	1.027	4.505	10.866	
ห้ำดง	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.961	6.667	2.439	2.057	9.019	13.419	
มะเขวน	1.000	2.250	1.000	1.000	0.067	1.961	6.667	2.439	1.234	5.412	9.811	
	51.000	26.044		22.643	3.400	100.000	273.333	100.000	22.803	100.000	300.000	

ตารางผนวก12 แสดงข้อมูลไม้คลุมดิน ในป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)

[illegible]

ตารางผนวก12 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
67	มะลิดิน	Geophila repens	98	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
68	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	99	.ผักปราบ	Commeliana sp.
69	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	100	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
70	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	101	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
71	ขมิ้นดิน	C.roscoeana	102	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
72	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	103	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
73	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	104	บุกป่า	Amorphophallus sp.
74	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	105	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
75	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	106	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
76	.ผักปราบ	Commeliana sp.	107	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
77	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	108	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
78	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	109	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
79	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	110	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
80	ขมิ้นดิน	C.roscoeana	111	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
81	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	112	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
82	กล้วยไม้ดิน	Habenaria dentata	113	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
83	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	114	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
84	กล้วยไม้ดิน	Habenaria dentata	115	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
85	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	116	กล้วยไม้ดิน	Habenaria dentata
86	.เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	117	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
87	มะลิดิน	Geophila repens	118	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
88	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	119	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
89	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	120	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
90	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	121	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
91	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	122	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
92	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	123	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
93	มะลิดิน	Geophila repens	124	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
94	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	125	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
95	ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.	126	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
96	.ผักปราบ	Commeliana sp.	127	มะลิดิน	Geophila repens
97	มะลิดิน	Geophila repens	128	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้

ตารางผนวก12 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
129	ดิงูเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
130	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
131	ดิงูเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
132	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
133	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
134	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
135	บุกป่า	Amorphophallus sp.
136	เครือตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
137	ดิงูเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
138	ดิงูเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
139	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
140	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
141	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
142	บุกป่า	Amorphophallus sp.
143	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
144	ดิงูเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
145	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
146	ดิงูเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.
147	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
148	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
149	มะลิดิน	Geophila repens
150	.เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
151	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
152	ขมิ้นดิน	C.roscoeana
153	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
154	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
155	มะลิดิน	Geophila repens
1.56	มะลิดิน	Geophila repens
157	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
158	ดิงูเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl.

ตารางผนวกที่ 13 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้น (แปลงวิจัยที่ C) ในป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarps Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 390 – 393 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
01	ติ่ง	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	15.00	40.00	15.92	10.00
02	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	16.00	73.00	29.06	5.00
03	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	14.00	5.57	2.00
04	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	10.50	4.18	0.60
05	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i>	2.00	11.00	4.37	0.80
06	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	16.00	6.36	0.80
07	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	24.00	9.55	3.00
08	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	18.00	88.00	35.03	6.00
09	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	7.00	21.50	8.55	0.90
10	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	8.00	3.18	0.40
11	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	11.50	4.57	0.60
12	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	2.30	1.50	0.59	1.00
13	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	15.00	82.50	32.84	5.00
14	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	1.80	6.50	2.58	0.60
15	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.00	13.50	5.37	2.00
16	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	4.00	7.50	2.98	1.00
17	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	13.50	5.37	1.00
18	เปลือกฝอย	-	3.00	8.50	3.38	0.60
19	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	10.00	77.00	30.65	4.00
20	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	6.00	21.50	8.55	0.30
21	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	13.00	5.17	0.90
22	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	18.00	7.16	0.50
23	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	11.50	4.57	2.00
24	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	12.00	4.77	1.00
25	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	5.00	10.50	4.18	3.00
26	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	5.00	1.99	0.50
27	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	0.50
28	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.50	2.18	0.30
29	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i>	3.00	8.00	3.18	2.00
30	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	6.00	2.38	1.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
31	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	18.00	7.16	1.50
32	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	8.00	3.18	1.20
33	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	16.00	92.00	36.62	4.50
34	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	5.00	17.50	6.96	3.00
35	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	9.00	3.58	1.00
36	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	2.50	5.50	2.18	0.60
37	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	12.00	48.50	19.30	7.00
38	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	6.00	19.00	7.56	3.00
39	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	20.00	7.962	1.00
40	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.50	26.00	10.35	1.00
41	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	5.00	37.00	14.72	1.80
42	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	8.00	3.18	0.50
43	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.50	10.00	3.98	1.00
44	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	4.50	23.00	9.15	2.50
45	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	3.00	17.00	6.76	2.00
46	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	3.00	8.00	3.18	1.30
47	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	3.50	17.00	6.76	0.80
48	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	20.00	7.96	3.00
49	มะกิม	<i>Canarium subulatum</i>	2.50	8.00	3.18	1.80
50	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	3.00	14.00	5.57	1.20
51	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	3.00	19.00	7.56	2.00
52	เกิดดำ	<i>Dalbergia rimosa</i>	2.50	8.00	3.18	1.20
53	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	9.00	3.58	1.00
54	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.00	9.00	3.58	1.00
55	แสดงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	2.50	7.00	2.78	0.80
56	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	1.60	14.00	5.57	1.00
57	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	7.00	2.78	0.80
58	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	2.50	7.00	2.78	1.60
59	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	2.00	7.00	2.78	1.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
60	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	2.00	19.00	7.56	1.60
61	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	3.50	13.00	5.17	1.00
62	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	12.00	43.00	17.11	6.00
63	ไทร	<i>Ficus altissima</i>	15.00	120.00	47.77	2.00
64	นมวัว	<i>Cyathostemma micranthum</i> (A.DC)j.sinel	20.00	23.00	9.15	0.50
65	นางแย้ม	<i>Clerodendrum viscosum</i> Vent.	16.00	29.00	11.56	1.00
66	สะกึ้ย	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	5.50	25.00	9.95	2.20
67	มะดูกดำ	<i>Xanthophyllum virens</i> Roxb	8.00	24.00	9.55	5.00
68	มะดูกดำ	<i>Xanthophyllum virens</i> Roxb	8.00	19.00	7.56	5.00
69	นมวัว	<i>Cyathostemma micranthum</i> (A.DC)j.sinel	15.00	23.00	9.15	6.00
70	สะกึ้ย	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	6.00	26.00	10.35	5.00
71	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	18.00	125.00	49.76	8.00
72	โชค	<i>Schleichera oleosa</i> Merr.	4.00	26.00	10.35	0.12
73	นางแย้ม	<i>Clerodendrum viscosum</i> Vent.	12.00	17.00	6.76	1.00
74	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	4.00	13.00	5.17	2.00
75	โชค	<i>Schleichera oleosa</i> Merr.	2.50	9.00	3.58	1.50
76	สะกึ้ย	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	20.00	99.00	39.41	12.00
77	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	2.50	11.00	4.37	1.00
78	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	9.00	25.00	9.95	6.00
79	ชะมอก		3.50	11.00	4.37	1.50
80	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	3.00	10.00	3.98	2.00
81	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	6.00	30.00	11.94	2.50
82	มะเคาะป่า		5.00	17.00	6.76	2.00
83	มะดูกดำ	<i>Xanthophyllum virens</i> Roxb	2.50	12.00	4.77	0.50
84	สะกึ้ย	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	7.50	35.00	13.93	5.00
85	มะเคาะป่า		5.00	42.00	16.720	1.50
86	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	5.00	37.00	14.72	0.80
87	นมวัว	<i>Cyathostemma micranthum</i> (A.DC)j.sinel	6.00	17.00	6.76	0.50
88	สะกึ้ย	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	9.00	57.00	22.69	3.50
89	นางแย้ม	<i>Clerodendrum viscosum</i> Vent.	5.00	15.00	5.97	1.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
90	นมวัว	<i>Cyathostemma micranthum</i> (A.DC.)j.sinel	8.00	12.00	4.77	0.80
91	ขี้เหล็กหลวง	<i>Casia siamea</i> Lamk.	8.00	26.00	10.35	5.50
92	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae)	18.00	63.00	25.08	10.00
93	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	25.00	89.00	35.43	15.00
94	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	16.00	73.00	29.06	6.00
95	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	3.50	9.00	3.58	1.50
96	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	10.00	3.98	0.50
97	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	13.00	5.17	0.50
98	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	10.00	50.00	19.90	2.50
99	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	19.00	7.56	-
100	แสลงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	5.00	22.00	8.75	1.00
101	ติ้วขน	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack)	2.50	7.00	2.78	0.50
102	แสลงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	1.60	8.00	3.18	1.00
103	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	3.50	13.00	5.17	1.20
104	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	2.00	7.00	2.78	1.00
105	แข่งกวาว	<i>Wendlandia tinctoria</i> A.DC.	2.50	6.00	2.38	1.00
106	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	9.00	23.00	9.15	3.00
107	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.50	9.00	3.58	0.30
108	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.50	9.00	3.58	0.50
109	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	6.00	2.38	0.50
110	กาวดูก		8.00	12.00	4.77	1.00
111	กาวดูก		8.00	8.00	3.18	3.00
112	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	8.00	3.18	1.00
113	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	8.00	3.18	-
114	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	12.00	39.00	15.52	2.00
115	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	25.00	61.00	24.28	15.00
116	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	10.00	16.00	6.36	1.00
117	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	7.00	2.78	0.20
118	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	8.00	3.18	0.30
119	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	7.00	2.787	1.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
120	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	9.00	35.00	13.93	3.00
121	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	15.00	80.00	31.84	9.00
122	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	20.00	95.00	37.81	12.00
123	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.00	10.00	3.98	1.00
124	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	10.00	45.00	17.91	7.50
125	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	6.00	34.00	13.53	2.50
126	แจ๊ะ	-	4.00	25.00	9.95	1.50
127	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	8.00	10.00	3.98	1.00
128	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	6.00	20.00	7.96	1.00
129	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	25.00	93.00	37.02	15.00
130	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	8.00	40.00	15.92	6.50
131	ส้มเห็ด	-	2.50	10.00	3.98	1.00
132	ส้มเห็ด	-	3.50	13.00	5.17	1.00
133	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	2.50	8.00	3.18	0.50
134	ส้มเห็ด		3.00	14.00	5.57	1.50
135	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	15.00	63.00	25.08	8.00
136	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	10.00	50.00	19.90	3.50
137	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	7.00	20.00	7.96	3.00
138	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	2.50	10.00	3.98	1.00
139	ส้มเห็ด	-	2.00	8.00	3.18	1.00
140	มะปิ่น	<i>Aegle marmelos</i>	3.00	7.00	2.78	1.50
141	ส้มเห็ด	-	2.50	24.00	9.55	1.00
142	ไซค	<i>Schleichera oleosa</i> Merr.	14.00	78.00	31.05	7.00
143	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	3.50	15.00	5.97	2.50
144	หาด	<i>Artocarpus lakoocha</i>	5.00	18.00	7.16	2.50
145	ดงดำ	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	6.50	20.00	7.96	3.00
146	เฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	3.00	15.00	5.97	1.50
147	มะปิ่น	<i>Aegle marmelos</i>	2.00	8.00	3.18	1.00
148	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	6.00	18.00	7.16	3.00
149	นางแย้ม	<i>Clerodendrum viscosum</i> Vent.	10.00	18.00	7.16	2.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
150	มะปิ่น	<i>Clerodendrum viscosum</i> Vent.	3.50	22.00	8.75	1.00
151	ไช้	<i>Schleichera oleosa</i> Merr.	10.00	68.00	27.07	2.50
152	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	2.00	7.00	2.78	0.20
153	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	8.00	3.18	0.50
154	ส้มเห็ด	-	5.00	17.00	6.76	2.00
155	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	3.00	7.00	2.78	2.00
156	มะเคาะน้ำ		2.00	7.00	2.78	0.50
157	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	11.00	4.37	1.00
158	มะเคาะน้ำ	-	3.00	9.00	3.58	0.50
159	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	13.00	74.00	29.45	8.00
160	มะกั้ม	<i>Canariun subulatum</i>	8.00	21.00	8.36	7.00
161	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	7.00	2.78	0.50
162	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	27.00	10.74	0.50
163	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	8.00	3.18	1.50
164	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	6.00	26.00	10.35	2.00
165	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	5.00	20.00	7.96	1.00
166	มะน้ำป่า	-	8.00	25.00	9.95	2.00
167	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	18.00	70.00	27.86	10.00
168	นมวัว	<i>Cyathostemma micranthum</i> (A.DC)J.Sincl.	14.00	27.00	10.74	3.00
169	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb.	6.00	15.00	5.97	1.50
170	พูกฤษ	<i>Albizia lebbek,</i>	6.00	11.00	4.37	1.00
171	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	2.00	7.00	2.78	1.00
172	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	2.50	9.00	3.58	1.00
173	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	12.00	4.77	0.80
174	เฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	3.00	10.00	3.98	1.00
175	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.50	29.00	11.54	2.00
176	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	15.00	70.00	27.86	5.50
177	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	12.00	13.00	5.17	7.00
178	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	2.00	6.00	2.38	0.50

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
179	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	17.00	6.76	1.00
180	กระแจะ	<i>Ochna integerrima Merr.</i>	2.50	12.00	4.77	1.00
181	เหมือดโคโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	15.00	5.97	1.50
182	ดุ่ม	<i>M. hirsuta (Rubiaceae),</i>	2.00	5.00	1.99	0.20
183	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	3.00	7.00	2.78	1.00
184	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa Roxb.</i>	3.00	12.00	4.77	1.50
185	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	9.00	3.58	1.50
186	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis Craib</i>	3.50	8.00	3.18	2.00
187	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa Roxb.</i>	5.50	22.00	8.75	1.50
188	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	4.50	12.00	4.77	2.00
189	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	6.50	18.00	7.16	1.50
190	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	12.00	4.77	2.00
191	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa Roxb.</i>	2.00	12.00	4.77	1.00
192	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	8.00	39.00	15.52	4.00
193	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	8.00	3.18	1.00
194	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata (Anacardiaceae),</i>	10.00	55.00	21.89	7.00
195	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	4.00	8.00	3.18	2.00
196	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa Roxb.</i>	3.00	6.00	2.38	1.00
197	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis Craib</i>	4.50	12.00	4.77	2.00
198	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	2.50	8.00	3.18	1.00
199	ดุ่ม	<i>M. hirsuta (Rubiaceae),</i>	2.50	9.00	3.58	1.50
200	มะมื่น	<i>Irvingia malayana Oliv.ex A. Benn.</i>	2.00	8.00	3.18	0.50
201	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	10.00	3.98	0.50
202	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	15.00	5.97	2.00
203	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	43.00	17.11	6.00
204	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	30.00	11.94	3.00
205	เหมือดโคโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	12.00	4.77	0.50
206	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	13.00	5.17	1.50
207	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	3.50	11.00	4.37	2.00
208	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa Roxb.</i>	3.00	8.00	3.18	0.30

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
209	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	17.00	6.76	5.00
210	ติ้วขน	<i>Cratoxylum formosum</i>	2.00	8.00	3.18	1.00
211	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	6.00	13.00	5.17	2.00
212	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	6.00	2.38	1.00
213	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	9.00	3.58	2.00
214	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	12.00	4.77	1.00
215	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	6.00	13.00	5.17	1.50
216	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	12.00	4.77	2.00
217	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	9.00	53.00	21.09	3.00
218	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	14.00	5.57	3.00
219	มะนะ	<i>Terminalia chebula</i> Retz. Syn.	5.00	29.00	11.54	2.50
220	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	13.00	5.17	1.50
221	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	6.00	13.00	5.17	2.00
222	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	25.00	9.95	6.00
223	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	10.00	50.00	19.90	3.00
224	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	2.00	5.00	1.99	0.50
225	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
226	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	6.00	2.38	1.00
227	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.00	2.38	1.50
228	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	25.00	100.50	40.08	15.00
229	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	13.00	5.17	1.50
230	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	12.00	54.00	21.49	8.00
231	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	5.00	1.99	1.00
232	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	10.00	3.98	2.50
233	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	8.00	3.18	2.00
234	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	42.00	16.72	3.00
235	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	13.00	5.17	1.50
236	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	13.00	5.17	3.00
237	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	11.00	4.37	1.50
238	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	1.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
239	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	9.00	3.58	2.00
240	มะเคาะน้ำ	-	5.00	15.00	5.97	1.00
241	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	13.00	5.17	2.00
242	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	8.00	3.18	1.00
243	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	8.00	3.18	1.00
244	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	1.00
245	มะเคาะน้ำ	-	3.00	6.00	2.38	0.80
246	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	8.00	3.18	2.00
247	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.50	6.00	2.38	2.50
248	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.00	2.38	2.00
249	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	11.00	4.37	1.50
250	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	8.00	3.18	1.50
251	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	23.00	9.15	1.00
252	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	6.00	24.00	9.55	1.00
253	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	8.00	43.00	17.11	5.00
254	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.50	22.00	8.75	4.00
255	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	0.30
256	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	25.00	61.00	24.28	15.00
257	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	10.00	41.00	16.32	8.00
258	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	15.00	5.97	1.00
259	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	9.00	3.58	1.50
260	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	8.00	3.18	1.00
261	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	8.00	3.18	-
262	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	8.00	3.18	-
263	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	18.00	7.16	0.50
264	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	5.00	1.99	1.00
265	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	9.00	3.58	1.00
266	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	25.00	1.00	0.39	18.00
267	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	6.00	27.00	10.74	0.50
268	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	1.80	0.71	1.70

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
269	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	11.00	4.37	2.00
270	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	17.00	6.76	3.00
271	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	12.00	8.00	3.18	8.00
272	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	12.00	4.77	1.00
273	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	2.00	0.79	0.50
274	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	7.50	4.50	1.79	4.00
275	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	4.00	19.00	7.56	3.00
276	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	3.00	1.19	1.00
277	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	3.00	1.19	2.50
278	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	25.00	2.00	0.79	15.00
279	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	4.50	3.00	1.19	0.50
280	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	2.00	0.79	1.50
281	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	3.50	8.00	3.18	2.00
282	ตุ้ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	3.00	7.00	2.78	1.50
283	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.00	8.00	3.18	0.50
284	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	8.00	3.18	1.00
285	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	9.00	3.58	0.50
286	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	13.00	5.17	1.50
287	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.50	15.00	5.97	1.00
288	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.00	15.00	5.97	5.00
289	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	4.00	15.00	5.97	2.00
290	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	4.50	15.00	5.97	2.50
291	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	24.00	86.00	34.26	12.00
292	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	10.00	3.91	1.50
293	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	17.00	6.78	1.50
293	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	10.00	3.98	1.00
295	มะเมาสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.50	11.00	4.37	1.00
296	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	24.00	71.00	28.26	18.00
297	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.50	27.00	10.74	1.50
298	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	16.00	65.00	25.87	14.50

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
299	ตัง	<i>D.tuberculatus</i>	26.00	100.00	39.80	15.00
300	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	6.00	2.38	0.50
301	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	7.00	2.78	0.50
302	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	6.00	2.38	0.50
303	ดุ่ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	2.50	10.00	3.98	0.80
304	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	2.50	8.00	3.18	1.00
305	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	5.00	1.99	0.20
306	แสลงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae)	3.50	10.00	3.98	0.50
307	เข็มป่า	<i>Pavetta tomentosa</i> Roxb.ex Sm	2.00	5.00	1.99	0.50
308	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	0.30
309	สารภี	<i>Anneslea fragrans</i>	3.00	8.00	3.18	0.50
310	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	10.00	46.00	18.31	8.00
311	แะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	8.00	50.00	19.90	4.00
312	กาวดุก	-	-	23.00	9.15	2.50
313	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	13.00	5.17	2.00
314	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	12.00	4.77	4.20
315	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.19	1.50
316	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	4.00	1.59	0.50
317	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	3.00	1.19	0.20
318	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.50	13.00	5.17	3.00
319	ดุ่ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	6.00	8.00	3.18	3.00
320	ดุ่ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	6.00	26.00	10.35	4.00
321	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	38.00	15.12	1.00
322	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	20.00	82.00	32.64	15.00
323	แะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.50	6.00	2.38	1.00
324	เหมือด	<i>M. Scutellatum</i>	1.50	9.00	3.58	0.30
325	แะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	3.00	8.00	3.18	0.30
326	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.50	99.00	39.41	0.18
327	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	3.50	8.00	3.18	0.50
328	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	2.00	5.00	1.99	1.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
329	แฉะ	<i>Shorea obtusa,</i>	2.50	11.00	4.37	0.30
330	ชะมอก	-	1.50	4.00	1.59	0.50
331	ชะมอก	-	2.50	3.00	1.19	2.00
332	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	15.00	83.00	33.04	2.00
333	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	4.00	1.59	0.50
334	สีเลื่อหลวง	<i>Casearia grewiaefolia</i> Vent.	2.50	9.00	3.58	1.00
335	มะกั้ม	<i>Canariun subulatum</i>	13.00	124.00	49.36	6.00
336	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.50	8.00	3.18	1.00
337	แฉะ	<i>Shorea obtusa,</i>	3.00	28.00	11.14	1.00
338	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	12.00	47.00	18.71	7.00
339	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	7.00	2.78	1.00
340	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	7.00	33.00	13.13	2.00
341	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	23.00	9.15	1.50
342	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	12.00	23.00	9.15	4.00
343	แฉะ	<i>Shorea obtusa,</i>	2.00	6.00	2.38	0.20
344	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.50	8.00	3.18	1.00
345	กาวดุก	-	19.00	25.00	9.95	1.00
346	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	2.00	0.60	0.23	1.00
347	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	2.20	8.00	3.18	0.80
348	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	10.00	3.98	2.00
350	เหมือด	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	8.00	3.18	1.00
351	มะเฝ้าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.00	8.00	3.18	0.50
352	แฉะ	<i>Shorea obtusa,</i>	3.00	6.00	2.38	1.00
353	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	6.00	2.38	2.00
354	ตีนนก	<i>Terminalia glaucifolia</i> Craib.	15.00	43.00	17.18	8.00
355	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	25.00	73.00	29.06	10.00
356	แฉะ	<i>Shorea obtusa,</i>	3.00	7.00	2.78	1.00
357	แฉะ	<i>Shorea obtusa,</i>	3.50	7.00	2.78	0.30
358	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.50
359	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	20.00	74.00	29.45	10.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
360	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	3.00	5.00	1.99	2.00
361	เหมือดโคโคน	<i>M. Scutellatum</i>	5.50	13.00	5.17	4.00
362	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.00	7.00	2.78	0.30
363	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.50	3.00	1.19	0.30
364	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	15.00	108.00	42.99	6.00
365	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	8.00	3.18	0.20
366	แข่งกวาง	<i>Wendlandia tinctoria</i> A.DC.	3.50	6.00	2.38	1.00
367	กาวตูก	-	30.00	40.00	15.94	2.50
368	เหมือดโคโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	8.00	3.18	1.50
369	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	20.00	106.00	42.19	1.60
370	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.60	6.00	2.38	0.30
371	เหมือดโคโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	10.00	3.98	0.20
372	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	16.00	55.00	21.89	8.00
373	ดงดำ	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	2.50	6.00	2.38	0.30
374	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	30.00	11.94	2.50
375	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.50	10.00	3.98	0.50
376	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	2.00	6.00	2.38	1.00
377	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	5.00	1.99	1.50
378	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	6.00	40.00	15.92	2.00
379	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	2.00	5.00	1.99	1.00
380	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.00	8.00	3.18	0.50
381	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	1.20	8.00	3.18	0.50
382	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	6.00	2.38	0.50
383	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	15.00	59.00	23.47	8.00
384	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	8.00	3.18	1.20
385	ติวขน	<i>Cratoxylum formosum</i>	2.50	3.00	1.19	0.50
386	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	3.00	1.19	1.00
387	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.00	2.38	1.00
388	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	3.50	8.00	3.18	1.50
389	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	10.00	3.98	1.50

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
390	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	10.00	3.98	2.00
391	ดุ่ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	4.50	8.00	3.18	1.00
392	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.50
393	ดุ่ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	2.00	5.00	1.99	0.50
394	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	3.00
395	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.19	0.80
396	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	15.00	39.00	15.55	10.00
397	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	25.00	9.95	1.30
398	มอกหลวง	<i>Gardenia xylocarpa</i> Craib.	1.80	2.00	0.79	0.50
399	ตะมอคงคอง	-	2.00	2.50	0.99	1.00
400	มะนะ	<i>Terminalia chebula</i> Retz. Syn.	2.00	3.00	1.19	1.10
401	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	1.20
402	แ้งกวาง	<i>Wendlandia tinctoria</i> A.DC.	2.50	3.00	1.19	1.30
403	กาวดุก	-	-	2.00	0.79	-
404	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	7.00	23.00	9.15	2.50
405	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	2.00	0.79	0.40
406	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	3.50	1.39	1.20
407	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	12.50	4.97	2.50
408	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	12.00	4.77	0.60
409	กาวเคือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth		4.00	1.59	
410	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	6.00	18.00	7.16	1.80
411	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	5.00	1.99	40.00
412	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	9.00	3.58	0.60
413	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	2.50	10.00	3.98	0.65
414	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	15.00	27.00	10.78	1.50
415	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	1.70	1.80	0.71	0.60
416	กาวเคือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	11.00	4.37	-
417	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	17.00	6.76	6.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
418	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	8.00	3.18	1.80
419	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	12.00	4.77	1.10
420	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	2.00	0.79	40.00
421	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	4.50	1.79	-
422	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	10.00	19.00	7.56	6.00
423	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	3.00	1.19	0.20
424	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	3.00	1.19	1.10
425	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	2.00	0.79	1.00
426	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	3.00	1.19	-
427	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	8.00	2.00	0.79	0.50
428	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	8.00	3.18	1.50
429	กาวดุก	-	-	7.00	2.78	-
430	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	5.00	10.00	3.98	2.00
431	เหมือด	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	4.30	1.71	1.10
432	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	11.00	26.00	10.35	9.00
433	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	4.00	1.59	-
434	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	8.00	22.00	8.75	0.60
435	โพธิ์	<i>Ficus religiosa</i> Bodhi tree.	2.50	4.00	1.59	1.60
436	สีเสื่อหลวง	<i>Casearia grewiaefolia</i> Vent.	2.50	4.00	1.59	0.70
437	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.35	3.00	1.19	0.60
438	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	11.00	39.00	15.52	0.20
439	เป่าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	1.50	2.00	0.79	0.60
440	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	12.00	27.00	10.78	8.00
441	กาวดุก	-	-	4.00	1.59	-
442	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.19	1.60
443	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	4.00	1.59	1.30
444	ตีนนก	<i>V. pinnata</i> ,	1.80	3.00	1.19	0.60
445	แข่งกวาง	<i>Wendlandia tinctoria</i> A.DC.	2.00	2.00	0.79	2.00
446	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	2.00	0.79	-
447	สีเสื่อหลวง	<i>Casearia grewiaefolia</i> Vent.	1.50	1.00	0.39	0.60

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
448	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	1.50	0.59	0.30
449	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	2.00	5.00	1.99	0.60
450	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	3.50	1.39	0.40
451	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	2.00	0.79	1.80
452	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	12.00	3.30	1.31	6.00
453	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	8.00	2.30	0.91	0.20
454	มะเกี๋ย	<i>Canarium subulatum</i>	8.00	16.00	6.36	1.00
455	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	3.00	1.19	0.60
456	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	9.00	28.00	11.16	0.60
457	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	5.00	1.99	0.70
458	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	3.00	1.19	-
459	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	17.00	6.76	-
460	สีเลื่อหลวง	<i>Casearia grewiaefolia</i> Vent.	1.50	3.00	1.19	1.00
461	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	3.50	2.00	0.79	1.00
462	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	15.00	35.00	13.93	9.00
463	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.50	6.00	2.38	1.00
464	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.80	4.00	1.59	0.60
465	ตุ้ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	5.00	11.00	4.37	0.80
466	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.70	2.00	0.79	0.30
467	กาวดุก	-	-	3.50	1.39	-
468	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	6.00	10.00	3.98	0.60
469	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.30	3.50	1.39	0.30
470	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	1.80	5.00	1.99	0.60
471	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	3.00	1.19	-
472	เปลือกผอย	-	6.00	9.00	3.58	0.30
473	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.30	7.00	2.78	0.50
474	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.50	4.00	1.59	0.60
475	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.60	2.00	0.79	0.30
476	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	3.00	1.19	-
477	รกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	1.80	3.00	1.194	0.80

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
478	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	4.00	1.59	0.30
479	เป่าหลวง	<i>Croton oblongifolius</i>	6.00	8.00	3.18	0.40
480	ชะมอก	-	2.30	2.00	0.79	1.20
481	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.00	6.00	2.38	0.80
482	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.50	3.00	1.19	0.80
483	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	4.00	8.50	3.38	2.00
484	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	1.00	0.39	-
485	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	1.80	6.00	2.38	0.70
486	ตุ้ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	8.00	22.00	8.75	1.50
487	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	1.70	3.00	1.19	0.70
488	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.30	6.00	2.38	0.70
489	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	4.00	7.00	2.78	1.50
490	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	3.00	15.00	5.97	0.70
491	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	14.00	5.57	1.80
492	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.90	3.00	1.19	0.40
493	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	12.00	24.00	9.55	8.00
494	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	6.00	2.38	1.10
495	กาวตูก	-	-	3.00	1.19	-
496	มะกิม	<i>Canariun subulatum</i>	9.00	19.00	7.56	0.80
497	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	4.00	1.59	-
498	เปลือกฝอย	-	10.00	19.00	7.56	4.00
499	มะกิม	<i>Canariun subulatum</i>	12.00	27.00	10.74	6.00
500	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	2.00	3.00	1.19	1.20
501	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	2.00	4.00	1.59	0.30
502	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	3.00	1.19	-
503	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	3.00	1.19	-
504	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i>	5.00	10.00	3.98	2.00
505	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	5.00	1.99	1.30
506	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	14.00	32.00	12.79	8.00
507	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	5.00	1.99	-

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
508	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	15.00	35.00	13.93	9.00
509	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.30	2.50	0.99	0.50
510	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	2.50	0.99	0.20
511	กาวดุก	-	-	2.00	0.79	-
512	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i>	8.00	12.00	4.77	2.50
513	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	9.00	3.58	2.50
514	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	1.80	3.00	1.19	1.00
515	กาวดุก	-	-	4.00	1.59	-
516	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	14.00	22.00	8.75	7.00
517	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	3.00	1.19	-
518	มะกิม	<i>Canarium subulatum</i>	8.00	25.00	9.95	6.00
519	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	14.00	29.00	11.54	10.00
520	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.10	4.00	1.59	0.80
521	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	3.00	1.19	-
522	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	2.00	0.79	-
523	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	14.00	5.57	3.60
524	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	14.00	23.00	9.15	8.00
525	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	1.60
526	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.50	6.00	2.38	1.00
527	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	12.00	40.00	15.92	6.00
528	เหมือด	<i>M. Scutellatum</i>	15.00	56.00	22.29	2.00
529	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	20.00	49.00	19.50	0.50
530	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	16.00	78.00	31.05	1.00
531	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	5.50	8.00	3.18	2.20
532	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	8.00	12.00	4.77	5.00
533	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	8.00	10.00	3.98	5.00
534	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	7.00	13.00	5.17	6.00
535	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	6.00	8.00	3.18	5.00
536	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	18.00	45.00	17.94	8.00
537	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	10.00	3.98	2.00

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
538	สีเลื่อหลวง	<i>Casearia grewiaefolia</i> Vent.	12.00	30.00	11.94	1.00
539	มะกั้ม	<i>Canarium subulatum</i>	4.00	7.00	2.78	2.00
540	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	5.00	1.99	1.50
541	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	20.00	57.00	22.69	12.00
542	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	5.00	1.99	0.50
543	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	5.00	6.00	2.38	0.20
544	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	2.30	2.50	0.99	0.30
545	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	2.50	0.99	0.25
546	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	4.00	2.00	0.79	2.50
547	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	8.00	12.00	4.77	0.15
548	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	6.00	9.00	3.58	1.50
549	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	8.00	3.00	1.19	7.00
550	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	4.00	1.59	1.00
551	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	14.00	22.00	8.75	6.00
552	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	2.50	3.00	1.19	0.80
553	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	8.00	25.00	9.95	0.80
554	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	14.00	29.00	11.55	10.00
555	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	2.10	4.00	1.59	0.80
556	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.00	3.00	1.19	3.60
557	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.30	2.00	0.79	0.60
558	แข่งกวาง	<i>Wendlandia tinctora</i> A.DC.	7.00	14.00	5.57	2.00
559	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	14.00	23.00	9.15	3.50
560	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	5.00	10.00	3.98	1.00
561	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	3.00	1.19	1.30
562	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	8.00	3.18	1.00
563	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	7.00	9.00	3.58	1.00
564	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	6.00	2.389	0.50
565	ดงดำ	<i>Alstonia scholaris</i> R. Br.	2.30	4.50	1.79	2.00
566	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	12.00	46.00	18.32	0.90
567	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	3.00	1.194	0.80

ตารางผนวกที่ 13 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
568	ส้มป่อย	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	3.00	3.00	1.19	1.00
569	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	8.00	3.18	3.00
570	แะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	6.00	7.00	2.78	2.00
571	รูกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	4.00	7.00	2.78	1.00
572	แะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.00	3.00	1.19	1.20
573	แะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	12.00	35.00	13.93	8.00
574	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	3.00	1.19	0.50
575	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	13.00	3.00	1.19	7.00
576	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	10.00	11.00	4.37	2.00
577	ติวชน	<i>Cratoxylum formosum</i>	4.00	3.00	1.19	1.00
578	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.30	3.00	1.19	0.60
579	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.30	3.00	1.19	0.80
580	ส้มป่อย	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	4.00	4.50	1.79	0.40
581	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	3.00	1.19	0.60
582	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	7.00	2.78	2.00

ตารางผนวกที่ 14 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ยืนต้น (แปลงทดลอง C) ในป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarps Forest) ที่ระดับความสูง
จากน้ำทะเล 390 - 393 เมตร

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
เหียง	87.000	0.018	20.000	4.350	3.480	15.026	80.000	9.302	18.537	2.432		26.760
จืดดำ	112.000	0.014	22.000	5.091	4.480	19.344	88.000	10.233	6.838	0.897		30.473
เหมือดโคน	45.000	0.035	4.000	11.250	1.800	7.772	16.000	1.860	12.741	1.672		11.304
มะมื่น	12.000	0.130	5.000	2.400	0.480	2.073	20.000	2.326	11.643	1.528		5.926
ชะเงาะ	19.000	0.082	3.000	6.333	0.760	3.282	12.000	1.395	7.497	0.984		5.660
ส้มป่อง	21.000	0.074	6.000	3.500	0.840	3.627	24.000	2.791	8.053	1.056		7.474
เก็ดแดง	24.000	0.065	10.000	2.400	0.960	4.145	40.000	4.651	9.926	1.302		10.098
ตีนนก	9.000	0.174	4.000	2.250	0.360	1.554	16.000	1.860	17.691	2.321		5.736
ขี้ยาย	13.000	0.120	6.000	2.167	0.520	2.245	24.000	2.791	7.497	0.984		6.020
รกฟ้า	9.000	0.174	3.000	3.000	0.360	1.554	12.000	1.395	5.608	0.736		3.685
แสงใจ	4.000	0.391	2.000	2.000	0.160	0.691	8.000	0.930	9.669	1.269		2.890
แงะ	38.000	0.041	21.000	1.810	1.520	6.563	84.000	9.767	12.776	1.676		18.007
นมวัว	5.000	0.313	3.000	1.667	0.200	0.864	12.000	1.395	16.786	2.202		4.461

ตารางผนวกที่ 14 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
เคลือบนางแย้ม	4.000	0.391	3.000	1.333	0.160	0.691	12.000	1.395	16.251	2.132		4.218
มะเคาะน้ำ	6.000	0.260	2.000	3.000	0.240	1.036	8.000	0.930	13.165	1.727		3.694
ฮักหลวง	19.000	0.082	4.000	4.750	0.760	3.282	16.000	1.860	24.668	3.236		8.378
มะดูกดำ	3.000	0.521	2.000	1.500	0.120	0.518	8.000	0.930	15.085	1.979		3.427
สะกีย	5.000	0.313	2.000	2.500	0.200	0.864	8.000	0.930	39.827	5.225		7.019
โชค	4.000	0.391	3.000	1.333	0.160	0.691	12.000	1.395	37.235	4.885		6.971
มะปิ่น	3.000	0.521	2.000	1.500	0.120	0.518	8.000	0.930	10.149	1.331		2.780
มะเฒ่าสาย	8.000	0.195	3.000	2.667	0.320	1.382	12.000	1.395	8.332	1.093		3.870
เปลือกฝอย	3.000	0.521	2.000	1.500	0.120	0.518	8.000	0.930	10.010	1.313		2.762
เปา	18.000	0.087	6.000	3.000	0.720	3.109	24.000	2.791	36.799	4.828		10.727
ส้มเห็ด	6.000	0.260	3.000	2.000	0.240	1.036	12.000	1.395	8.640	1.134		3.565
กาวดุก	12.000	0.130	6.000	2.000	0.480	2.073	24.000	2.791	9.155	1.201		6.064
กาวเคลือบ	28.000	0.056	23.000	1.217	1.120	4.836	92.000	10.698	3.659	0.480		16.014

ตารางผนวกที่ 14 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย	ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)
ชะมอก	4.000	0.391	2.000	2.000	0.160	0.691	8.000	0.930	4.113	0.540	2.161
หนามแท่ง	5.000	0.313	3.000	1.667	0.200	0.864	12.000	1.395	15.304	2.008	4.267
ดู่	10.000	0.156	5.000	2.000	0.400	1.727	20.000	2.326	9.134	1.198	5.251
ติ้วขน	4.000	0.391	2.000	2.000	0.160	0.691	8.000	0.930	4.320	0.567	2.188
มะกึ่ม	8.000	0.195	6.000	1.333	0.320	1.382	24.000	2.791	25.405	3.333	7.505
แจ้ะ	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	15.223	1.997	2.635
ตึง	2.000	0.781	2.000	1.000	0.080	0.345	8.000	0.930	57.599	7.557	8.832
แข่งกวาง	5.000	0.313	3.000	1.667	0.200	0.864	12.000	1.395	5.101	0.669	2.928
สีเสื่อหลวง	5.000	0.313	3.000	1.667	0.200	0.864	12.000	1.395	7.735	1.015	3.274
ดงดำ	2.000	0.781	2.000	1.000	0.080	0.345	8.000	0.930	4.320	0.567	1.842
เป้าหลวง	2.000	0.781	2.000	1.000	0.080	0.345	8.000	0.930	4.113	0.540	1.815
เก็ดดำ	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	6.583	0.864	1.502
ไทร	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	98.743	12.954	13.592
ขี้เหล็กหลวง	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	21.393	2.807	3.444

ตารางผนวกที่ 14 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
หาด	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	14.812	1.943	2.581	
ดงดำ	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	16.457	2.159	2.797	
มะพร้าว	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	20.571	2.699	3.337	
พูกฤษ	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	9.051	1.187	1.825	
มะนัะ	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	23.864	3.131	3.769	
เข็มป่า	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	4.113	0.540	1.177	
สารภี	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	6.583	0.864	1.502	
ค้ำมอกหลวง	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	1.645	0.216	0.854	
ตะมอขคอง	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	2.057	0.270	0.908	
มะนัะ	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	2.468	0.324	0.962	
โพธิ์	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.173	4.000	0.465	3.291	0.432	1.070	
รวม	579.000	33.209		106.851	23.160	100.000	860.000	100.000	762.237	100.000	300.000	

ตารางผนวกที่ 15 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้นที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของป่าเต็งรัง (Deciduous Dry Dipterocarp Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 390 – 393 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)	ขนาดทรง พุ่ม(m)
100	แสลงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	14.00	22.00	8.758	1.00	7.00
101	ติ้วขน	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack)	2.50	7.00	2.787	0.50	2.50
102	แสลงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae),	1.60	8.00	3.185	1.00	2.30
103	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	3.50	13.00	5.175	1.20	2.10
104	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	2.00	7.00	2.787	1.00	2.50
105	แข่งกวาง	<i>Wendlandia tinctoria</i> A.DC.	2.50	6.00	2.389	1.00	3.00
106	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	9.00	23.00	9.156	3.00	4.50
107	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.50	9.00	3.583	0.30	2.00
108	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.50	9.00	3.583	0.50	2.50
109	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	6.00	2.389	0.50	1.50
110	กาวดูก		8.00	12.00	4.777	1.00	
111	กาวดูก		8.00	8.00	3.185	3.00	
112	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	8.00	3.185	1.00	2.00
113	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth		8.00	3.185		
114	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	12.00	39.00	15.525	2.00	8.00
115	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	15.00	61.00	24.283	15.00	8.00
116	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	10.00	16.00	6.369	1.00	3.00
117	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	7.00	2.787	0.20	2.10
118	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	8.00	3.185	0.30	3.00
119	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	7.00	2.787	1.00	4.00
120	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	9.00	35.00	13.933	3.00	3.00
121	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	15.00	80.00	31.847	9.00	4.00
122	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	13.00	95.00	37.818	12.00	3.20
123	เป่า	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.00	10.00	3.981	1.00	2.10
124	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	10.00	45.00	17.914	7.50	3.50
125	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	6.00	34.00	13.535	2.50	3.00
126	แจ๊ะ		4.00	25.00	9.952	1.50	2.50
127	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	8.00	10.00	3.981	1.00	
128	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	6.00	20.00	7.962	1.00	2.40

ตารางผนวกที่ 15 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)	ขนาดทรง พุ่ม(m)
129	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	15.00	93.00	37.022	15.00	3.00
130	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	8.00	40.00	15.924	6.50	4.00
131	ส้มเห็ด		2.50	10.00	3.981	1.00	2.10
132	ส้มเห็ด		3.50	13.00	5.175	1.00	4.20
133	ขะเจาะ	<i>Millettia kangensis Craib</i>	2.50	8.00	3.185	0.50	2.00
134	ส้มเห็ด		3.00	14.00	5.573	1.50	2.50
135	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	15.00	63.00	25.080	8.00	3.50
136	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	10.00	50.00	19.904	3.50	7.00
137	ขี้ฮ้าย	<i>Wasura robusta Roxb.</i>	7.00	20.00	7.962	3.00	4.00
138	ขี้ฮ้าย	<i>Wasura robusta Roxb.</i>	2.50	10.00	3.981	1.00	2.10
139	ส้มเห็ด		2.00	8.00	3.185	1.00	2.30
140	มะปิ่น	<i>Aegle marmelos</i>	3.00	7.00	2.787	1.50	2.00
141	ส้มเห็ด		2.50	24.00	9.554	1.00	2.00
142	มะโจก		14.00	78.00	31.051	7.00	5.00
143	ขี้ฮ้าย	<i>Wasura robusta Roxb.</i>	3.50	15.00	5.971	2.50	2.50
144	หาด	<i>Artocarpus lakoocha</i>	5.00	18.00	7.166	2.50	10.00
145	ดงดำ	<i>Alstonia scholaris R. Br.</i>	6.50	20.00	7.962	3.00	3.50
146	เมาสาย	<i>Antidesma acidum</i>	3.00	15.00	5.971	1.50	4.00
147	มะปิ่น	<i>Aegle marmelos</i>	2.00	8.00	3.185	1.00	5.00
148	ขี้ฮ้าย	<i>Wasura robusta Roxb.</i>	6.00	18.00	7.166	3.00	3.00
149	นางแย้ม	<i>Clerodendrum viscosum Vent.</i>	6.00	18.00	7.166	2.00	3.00
282	ตุ้ม	<i>M. hirsuta (Rubiaceae),</i>	3.00	7.00	2.787	1.50	0.30
283	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata (Anacardiaceae),</i>	4.00	8.00	3.185	0.50	2.10
284	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	4.00	8.00	3.185	1.00	2.00
285	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	4.00	9.00	3.583	0.50	2.50
286	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	13.00	5.175	1.50	3.00
287	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.50	15.00	5.971	1.00	3.50
288	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	15.00	5.971	5.00	4.00
289	ส้มป่อง	<i>Garcinia cowa Roxb.</i>	4.00	15.00	5.971	2.00	2.00

ตารางผนวกที่ 15 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรง พุ่ม(m)
290	ส้มป่อย	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	4.50	15.00	5.971	2.50	2.50
291	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	18.00	86.00	34.236	12.00	8.00
292	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	10.00	3.981	1.50	2.00
293	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	17.00	6.768	1.50	3.00
293	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	10.00	3.981	1.00	2.50
295	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma acidum</i>	2.50	11.00	4.379	1.00	2.10
296	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	24.00	71.00	28.264	18.00	8.00
297	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.50	27.00	10.748	1.50	3.50
298	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	65.00	25.876	14.50	4.00
299	ตึง	<i>D.tuberculatus</i>	6.00	100.00	39.809	15.00	4.00
300	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	6.00	2.389	0.50	2.50
301	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	7.00	2.787	0.50	2.10
302	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	6.00	2.389	0.50	2.50
303	ตุ้ม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	2.50	10.00	3.981	0.80	2.00
304	มะมื่น	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.ex A. Benn.	2.50	8.00	3.185	1.00	3.00
305	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	5.00	1.990	0.20	3.50
306	แสลงใจ	<i>Strychnos nux-vomica</i> (Strychnaceae)	3.50	10.00	3.981	0.50	2.50
307	เข็มป่า	<i>Pavetta tomentosa</i> Roxb.ex Sm.	2.00	5.00	1.990	0.50	4.00
308	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.990	0.30	2.00
309	สารภี	<i>Anneslea fragrans</i>	3.00	8.00	3.185	0.50	4.00
310	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	10.00	46.00	18.312	8.00	8.00
311	แะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	8.00	50.00	19.904	4.00	2.00
312	กาวตุง		-	23.00	9.156	2.50	-
313	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i> .	4.00	13.00	5.175	2.00	4.00
314	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	12.00	4.777	4.20	3.50
315	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.194	1.50	2.00
316	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	4.00	1.592	0.50	1.10
317	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	3.00	1.194	0.20	2.40
318	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.50	13.00	5.175	3.00	2.50

ตารางผนวกที่ 15 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรง พุ่ม(m)
319	ตูม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	6.00	8.00	3.185	3.00	4.00
320	ตูม	<i>M. hirsuta</i> (Rubiaceae),	6.00	26.00	10.350	4.00	4.00
321	เหมือดโคโค	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	38.00	15.127	1.00	2.20
322	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	20.00	82.00	32.643	15.00	8.50
323	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.50	6.00	2.389	1.00	4.00
324	เหมือด	<i>M. Scutellatum</i>	1.50	9.00	3.583	0.30	3.00
325	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	3.00	8.00	3.185	0.30	4.00
326	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.50	99.00	39.411	0.18	2.00
327	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	3.50	8.00	3.185	0.50	2.50
328	ชะเงาะ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	2.00	5.00	1.990	1.00	2.00
329	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.50	11.00	4.379	0.30	2.50
330	ชะมอก		1.50	4.00	1.592	0.50	2.00
331	ชะมอก		2.50	3.00	1.194	2.00	3.00
332	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	15.00	83.00	33.041	2.00	6.00
333	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	4.00	1.592	0.50	2.00
334	สีเลื้อยหลวง	<i>Casearia grewiaefolia</i> Vent.	2.50	9.00	3.583	1.00	2.50
335	มะกั่ม	<i>Canarium subulatum</i>	13.00	124.00	49.363	6.00	2.50
336	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.50	8.00	3.185	1.00	8.00
337	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	3.00	28.00	11.146	1.00	2.00
338	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	12.00	47.00	18.710	7.00	3.00
339	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	7.00	2.787	1.00	8.00
340	เปา	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	7.00	33.00	13.137	2.00	2.10
341	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	23.00	9.156	1.50	4.50
342	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak.	12.00	23.00	9.156	4.00	3.50
343	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	2.00	6.00	2.389	0.20	
344	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.50	8.00	3.185	1.00	2.00
345	กาวดุก		19.00	25.00	9.952	1.00	2.50

ตารางผนวกที่ 16 แสดงข้อมูลไม้ชั้นล่าง แปลงวิจัย ในป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarps Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 390 – 393 เมตร

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงค(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
1	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	2.00	0.80
2	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
3	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.10	2.50	1.00
4	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	0.80	1.50	0.60
5	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
6	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.50	-	-
7	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
8	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.20	2.00	0.80
9	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
10	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
11	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.50	1.00
12	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
13	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
14	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
15	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	2.50	1.00
16	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.20	2.00	0.80
17	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.50	-	-
18	ติ่ง	<i>D. tuberculatus</i>	1.00	2.00	0.80
19	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.50	-	-
20	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	1.00	2.50	1.00
21	แงะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	0.80	0.80	0.32
22	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.70	0.80	0.32
23	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	3.00	-	-
24	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
25	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
26	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.50	1.00
27	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.00	0.80
28	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.70	1.00	0.40
29	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.80	1.00	0.40

ตารางผนวกที่ 16 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงคืบ(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
30	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	2.50	1.00
31	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	0.60	1.00	0.40
32	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	3.00	-	-
33	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
34	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
35	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
36	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
37	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.80	1.20	0.48
38	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.60	1.00	0.40
39	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
40	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.10	2.00	0.80
41	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	0.80	1.50	0.60
42	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.50	0.60
43	ตึง	<i>D. tuberculatus</i>	1.20	2.50	1.00
44	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.00	0.40
45	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.80	1.00	0.40
46	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.70	1.00	0.40
47	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
48	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
49	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.50	-	-
50	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
51	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
52	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
53	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.50	0.60
54	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
55	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.10	2.00	0.80
56	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.20	2.00	0.80
57	ยักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.00	1.50	0.60
58	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.80	1.00	0.40

ตารางผนวกที่ 16 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงคืบ(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
59	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.70	1.00	0.40
60	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
61	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.20	2.00	0.80
62	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.00	2.00	0.80
63	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	1.50	0.60
64	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
65	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
66	มะเกี๋ย	<i>Canariun subulatum</i>	1.00	2.00	0.80
67	เป่า	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	1.20	1.50	0.60
68	แฉะ	<i>Shorea obtusa</i> ,	1.10	2.00	0.80
69	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.60	2.00	0.80
70	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.80	2.00	0.80
71	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	1.50	0.60
72	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.10	1.50	0.60
73	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.20	1.00	0.40
74	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
75	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
76	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
77	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.50	0.60
78	ต้นเตี้ย	<i>M. Scutellatum</i>	1.10	1.00	0.40
79	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
80	มะเกี๋ย	<i>Canariun subulatum</i>	1.00	1.50	0.60
81	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	2.00	0.80
82	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.00	0.80
83	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.00	0.80
84	ตึง	<i>D. tuberculatus</i>	1.20	1.00	0.40
85	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-
86	สาบเสือ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	2.00	-	-

ตารางผนวกที่ 16 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงคืบ(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
87	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
88	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.50	0.60
89	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
90	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
91	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.00	0.40
92	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	1.00	0.40
93	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.00	0.80
94	มะเกี๋ม	<i>Canarium subulatum</i>	0.80	2.50	1.00
95	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	0.50	1.00	0.40
96	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
97	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
98	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
99	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
100	มะเกี๋ม	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.10	2.00	0.80
101	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.50	1.00
102	อี๊กหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	0.90	2.00	0.80
103	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
104	มะเกี๋ม	<i>Canarium subulatum</i>	0.50	1.50	0.60
105	อี๊กหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.00	1.00	0.40
106	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-
107	อี๊กหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.10	2.00	0.80
108	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	0.60	1.00	0.40
109	สาบเสือ	<i>Chromolaena oclorata</i>	2.00	-	-

ตารางผนวกที่ 17 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ชั้นล่าง (แปลงทดลอง C) ในป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarps Forest) ที่ระดับความสูง
จากน้ำทะเล 390 - 393 เมตร

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย	ความหนาแน่น	ความถี่			ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)
จืดดำ	27.000	0.006	13.000	2.077	1.080	24.771	86.667	26.000	1.199	9.310	60.080
เหียง	21.000	0.007	10.000	2.100	0.840	19.266	66.667	20.000	1.984	15.409	54.675
สาบเสือ	40.000	0.004	14.000	2.857	1.600	36.697	93.333	28.000	0.000	0.000	64.697
ตี่ง	3.000	0.050	2.000	1.500	0.120	2.752	13.333	4.000	1.509	11.718	18.470
แงะ	3.000	0.050	2.000	1.500	0.120	2.752	13.333	4.000	1.447	11.236	17.988
หนามแท่ง	2.000	0.075	1.000	2.000	0.080	1.835	6.667	2.000	1.654	12.841	16.676
ฮักหลวง	6.000	0.025	3.000	2.000	0.240	5.505	20.000	6.000	1.447	11.236	22.741
มะกึ่ม	5.000	0.030	3.000	1.667	0.200	4.587	20.000	6.000	1.571	12.199	22.786
เปา	1.000	0.150	1.000	1.000	0.040	0.917	6.667	2.000	1.240	9.631	12.548
ต้นเต้ม	1.000	0.150	1.000	1.000	0.040	0.917	6.667	2.000	0.827	6.421	9.338
รวม	109.000	0.546		17.701	4.360	100.000	333.333	100.000	12.877	100.000	300.000

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	33	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
2	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	34	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.
3	เขมหลวง	<i>Themeda arundinacea</i>	35	หญ้าคมบาง	<i>scleria</i> sp.
4	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	36	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
5	มะลิดิน	<i>Geophila repens</i>	37	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
6	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	38	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>
7	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	39	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>
8	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	40	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>
9	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	41	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>
10	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	42	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
11	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	43	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
12	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>	44	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
13	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	45	ยอดิน	<i>Morinda angustifolia</i>
14	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>	46	หญ้าเพด	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
15	บุกป่า	<i>Amorphophallus</i> sp	47	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
16	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>	48	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.
17	ผักหวานป่า	<i>Melicntha sauvis</i>	49	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
18	ตีนตุ๊ก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	50	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
19	มะกิม	<i>Canariun subulatum</i>	51	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
20	ขมิ้นตัน	<i>C.roscoeana</i>	52	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>
21	ขมิ้นตัน	<i>C.roscoeana</i>	53	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>
22	ขมิ้นตัน	<i>C.roscoeana</i>	54	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>
23	นางจู้วน้อย	<i>Habenria dantata</i>	55	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>
24	กระชายป่า	<i>Boesenbergia pandurata</i>	56	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
25	แก้มขาว	<i>Mussaenda sanderiana</i>	57	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>
26	แก้มขาว	<i>Mussaenda sanderiana</i>	58	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
27	ผักเผ็ดป่า	<i>Spilonthes acumella</i> Murr.	59	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
28	ผักเผ็ดป่า	<i>Spilonthes acumella</i> Murr.	60	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
29	ผักเผ็ดป่า	<i>Spilonthes acumella</i> Murr.	61	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
30	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>	62	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
31	ยอดิน	<i>Morinda angustifolia</i>	63	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.
32	หญ้าเพด	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	64	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้

ตารางผนวกที่ 18 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
65	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	97	หญ้าลิปเภา	<i>Lygodium flexuosum</i> Sw.
66	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	98	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
67	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	99	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
68	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	100	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
69	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	101	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
70	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	102	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
71	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	103	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
72	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>	104	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
73	หญ้ายากาย	<i>Eulalia siamensis</i>	105	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
74	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	106	อวาชาว	<i>Costus speciosus</i> (Koen) J.E. Smith
75	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	107	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
76	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	108	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
77	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	109	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.
78	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	110	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
79	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	111	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
80	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	112	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>
81	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	113	บุกป่า	<i>Amorphophallus</i> sp.
82	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	114	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>
83	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	115	ผักหวานป่า	<i>Melicntha sauvis</i>
84	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	116	ตีนตั่ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
85	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	117	มะกั้ม	
86	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	118	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
87	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	119	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
88	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	120	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
89	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	121	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.
90	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	122	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
91	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>	123	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
92	บุกป่า	<i>Amorphophallus</i> sp.	124	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>
93	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>	125	บุกป่า	<i>Amorphophallus</i> sp.
94	กระเจียวขาว	<i>Curcuma parviflora</i> Wall	126	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>
95	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	127	ผักหวานป่า	<i>Melicntha sauvis</i>
96	ขมิ้นต้น	<i>C.roscoeana</i>	128	ตีนตั่ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้

ตารางผนวกที่ 18 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
129	มะเกี๋ย	<i>Canarium subulatum</i>	161	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
130	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>	162	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
131	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>	163	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
132	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>	164	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
133	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>	165	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
134	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	166	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.
135	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>	167	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
136	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	168	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
137	กระเจียวขาว	<i>Curcuma parviflora</i> Wall	169	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>
138	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	170	บุกป่า	<i>Amorphophallus</i> sp.
139	ขมิ้นต้น	<i>C.roscoeana</i>	171	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>
140	หญ้าลิปเภา	<i>Lygondium flexuosum</i> .Sw.	172	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
141	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	173	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
142	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	174	กระเจียวขาว	<i>Curcuma parviflora</i> Wall
143	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	175	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
144	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	176	ขมิ้นต้น	<i>C.roscoeana</i>
145	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	177	หญ้าลิปเภา	<i>Lygondium flexuosum</i> .Sw.
146	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	178	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
147	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	179	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
148	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	180	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
149	อวาว	<i>Costus speciosus</i> (Koen) J.E. Smith	181	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
150	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>	182	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
151	หญ้ากาย	<i>Eulalia siamensis</i>	183	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
152	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	184	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
153	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	185	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
154	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	186	อวาว	<i>Costus speciosus</i> (Koen) J.E. Smith
155	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	187	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.
156	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	188	กกสามเหลี่ยม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
157	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	189	เพิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
158	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	190	ถั่วแปบ	<i>Dolichos lablab</i>
159	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz	191	บุกป่า	<i>Amorphophallus</i> sp.
160	หญ้าสามคม	<i>scleria</i> sp.	192	ผักกาดขี้หมา	<i>Crassocephalum crepidiodes</i>

ตารางผนวกที่ 18

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
193	ผักหวานป่า	<i>Melicntha saavis</i>
194	ตีนตุ้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
195	มะกึ่ม	<i>Canariun subulatum</i>
196	หญ้าไผ่	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
197	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
198	กระเจียวขาว	<i>Curcuma parviflora</i> Wall
199	ตีนตุ้งแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
200	ขมิ้นต้น	<i>C.roscoeana</i>
201	หญ้าลิปเภา	<i>Lygondium flexvosum</i> .Sw.
202	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
203	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
204	หญ้าตมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
205	ตีนตุ้งแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
206	ว่านนกคุ้ม	<i>Molinario latifolia</i> Herb.ex Kurz
207	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
208	หญ้าคมบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
209	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
210	อวชาว	<i>Costus specious</i> (Koen) J.E. Smith

ตารางผนวกที่ 19 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้น (แปลงวิจัยที่ D1) ในป่าเต็งรังแควะ (Deciduous dipterocarps Forest scrub type) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 520 – 541 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบ วงค์ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
01	แจะ	Shorea obtusa,	8.50	17.00	2.70	2.50
02	เกี่ยม	Canariun subulatum	3.80	13.00	2.07	1.50
03	เหมือดโคน	M. Scutellatum	4.50	23.00	3.66	0.60
04	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.00	13.00	2.07	1.00
05	เหมือดโคน	M. Scutellatum	3.00	14.00	2.22	1.50
06	เหียง	D. obtusifolius,	4.30	13.00	2.07	2.30
07	แจะ	Shorea obtusa,	3.50.	13.00	2.07	0.50
08	ตึง	D. tuberculatus	2.50	12.00	1.91	1.00
09	แจะ	Shorea obtusa,	2.50	12.00	1.91	1.00
10	ตึง	D. tuberculatus	8.00	31.00	4.93	2.50
11	แจะ	Shorea obtusa,	6.00	18.00	2.86	0.70
12	ตึง	D. tuberculatus	2.00	13.00	2.07	0.80
13	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	11.00	16.00	2.54	1.00
14	แจะ	Shorea obtusa,	5.00	21.00	3.34	0.50
15	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	3.00	10.00	1.59	1.00
16	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	19.00	3.02	1.50
17	ตึง	D. tuberculatus	4.00	13.00	2.07	2.50
18	ตึง	D. tuberculatus	3.00	19.00	3.02	0.70
19	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	8.00	1.27	1.00
20	ตึง	D. tuberculatus	2.00	13.00	2.07	0.70
22	เหมือดโคน	M. Scutellatum	3.00	19.00	3.02	2.00
23	เหมือดโคน	M. Scutellatum	2.30	9.00	1.43	1.00
24	เกี่ยม	Canariun subulatum	3.00	11.00	1.75	3.00
25	ตึง	D. tuberculatus	2.50	19.00	3.02	2.00
26	เหียง	D. obtusifolius,	16.00	78.00	12.42	10.00
27	มะนัะ	Terminalia chebula Retz. Syn.	3.00	8.00	1.27	0.50
28	ตึง	D. tuberculatus	2.00	13.00	2.07	0.40
29	ตึง	D. tuberculatus	7.00	25.50	4.06	3.00

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
30	ตี่ง	D. tuberculatus	13.00	56.00	8.92	5.30
31	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	32.50	5.18	1.40
32	ตี่ง	D. tuberculatus	2.60	20.00	3.19	0.60
33	แงะ	Shorea obtusa,	9.00	56.00	8.92	0.30
34	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	11.00	1.75	0.50
35	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	10.00	38.00	6.05	4.00
36	แงะ	D. obtusifolius,	11.00	34.00	5.41	1.00
37	เหมือดโคน	M. Scutellatum	3.50	14.00	2.23	1.20
38	แงะ	D. obtusifolius,	3.50	12.00	1.91	1.30
39	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	9.00	1.43	1.50
40	มะนะ	Terminalia chebula Retz. Syn.	3.00	11.00	1.75	1.80
41	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	14.00	51.50	8.20	1.20
42	ตี่ง	D. tuberculatus	4.20	19.00	3.03	1.30
43	แงะ	D. obtusifolius,	4.00	21.00	3.34	1.30
44	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	18.00	2.87	3.10
45	เหมือดโคน	M. Scutellatum	4.00	14.00	2.23	2.00
46	เหมือดโคน	M. Scutellatum	4.00	28.00	4.46	2.30
47	แงะ	Shorea obtusa,	5.50	24.00	3.82	1.20
48	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	8.30	37.00	5.89	2.60
49	เก็ม	Canarium subulatum	6.50	30.00	4.78	3.10
50	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	5.30	16.00	2.55	2.50
52	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.70	31.00	4.94	0.50
53	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	10.00	1.59	0.50
54	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	9.00	1.43	0.80
55	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	14.00	2.23	1.30
56	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	20.00	3.19	0.25
57	แงะ	Shorea obtusa,	7.30	30.00	4.78	1.30
58	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	20.00	3.19	1.00

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
59	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	25.00	3.98	1.30
60	แงะ	Shorea obtusa,	7.50	26.00	4.14	1.50
61	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	13.00	2.07	1.30
62	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	13.00	2.07	0.40
63	แงะ	Shorea obtusa,	2.10	10.00	1.59	0.40
64	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	26.00	4.14	0.50
65	แงะ	Shorea obtusa,	4.80	16.00	2.55	0.80
66	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	16.00	2.55	0.40
67	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	14.00	2.23	0.50
68	ตี่ง	D. tuberculatus	1.50	18.50	2.95	1.30
69	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	21.00	3.34	0.40
70	เหี้ยง	D. obtusifolius,	4.00	16.00	2.55	1.00
71	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.00	13.00	2.07	1.50
72	ตี่ง	D. tuberculatus	3.40	17.00	2.71	2.50
73	เหี้ยง	D. obtusifolius,	11.00	63.00	10.03	2.20
74	ตี่ง	D. tuberculatus	6.50	32.00	5.10	1.80
75	แงะ	Shorea obtusa,	8.00	32.00	5.10	2.50
76	ยางขาว	Dipterocarpus alatus Roxb	4.50	13.00	2.07	1.50
77	แงะ	Shorea obtusa,	5.50	25.00	3.98	0.77
78	เหี้ยง	D. obtusifolius,	11.50	67.00	10.67	2.30
79	แงะ	Shorea obtusa,	6.30	25.00	3.98	0.80
80	เหี้ยง	D. obtusifolius,	2.40	19.00	3.03	1.50
81	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	25.00	3.98	2.00
82	เก้ม	Canariun subulatum	3.00	75.00	11.94	2.00
83	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	28.00	4.46	2.50
84	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	6.00	33.00	5.26	2.80
85	เก้ม	Canariun subulatum	6.00	26.00	4.14	1.30
86	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	15.00	2.39	1.50
87	แงะ	Shorea obtusa,	6.40	22.00	3.50	2.50

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)
88	แฉะ	Shorea obtusa,	6.80	23.00	3.66	2.50
89	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	20.00	3.19	1.50
90	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	23.00	3.66	1.00
91	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	28.00	4.46	0.40
92	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	11.00	1.75	0.20
93	เปลือกผ้อย	-	4.00	12.00	1.91	0.40
94	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	28.00	4.46	0.50
95	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	20.00	3.19	2.00
96	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	17.00	2.71	1.00
97	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	14.00	2.23	0.40
98	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	21.00	3.34	0.60
99	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	19.00	3.03	1.50
319	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	16.00	2.55	1.50
320	ปี้เครือ	Dalergia velutrina Benth.	2.50	10.00	1.59	0.50
321	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	12.00	1.91	2.00
322	ทำควาย	Syzygium albiflorum	6.00	30.50	4.86	0.80
323	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	25.00	3.98	0.80
324	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	18.00	2.87	2.56
325	ตี่ง	D. tuberculatus	10.00	26.00	4.14	1.00
326	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	14.00	2.23	1.00
327	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	10.00	1.59	1.30
328	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	19.00	3.03	2.10
329	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	5.50	27.00	4.30	0.60
330	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	14.00	2.23	1.00
331	แฉะ	Shorea obtusa,	3.60	12.00	1.91	1.60
332	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	18.00	2.87	2.00
335	ตี่ง	D. tuberculatus	12.00	29.00	4.62	1.00
336	แฉะ	Shorea obtusa,	12.00	28.00	4.46	3.10
337	ตี่ง	D. tuberculatus	7.00	25.00	3.98	2.10

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)
338	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	20.00	3.19	0.50
339	แฉะ	Shorea obtusa,	4.20	23.00	3.66	0.50
340	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	22.00	3.50	0.30
341	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	8.50	24.00	3.82	0.20
342	มะนัง(สมอ)	Terminalia chebula Retz. Syn.	3.00	15.00	2.39	2.00
345	ตึง	D. tuberculatus	4.00	27.00	4.30	0.60
346	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	9.00	30.00	4.78	1.50
347	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	27.00	4.30	1.50
348	ตึง	D. tuberculatus	2.50	16.00	2.55	1.00
349	แฉะ	Shorea obtusa,	6.50	26.00	4.14	1.50
350	ก้อม้น	Lithocarpus elegans	4.00	11.00	1.75	1.00
351	เหมือดโคน	M. Scutellatum	4.00	19.00	3.03	1.00
352	แฉะ	Shorea obtusa,	12.00	27.00	4.30	3.30
353	ตึง	D. tuberculatus	12.00	34.00	5.41	0.50
354	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	11.00	1.75	0.50
355	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii	6.00	25.00	3.98	2.00
356	ตึง	D. tuberculatus	4.00	24.00	3.82	1.10
357	ตึง	D. tuberculatus	2.50	14.00	2.23	2.00
358	เหียง	D. obtusifolius,	12.00	41.00	6.53	1.00
359	แฉะ	Shorea obtusa,	8.00	32.00	5.10	2.10
360	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.50	25.00	3.98	1.00
361	ตึง	D. tuberculatus	3.00	18.00	2.87	1.00
362	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	24.00	3.82	0.50
363	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	15.00	2.39	1.50
364	ตึง	D. tuberculatus	3.10	14.00	2.23	0.50
365	แฉะ	Shorea obtusa,	8.00	24.00	3.82	0.50
366	ชักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.50	7.50	1.19	0.40
367	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	14.00	2.23	2.00

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
368	ห้า	Syzygium albiglorum	12.00	23.00	3.66	1.50
369	เฒะ	Shorea obtusa,	6.00	15.00	2.39	0.80
370	เฒะ	Shorea obtusa,	8.00	24.00	3.82	3.30
371	อีกลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	8.00	28.00	4.46	1.00
372	ตึง	D. tuberculatus	2.00	11.00	1.75	0.25
373	อีกลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.50	16.00	2.55	1.00
374	เฒะ	Shorea obtusa,	6.00	27.00	4.30	1.00
375	เฒะ	Shorea obtusa,	3.00	11.00	1.75	2.00
376	เฒะ	Shorea obtusa,	8.00	20.00	3.19	1.50
377	เฒะ	Shorea obtusa,	6.00	14.00	2.23	2.00
378	เฒะ	Shorea obtusa,	10.00	34.00	5.41	1.50
379	ตึง	D. tuberculatus	4.00	21.00	3.34	1.30
380	เฒะ	Shorea obtusa,	6.00	24.00	3.82	0.50
381	เฒะ	Shorea obtusa,	4.00	22.00	3.50	1.00
382	เฒะ	Shorea obtusa,	3.00	10.00	1.59	2.00
383	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	25.00	3.98	1.00
384	เฒะ	Shorea obtusa,	4.00	11.00	1.75	1.00
385	ตึง	D. tuberculatus	3.00	22.00	3.50	0.50
386	อีกลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	8.00	28.00	4.46	3.00
387	เฒะ	Shorea obtusa,	8.00	33.00	5.26	1.00
388	ตึง	D. tuberculatus	4.00	20.00	3.19	3.00
389	ตึง	D. tuberculatus	10.00	40.00	6.37	1.00
390	เฒะ	Shorea obtusa,	4.00	8.00	1.27	1.50
391	เหมือดโคน	M. Scutellatum	4.00	26.00	4.14	3.00
392	อีกลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.50	9.00	4.14	1.00
393	เฒะ	Shorea obtusa,	4.00	15.00	1.43	2.00
394	ตึง	D. tuberculatus	8.00	20.00	2.39	1.00
395	เฒะ	Shorea obtusa,	10.00	30.00	3.19	3.00
396	เฒะ	Shorea obtusa,	8.00	30.00	4.78	1.50

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
397	ตี่ง	D. tuberculatus	8.00	22.00	4.78	2.00
398	แ่งะ	Shorea obtusa,	6.00	17.00	3.50	1.00
399	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	16.00	2.71	0.80
400	แ่งะ	Shorea obtusa,	6.00	18.00	2.55	0.50
401	แ่งะ	Shorea obtusa,	6.00	28.00	2.87	2.00
402	แ่งะ	Shorea obtusa,	4.00	14.00	4.46	1.00
403	แ่งะ	Shorea obtusa,	10.00	22.00	2.23	1.50
404	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	15.00	3.50	1.00
405	แ่งะ	Shorea obtusa,	4.00	22.00	2.39	1.50
406	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	11.00	22.00	3.50	8.00
407	แ่งะ	Shorea obtusa,	5.00	11.00	3.50	0.50
408	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii	10.00	43.00	1.75	6.50
409	แ่งะ	Shorea obtusa,	4.00	16.00	6.85	2.00
410	เกี่ยม	Canariun subulatum	3.00	11.00	2.55	0.50
411	แ่งะ	Shorea obtusa,	6.00	16.00	1.75	2.00
412	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	11.00	2.55	2.00
413	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	18.00	1.75	0.40
414	แ่งะ	Shorea obtusa,	3.00	21.00	2.87	1.00
415	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	21.00	3.34	2.00
416	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	20.00	3.34	0.40
417	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	21.00	3.19	3.00
418	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	10.00	3.34	0.50
419	แ่งะ	Shorea obtusa,	3.00	22.00	1.59	1.00
420	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	23.00	3.50	2.00
421	แ่งะ	Shorea obtusa,	5.00	18.00	3.66	2.00
422	แ่งะ	Shorea obtusa,	1.80	9.00	2.87	1.70
423	เหมือดโคน	M. Scutellatum	3.00	10.00	1.43	1.00
424	แ่งะ	Shorea obtusa,	4.00	18.00	1.59	4.00
425	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	13.00	2.87	1.00

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
426	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	12.00	2.07	1.20
427	เก็ม	Canarium subulatum	4.00	99.00	1.91	1.00
428	เก็ม	Canarium subulatum	5.00	23.00	15.76	1.50
429	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	42.00	3.66	3.00
430	ตี่ง	D. tuberculatus	7.00	25.00	6.69	2.00
431	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	16.00	3.98	2.50
432	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	12.00	2.55	0.50
433	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	28.00	1.91	3.00
541	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	12.00	39.00	4.46	2.00
542	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.00	16.00	6.21	1.00
543	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	22.00	2.55	1.80
544	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	24.00	3.50	1.30
545	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	11.00	3.82	1.00
546	เหียง	D. obtusifolius,	10.00	25.00	1.75	0.50
547	แงะ	Shorea obtusa,	7.00	21.00	3.98	4.00
548	แงะ	Shorea obtusa,	13.00	58.00	3.34	1.00
549	ตี่ง	D. tuberculatus,	8.00	19.00	9.24	2.00
550	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	14.00	3.03	0.20
551	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	42.00	2.23	2.00
552	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	18.00	6.69	0.40
553	ห้าควาย	Syzygium albiflorum	3.00	9.00	2.87	0.50
554	ห้าควาย	Syzygium albiflorum	4.00	6.00	1.43	1.00
555	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	17.00	0.96	1.00
556	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	19.00	2.71	0.80
559	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	19.00	3.03	1.00
560	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	22.00	3.03	1.00
561	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	14.00	3.50	0.40
562	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	27.00	2.23	1.00
563	เนื้อเหนียว	Lophopetalum wallichii Kurz	3.00	18.00	4.30	1.00

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่งแรก (m)
564	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	16.00	2.87	0.40
565	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	17.00	2.55	2.00
566	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	13.00	2.71	1.00
567	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	26.00	2.71	1.50
568	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	13.00	2.07	0.50
569	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	12.00	4.14	1.00
570	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	8.00	2.07	0.50
571	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	13.00	1.91	0.50
572	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	22.00	1.27	2.00
573	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	11.00	2.07	0.50
574	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	7.00	3.50	0.50
575	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	17.00	1.75	1.00
576	แฉะ	Shorea obtusa,	10.00	24.00	1.12	3.00
577	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	16.00	2.71	0.50
578	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	19.00	3.82	1.50
579	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	12.00	2.55	0.50
580	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	9.00	3.03	0.40
581	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	21.00	1.91	1.00
582	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	19.00	1.43	0.50
583	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	10.00	31.00	3.34	5.00
584	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.00	23.00	3.03	0.50
585	แฉะ	Shorea obtusa,	16.00	65.00	4.94	4.00
586	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	16.00	3.66	2.00
587	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	14.00	10.35	1.00
589	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	11.00	2.55	1.00
590	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	23.00	2.23	1.00
591	ไผ่น้ำ	Vitex glabrata R . Br.	5.00	21.00	1.75	1.00
592	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	20.00	3.66	0.50
593	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	10.00	25.00	3.34	1.50

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่งแรก (m)
594	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	15.00	3.19	1.50
595	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	2.50	3.98	0.40
596	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	9.00	2.39	2.00
597	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	2.50	0.40	0.30
598	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.30	11.50	1.43	2.00
599	ตี่ง	D. tuberculatus	5.30	10.00	0.40	2.20
600	แงะ	Shorea obtusa,	4.20	8.00	1.83	0.80
601	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	8.00	1.59	0.80
602	เหี้ยง	D. obtusifolius,	4.00	7.50	1.27	2.60
603	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	6.50	1.27	1.60
604	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	5.00	1.19	0.80
605	แงะ	Shorea obtusa,	8.00	22.00	1.04	3.10
606	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	5.50	0.80	0.40
607	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	5.00	3.50	0.30
608	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	7.00	0.88	0.50
609	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	4.50	0.80	1.30
610	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	4.00	1.12	0.60
611	ยางขาว	Dipterocarpus alatus Roxb	4.00	7.50	0.72	1.50
612	ยางขาว	Dipterocarpus alatus Roxb	3.50	6.00	0.64	0.80
613	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	7.00	1.19	1.50
614	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	5.00	0.96	0.80
615	เหี้ยง	D. obtusifolius,	4.00	7.00	1.12	2.30
616	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	7.00	0.80	2.40
617	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	6.00	1.12	0.50
618	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	4.50	1.12	0.30
620	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	16.00	0.96	2.50
621	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	10.00	0.72	1.20
622	แงะ	Shorea obtusa,	1.80	10.00	2.55	0.30
623	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	9.00	1.59	1.00

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)
624	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	8.30	1.59	1.20
625	เหมือดโคน	M. Scutellatum	4.00	7.50	1.43	1.60
626	ตึง	D. tuberculatus	1.80	3.00	1.32	0.20
627	แฉะ	Shorea obtusa,	2.10	5.00	1.19	1.50
628	ตึง	D. tuberculatus	4.00	9.00	0.48	1.00
629	ตึง	D. tuberculatus	2.60	7.00	0.80	1.00
631	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	8.00	1.43	2.50
632	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.30	9.00	1.12	0.60
633	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.50	7.00	1.27	1.00
634	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	6.00	1.43	0.70
635	ตึง	D. tuberculatus	2.30	6.00	1.12	1.20
636	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	6.00	0.96	1.80
637	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	7.00	0.96	1.60
638	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.50	4.00	0.96	1.40
639	แฉะ	Shorea obtusa,	2.10	4.50	1.12	2.00
640	แฉะ	Shorea obtusa,	2.80	5.00	0.64	1.50
641	เหียง	D. obtusifolius,	2.30	4.00	0.72	0.30
642	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	17.00	0.80	3.50
643	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	7.50	0.64	1.30
644	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.90	4.00	2.71	0.40
645	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	7.50	40.00	1.19	3.50
646	ตึง	D. tuberculatus	1.60	3.50	0.64	0.60
647	ตึง	D. tuberculatus	3.50	7.50	6.37	1.00
648	แฉะ	Shorea obtusa,	3.20	5.00	0.56	1.50
649	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.30	3.00	1.19	1.00
650	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.50	7.00	0.80	1.60
651	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	7.00	0.48	1.20
652	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	9.00	1.12	0.70
653	แฉะ	Shorea obtusa,	3.30	3.50	1.12	0.70

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)
654	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	4.00	1.43	0.70
655	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	12.00	0.56	1.80
656	ตี่ง	D. tuberculatus	8.00	27.00	0.64	3.50
657	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	8.00	1.91	1.00
658	แสลงใจ	Strychnos nux-vomica (Strychnaceae)	4.00	9.00	4.30	0.70
659	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.50	8.00	1.27	1.00
660	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	12.00	1.43	2.50
661	แฉะ	Shorea obtusa,	6.50	18.00	1.27	1.20
662	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	7.00	1.91	2.00
663	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	10.00	2.87	1.20
664	ตี่ง	D. tuberculatus	8.00	25.00	1.12	2.00
665	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	8.00	1.59	0.50
666	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	9.50	3.98	1.50
667	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	7.00	1.27	1.80
668	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	10.00	1.51	2.10
669	แฉะ	Shorea obtusa,	2.10	7.00	1.12	1.30
670	แฉะ	Shorea obtusa,	2.10	6.00	1.59	0.60
671	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	1.12	1.30
672	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	6.00	0.96	1.20
673	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	5.00	0.96	1.00
674	อีกลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.50	5.00	0.96	1.50
675	เหียง	D. obtusifolius,	1.60	4.00	0.80	0.30
676	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	11.00	0.80	2.50
677	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.60	2.50	0.64	0.70
678	แฉะ	Shorea obtusa,	4.60	11.00	1.75	2.00
679	ตี่ง	D. tuberculatus	3.60	8.00	0.40	2.50
680	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	7.00	1.75	1.50
681	แฉะ	Shorea obtusa,	5.50	12.00	1.27	2.00
682	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	5.00	1.12	0.70

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
683	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	8.00	1.91	0.80
684	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	4.00	0.80	1.00
685	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	8.00	1.27	1.00
686	แฉะ	Shorea obtusa,	1.50	3.00	0.64	0.40
687	มะนัะ	Terminalia chebula Retz. Syn.	2.00	4.00	1.27	0.50
688	มะนัะ	Terminalia chebula Retz. Syn.	2.50	15.00	0.48	1.20
689	เหี้ยง	D. obtusifolius,	1.50	11.00	0.64	1.10
690	เหี้ยง	D. obtusifolius,	2.30	6.00	2.39	0.80
691	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.80	1.00	1.75	1.30
692	เหี้ยง	D. obtusifolius,	2.30	3.00	0.96	0.40
693	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	9.00	0.16	1.60
694	แฉะ	Shorea obtusa,	8.00	21.00	0.48	4.50
695	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	1.43	0.30
697	แฉะ	Shorea obtusa,	8.30	24.00	3.34	4.30
698	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	9.00	0.96	1.50
699	แฉะ	Shorea obtusa,	4.30	9.00	3.82	1.30
700	ตุ้มควาย	Anthocephalus chinensis	2.50	11.00	1.43	1.30
701	เหี้ยง	D. obtusifolius,	6.50	21.00	1.43	2.00
702	แฉะ	Shorea obtusa,	1.50	3.00	1.75	0.80
703	มะเกี๋ม	Canariun subulatum	3.50	4.00	3.34	0.80
704	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.30	2.00	0.48	0.10
705	เหี้ยง	D. obtusifolius,	3.30	8.00	0.64	2.50
706	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	5.00	0.32	1.60
707	เหี้ยง	D. obtusifolius,	4.50	8.00	1.27	2.50
708	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	7.00	0.80	1.30
709	แฉะ	Shorea obtusa,	4.50	11.00	1.27	2.50
710	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	7.00	1.12	0.80
711	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	10.00	1.75	2.50
712	แฉะ	Shorea obtusa,	2.30	3.50	1.12	0.80

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
713	ตี่ง	D. tuberculatus	1.50	2.50	1.59	0.40
715	แงะ	Shorea obtusa,	2.20	3.50	0.56	0.40
716	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	10.00	0.40	1.80
717	เหี้ยง	D. obtusifolius,	4.00	8.00	0.56	1.20
718	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	8.00	1.59	2.00
719	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	12.00	1.27	1.20
720	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.60	4.50	1.27	0.30
721	แงะ	Shorea obtusa,	8.00	20.00	1.91	2.50
722	แงะ	Shorea obtusa,	3.70	5.00	0.72	0.50
723	เหี้ยง	D. obtusifolius,	3.50	6.00	3.19	0.30
724	แงะ	Shorea obtusa,	1.50	10.00	0.80	0.10
725	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	4.50	0.96	0.80
726	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	3.00	1.59	0.40
727	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	8.50	0.72	1.40
728	เหมือดโคน	M. Scutellatum	4.50	10.00	0.48	1.40
730	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.50	7.00	1.35	0.50
731	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	3.50	7.00	1.59	0.40
732	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	7.50	1.12	1.30
733	แงะ	Shorea obtusa,	1.50	1.00	1.12	0.10
734	แงะ	Shorea obtusa,	3.80	8.00	1.19	1.80
735	ตี่นนก	Viter limoniifolia	4.00	7.00	0.16	1.00
736	เหี้ยง	D. obtusifolius,	18.00	3.00	1.27	1.00
737	เหี้ยง	D. obtusifolius,	25.00	5.00	1.12	1.20
738	เหมือดโคน	M. Scutellatum	2.30	5.00	0.48	0.40
739	เหี้ยง	D. obtusifolius,	3.00	5.00	0.80	1.30
740	เหี้ยง	D. obtusifolius,	3.20	7.00	0.80	1.40
741	แงะ	Shorea obtusa,	2.20	4.00	0.80	1.50
742	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	10.00	1.12	0.60
743	เหี้ยง	D. obtusifolius,	7.50	19.00	0.64	2.80

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
744	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.80	8.00	1.59	2.30
745	เนื้อเหนียว	Lophopetalum wallichii Kurz	2.50	4.00	3.03	0.50
746	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	5.50	1.27	1.00
747	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	0.64	3.00
748	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	19.50	0.88	2.00
750	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	3.50	1.27	2.30
751	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	4.50	3.11	0.50
752	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.80	3.50	0.56	0.10
753	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	2.50	0.72	0.40
754	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	8.00	0.56	0.60
755	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.30	8.00	0.40	0.50
756	เหียง	D. obtusifolius,	2.30	2.50	1.27	0.20
757	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	9.00	1.27	1.30
759	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	12.00	0.40	0.80
760	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	5.00	1.43	1.30
761	แงะ	Shorea obtusa,	9.00	28.00	1.91	4.50
762	แงะ	Shorea obtusa,	3.20	10.00	0.80	2.00
763	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.50	3.00	4.46	0.30
764	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.00	1.59	0.60
765	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	5.00	0.48	0.80
766	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	6.00	0.48	0.50
767	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	2.00	0.80	0.50
768	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	12.00	0.96	2.50
770	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	14.00	0.32	0.60
771	ตี่ง	D. tuberculatus	3.30	9.00	1.91	1.30
772	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	6.00	2.23	1.60
773	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	9.50	1.43	1.00
774	ตี่ง	D. tuberculatus	2.10	14.00	0.96	0.80
775	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	14.00	1.51	1.50

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
776	อีกลาง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	5.00	20.00	2.23	3.50
777	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	8.00	2.23	1.20
778	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	6.00	3.19	2.30
779	ตี่ง	D. tuberculatus	5.50	13.00	1.27	2.00
780	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	3.00	0.96	1.20
781	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	2.07	0.60
782	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	7.00	0.48	1.60
783	ตี่ง	D. tuberculatus	3.20	7.00	0.64	2.00
784	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	4.50	1.12	0.50
785	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	6.00	1.12	1.50
786	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	4.00	0.72	1.00
787	อีกลาง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.20	7.00	0.96	0.80
788	อีกลาง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.30	7.00	0.64	1.50
789	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	12.00	1.12	0.80
790	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	1.12	0.80
791	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	11.00	1.91	2.30
792	แงะ	Shorea obtusa,	6.50	14.00	0.96	1.60
793	แงะ	Shorea obtusa,	7.00	15.00	1.75	2.30
794	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	6.00	2.23	1.60
795	แงะ	Shorea obtusa,	2.80	13.00	2.39	1.00
796	ยางขาว	Dipterocarpus alatus Roxb	2.50	4.00	0.96	0.80
797	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	12.00	2.07	1.20
798	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	3.00	0.64	0.50
799	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.40	5.00	1.91	1.20
800	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	11.00	0.48	2.30
801	แงะ	Shorea obtusa,	2.20	7.00	0.80	1.60
802	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	9.00	1.75	2.00
803	แงะ	Shorea obtusa,	1.60	1.45	1.12	0.50
804	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	9.00	1.43	1.50

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
805	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	6.00	0.23	1.50
806	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	1.50	1.43	0.80
807	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	1.30	0.96	1.70
808	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	1.50	0.24	0.80
809	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	6.00	0.21	2.00
810	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	3.00	0.24	0.40
811	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	6.00	0.96	1.00
812	แงะ	Shorea obtusa,	6.50	16.00	0.48	1.80
813	เหี้ยง	D. obtusifolius,	2.00	9.00	0.96	1.10
814	เหี้ยง	D. obtusifolius,	2.50	6.00	2.55	0.50
815	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.00	2.50	1.43	1.30
816	แงะ	Shorea obtusa,	1.60	1.50	0.96	0.50
817	แงะ	Shorea obtusa,	3.80	9.50	0.40	2.00
818	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	6.00	0.24	1.50
819	เหี้ยง	D. obtusifolius,	3.50	12.00	1.51	1.10
820	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	13.00	0.96	2.30
821	แงะ	Shorea obtusa,	6.50	25.00	1.91	1.80
822	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	6.00	2.07	1.50
823	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	3.00	3.98	0.80
824	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	3.00	0.96	1.10
825	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	4.00	0.48	0.40
826	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	4.00	0.48	1.00
827	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	7.00	0.64	1.20
828	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	3.00	0.64	0.50
829	แงะ	Shorea obtusa,	2.10	3.00	1.12	1.10
830	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	5.00	0.48	0.40
831	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.50	3.50	0.48	1.00
832	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	6.00	0.80	2.00
833	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	9.00	0.56	2.00

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)
834	แงะ	Shorea obtusa,	7.50	12.00	0.96	4.00
835	อีกลหวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.00	4.00	1.43	0.80
836	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	4.00	1.91	2.30
837	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	6.00	0.64	1.10
838	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	12.00	0.64	2.10
839	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	11.00	0.96	2.30
840	แงะ	Shorea obtusa,	5.60	9.00	1.91	1.80
841	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	6.00	1.75	0.60
842	แงะ	Shorea obtusa,	3.20	8.00	1.43	2.50
843	ตี่ง	D. tuberculatus	3.20	6.00	0.96	1.20
844	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	3.00	1.27	0.50
845	ตะมอคงคอง	-	2.00	3.00	0.96	1.25
846	อีกลหวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.00	4.00	0.48	0.60
847	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	7.00	0.48	1.10
848	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	0.64	1.50
849	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	10.00	1.12	2.30
850	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	13.00	0.64	1.20
851	ตี่ง	D. tuberculatus	1.70	3.00	1.59	0.30
852	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	13.00	2.07	1.10
853	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	4.00	0.48	1.00
854	เหียง	D. obtusifolius,	1.50	3.00	2.07	0.30
855	อีกลหวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.50	13.00	0.64	1.20
856	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	7.00	0.48	1.50
857	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	8.00	2.07	2.10
858	เหมือดโค่น	M. Scutellatum	3.50	11.00	1.12	2.20
859	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	9.00	1.27	2.30
860	แงะ	Shorea obtusa,	1.80	3.50	1.75	0.40
861	ตี่ง	D. tuberculatus	1.50	3.50	1.43	0.70

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)
862	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	3.00	0.56	1.10
863	มะขามป้อม	Phyllanthus emblica,	1.60	2.00	0.56	0.40
864	มะขามป้อม	Phyllanthus emblica,	2.50	4.00	0.48	0.70
865	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.50	4.00	0.32	1.80
866	มะขามป้อม	Phyllanthus emblica,	4.00	12.00	0.64	1.30
867	ฮักขาว	Holigama longitolia(Anacardiaceae),	3.00	11.00	0.64	0.80
868	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	11.00	1.91	1.60
869	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	6.00	1.75	2.50
871	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.50	4.00	1.75	1.60
872	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	6.00	0.96	2.00
873	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	14.00	0.64	2.30
875	ตี่ง	D. tuberculatus	7.00	21.00	0.96	2.50
876	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	4.50	2.23	1.60
877	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.80	3.00	3.34	0.50
878	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	10.00	0.72	1.60
879	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	15.00	0.48	2.00
880	ตี่ง	D. tuberculatus	1.70	4.00	1.59	0.60
881	แฉะ	Shorea obtusa,	4.50	5.00	2.39	1.50
882	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	8.00	0.64	1.70
883	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	8.00	0.80	1.30
884	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	5.00	1.27	1.60
885	แฉะ	Shorea obtusa,	2.30	3.00	1.27	0.30
886	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	10.00	0.80	2.00
887	ตี่ง	D. tuberculatus	2.40	4.00	0.48	0.50
888	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.50	3.50	1.59	0.40
889	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	4.50	0.64	0.60
890	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.30	7.00	0.56	1.50
891	ตี่ง	D. tuberculatus	2.80	3.00	0.72	0.40

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
892	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	3.00	1.12	1.30
893	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	5.00	0.48	1.60
894	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	2.50	0.48	1.50
895	แฉะ	Shorea obtusa,	4.50	10.00	0.80	1.50
896	เหียง	D. obtusifolius,	2.30	3.00	0.40	0.30
897	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	2.00	1.59	1.20
898	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	8.00	0.48	1.40
899	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	5.00	0.32	1.80
900	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	5.00	1.27	2.50
901	ต้ง	D. tuberculatus	2.30	3.00	0.80	0.40
902	ต้ง	D. tuberculatus	6.00	11.00	0.80	2.30
903	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	0.48	2.00
904	ต้ง	D. tuberculatus	1.60	3.50	1.75	0.50
905	ต้ง	D. tuberculatus	2.30	3.50	1.27	1.00
906	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	4.50	0.56	1.20
907	แฉะ	Shorea obtusa,	1.50	3.00	0.56	1.30
908	ต้ง	D. tuberculatus	6.00	10.00	0.72	0.80
909	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	3.00	0.48	1.50
911	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	4.00	1.59	2.00
912	ต้ง	D. tuberculatus	7.00	21.50	0.48	3.00
913	แฉะ	Shorea obtusa,	5.50	17.00	0.64	1.30
914	ต้ง	D. tuberculatus	4.50	8.00	3.42	1.40
915	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	12.00	2.71	1.80
916	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	12.50	1.27	1.60
917	ต้ง	D. tuberculatus	2.30	4.00	1.91	1.50
918	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	13.00	1.99	2.30
919	เหียง	D. obtusifolius,	5.30	18.00	0.64	1.60
920	ต้ง	D. tuberculatus	3.50	7.00	2.07	1.50

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
921	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.30	19.00	2.87	2.50
922	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	9.00	1.12	1.70
923	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	10.00	3.03	1.80
924	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	8.00	1.43	1.80
925	เหมือดโคน	M. Scutellatum	1.80	2.00	1.59	0.30
926	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	2.50	1.27	0.20
927	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	9.00	0.32	2.50
928	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	4.50	0.40	0.80
929	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	4.00	1.43	1.50
930	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	11.00	0.72	1.80
931	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	4.50	0.64	0.50
932	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.00	4.00	1.75	0.80
933	ห้ำ	Syzygium albiflorum	3.50	2.00	0.72	1.80
934	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	3.00	0.64	1.60
935	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	4.50	0.32	0.60
936	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	3.00	0.48	1.80
937	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	4.50	0.72	1.80
938	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	7.00	0.48	1.80
939	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	14.00	0.72	2.30
940	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	6.00	1.12	1.50
941	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.30	7.00	2.23	0.50
942	แงะ	Shorea obtusa,	5.30	12.00	0.96	2.00
943	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	3.50	1.12	2.30
944	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	14.00	1.91	3.00
945	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	9.00	0.56	1.59
946	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	11.00	2.23	1.20
947	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	7.00	1.43	1.30
948	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	3.00	1.75	0.40

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคัม (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
949	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.60	3.50	1.12	0.30
950	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	4.00	0.48	1.00
951	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	8.00	0.56	1.50
952	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	16.00	0.64	3.00
953	แงะ	Shorea obtusa,	5.50	8.00	1.27	1.50
954	ตี่ง	D. tuberculatus	4.60	8.50	2.55	2.00
955	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	3.00	1.27	1.56
956	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	5.50	9.50	1.35	2.50
957	แงะ	Shorea obtusa,	2.60	4.50	0.48	1.30
958	เหมือดโค่น	M. Scutellatum	4.00	4.00	1.51	1.40
959	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.00	15.00	0.72	2.30
960	ตี่ง	D. tuberculatus	6.50	18.00	0.64	2.00
961	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.50	5.00	2.39	0.40
962	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	11.00	2.87	0.50
963	แงะ	Shorea obtusa,	2.10	3.00	0.80	0.70
964	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	4.00	1.75	1.50
984	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	8.00	0.48	1.70
985	ตี่ง	D. tuberculatus	2.80	4.50	0.64	1.60
986	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	1.27	1.60
988	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	12.00	0.72	1.40
989	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	3.00	0.64	0.70
990	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	7.00	1.91	2.00
991	ตี่ง	D. tuberculatus	4.30	14.00	0.48	2.50
992	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	10.00	1.12	2.00
993	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	4.00	2.23	1.80
994	ตี่ง	D. tuberculatus	7.50	15.00	1.59	2.50
995	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	4.00	0.64	1.30
996	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	2.39	1.80

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
997	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	8.00	0.64	1.60
998	แ่งะ	Shorea obtusa,	2.50	4.00	1.27	1.40
999	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	7.00	14.00	1.27	2.00
1000	ห้ำดง	Syzygium clauiflorum	3.00	7.00	0.64	1.60
1001	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	2.23	2.30
1002	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	10.00	1.12	1.70
1003	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	4.00	1.27	0.40
1004	แ่งะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	1.59	1.40
1005	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.20	13.00	0.64	2.00
1006	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	27.00	0.64	2.50
1007	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	20.50	2.07	1.60
1008	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	12.00	4.30	0.80
1009	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	3.00	3.26	0.50
1010	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	10.00	1.91	1.70
1011	แ่งะ	Shorea obtusa,	6.00	11.50	0.48	1.50
1012	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	16.00	1.59	2.50
1013	ตี่ง	D. tuberculatus	6.50	4.00	1.83	1.10
1014	แ่งะ	Shorea obtusa,	1.80	4.00	2.55	1.55
1015	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	5.00	0.64	1.40
1016	แ่งะ	Shorea obtusa,	3.60	5.00	0.64	2.00
1017	เหี้ยง	D. obtusifolius,	3.20	3.50	0.80	1.10
1019	แ่งะ	Shorea obtusa,	1.80	5.00	0.80	1.20
1020	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	3.00	0.56	0.50
1021	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.20	3.50	0.80	0.80
1022	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	3.00	0.48	0.80
1023	แ่งะ	Shorea obtusa,	3.00	4.50	0.56	1.20
1024	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	5.00	0.48	1.40
1025	แข่งกวาง	Wendlandia tinctoria	3.50	51.00	0.72	1.50
1026	แข่งกวาง	Wendlandia tinctoria	6.50	18.00	0.79	0.80

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1027	ตี่ง	D. tuberculatus	7.00	6.00	8.12	0.80
1028	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	7.00	2.87	2.00
1029	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	0.96	1.20
1030	แกะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	1.12	1.00
1031	แกะ	Shorea obtusa,	3.00	5.00	0.64	1.50
1032	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	4.50	0.64	1.50
1033	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.80	3.00	0.80	1.10
1035	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	6.00	0.72	1.80
1036	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	3.00	0.48	1.10
1037	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	6.00	0.96	1.50
1038	แกะ	Shorea obtusa,	3.50	4.50	0.48	1.60
1039	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	3.00	0.96	1.60
1040	แกะ	Shorea obtusa,	7.00	16.80	0.72	2.50
1041	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	5.00	0.48	2.00
1042	แกะ	Shorea obtusa,	2.50	4.00	2.68	0.80
1043	แกะ	Shorea obtusa,	2.50	3.00	0.80	2.00
1044	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	4.00	0.64	2.00
1045	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	3.50	0.48	1.50
1046	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	0.64	1.10
1047	แกะ	Shorea obtusa,	5.00	4.00	0.56	1.20
1048	แกะ	Shorea obtusa,	8.00	8.00	0.64	1.70
1049	แกะ	Shorea obtusa,	4.00	26.50	0.64	1.60
1050	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	6.00	1.27	0.23
1051	แกะ	Shorea obtusa,	2.00	4.00	4.22	1.00
1052	แกะ	Shorea obtusa,	3.50	3.00	0.96	0.50
1053	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	6.00	4.00	0.64	1.10
1054	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	11.20	0.48	2.30
1055	ตี่ง	D. tuberculatus	1.60	7.00	0.64	1.40

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1056	ตี่ง	D. tuberculatus	1.90	2.00	1.78	0.40
1057	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	2.00	1.12	0.80
1058	เหี้ยง	D. obtusifolius,	1.50	4.50	0.32	0.30
1059	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.50	3.00	0.32	1.30
1060	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.50	12.00	0.72	1.60
1061	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	10.00	0.48	0.60
1062	แงะ	Shorea obtusa,	5.50	70.00	1.91	2.50
1063	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.50	8.00	1.59	1.40
1064	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.00	5.00	11.15	0.25
1065	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	2.50	1.27	0.30
1066	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.80	2.00	0.80	0.30
1067	ตี่ง	D. tuberculatus	6.50	3.00	0.40	0.20
1068	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	13.60	0.32	2.50
1069	เหี้ยง	D. obtusifolius,	6.00	25.00	0.48	0.80
1070	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	8.00	2.17	2.00
1071	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	27.00	3.98	2.60
1072	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	4.00	1.27	1.60
1073	แงะ	Shorea obtusa,	1.70	4.50	4.30	1.60
1074	ตี่ง	D. tuberculatus	7.80	7.00	0.64	1.50
1075	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	20.40	0.72	1.80
1076	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	3.00	1.12	1.50
1077	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	5.00	3.25	2.00
1078	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	3.00	0.48	0.80
1079	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	8.00	0.80	1.80
1080	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	3.50	0.48	1.10
1081	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	4.00	1.27	1.00
1082	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	3.50	0.56	1.30
1083	ตี่ง	D. tuberculatus	3.60	3.50	0.64	0.80

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1084	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	3.00	0.56	1.30
1085	เหียง	D. obtusifolius,	2.30	8.00	0.56	1.60
1086	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.50	5.00	0.48	1.10
1087	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	1.27	1.30
1088	ตี่ง	D. tuberculatus	7.00	4.50	0.80	0.60
1089	แงะ	Shorea obtusa,	8.00	12.00	0.64	3.00
1090	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	17.20	0.72	0.45
1091	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	13.00	1.91	1.10
1092	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	13.00	2.74	1.20
1093	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	12.00	2.07	0.80
1094	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	4.50	2.07	2.00
1095	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	5.00	1.91	1.30
1096	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	0.72	0.30
1097	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	8.00	0.80	2.20
1098	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	7.00	0.64	1.20
1099	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	6.00	1.27	0.30
1100	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	6.00	1.12	2.30
1101	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.90	7.50	0.96	1.30
1102	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	2.00	0.96	0.80
1103	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	5.00	1.19	1.20
1104	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	5.00	0.32	0.30
1105	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	13.00	0.80	1.60
1106	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	13.00	0.80	0.50
1107	ตี่ง	D. tuberculatus	3.20	6.00	2.07	2.50
1108	แงะ	Shorea obtusa,	1.70	5.00	2.07	0.50
1109	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	4.00	0.96	0.80
1110	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	3.00	0.80	1.00
1111	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	11.20	0.64	2.50

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1112	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	0.48	1.50
1113	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	5.00	1.78	0.23
1114	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	4.00	0.64	1.20
1115	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	4.00	0.80	2.00
1116	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	5.00	0.64	0.80
1117	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	6.00	0.64	1.50
1118	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	7.00	0.80	2.00
1119	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	4.00	0.96	0.80
1120	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.00	3.00	1.12	0.60
1121	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	7.00	0.64	1.70
1122	ตี่ง	D. tuberculatus	1.70	5.00	0.48	0.17
1123	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	3.00	1.12	1.60
1124	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	5.00	0.80	2.00
1125	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	7.00	3.50	0.48	1.40
1126	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	25.60	0.80	1.50
1127	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	3.00	0.56	1.30
1128	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	4.00	4.08	1.30
1129	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	3.00	0.48	1.60
1130	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	2.00	0.64	2.30
1131	แงะ	Shorea obtusa,	7.00	4.00	0.48	1.10
1132	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	16.80	0.32	1.30
1133	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	5.50	0.64	2.00
1134	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	5.00	2.68	2.00
1135	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	7.00	0.88	1.60
1136	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	4.00	0.80	0.60
1137	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	4.00	1.12	1.80
1138	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.50	14.00	0.64	2.50
1139	แงะ	Shorea obtusa,	5.50	5.00	0.64	2.50

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1140	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	8.00	2.23	1.60
1141	แฉะ	Shorea obtusa,	5.50	8.00	0.80	2.00
1142	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	15.00	1.27	2.00
1143	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	5.00	1.27	2.50
1144	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	5.00	2.39	1.30
1145	ชักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	6.00	3.50	0.80	1.60
1146	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	5.00	0.80	2.00
1147	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	3.50	0.56	0.60
1148	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	5.00	0.80	0.30
1149	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	4.00	0.56	1.00
1150	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.00	0.80	2.00
1151	ต้ง	D. tuberculatus	6.00	10.00	0.64	2.50
1152	ต้ง	D. tuberculatus	6.00	16.00	0.80	2.30
1153	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.00	13.20	1.59	0.25
1154	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	3.50	2.55	1.50
1155	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	2.00	2.10	0.80
1156	ต้ง	D. tuberculatus	1.70	13.00	0.56	0.20
1157	ต้ง	D. tuberculatus	4.50	4.00	0.32	0.40
1158	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	6.00	2.07	0.80
1159	ต้ง	D. tuberculatus	1.70	7.00	0.64	1.70
1160	ชักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	5.00	0.96	0.40
1161	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	4.00	1.12	1.70
1162	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	20.40	0.80	0.40
1163	ต้ง	D. tuberculatus	4.50	3.00	0.64	1.10
1164	ต้ง	D. tuberculatus	6.00	5.00	3.25	2.00
1165	ต้ง	D. tuberculatus	6.00	11.00	0.48	2.30
1166	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	32.50	0.80	0.31
1167	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	8.00	1.75	2.00

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1168	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	2.10	4.00	5.18	1.70
1169	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	3.00	8.00	1.27	2.50
1170	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	3.00	7.00	0.64	2.50
1171	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	1.80	3.00	1.27	1.10
1172	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	4.00	8.00	1.12	2.00
1173	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	1.70	3.00	0.48	0.18
1174	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	4.00	8.00	1.27	2.00
1175	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	5.50	10.00	0.48	1.80
1177	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	4.00	8.00	1.27	2.00
1178	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	6.00	9.00	1.59	1.21
1179	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	2.50	4.00	1.27	1.30
1180	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	1.80	4.00	1.43	0.80
1181	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	2.50	3.00	0.64	2.30
1182	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	6.00	8.00	0.64	1.70
1183	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	5.00	8.00	0.48	2.30
1184	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	6.00	23.60	1.27	1.60
1185	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	6.00	9.00	1.27	3.50
1186	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	4.50	4.50	3.76	0.50
1187	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	5.00	10.00	1.43	3.00
1188	เป่า	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.50	7.00	0.72	1.70
1189	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	2.50	7.00	1.59	1.10
1190	เป่า	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.00	4.00	1.12	2.00
1191	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	3.00	3.00	1.12	0.70
1192	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	4.50	4.00	0.64	1.60
1193	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	6.00	7.00	0.48	1.50
1194	เป่า	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	4.00	8.00	0.64	1.40
1196	เป่า	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	6.00	14.00	1.12	3.00
1197	แงะ	<i>Shorea obtusa,</i>	1.60	4.00	1.27	0.50
1198	ต้ง	<i>D. tuberculatus</i>	4.50	15.00	2.23	0.70

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1199	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	3.00	0.64	0.50
1200	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	3.00	2.39	0.50
1201	ต้ง	D. tuberculatus	2.50	3.00	0.48	0.70
1202	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	8.00	0.48	2.00
1203	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	4.00	0.48	0.80
1204	หำดง	Syzygium albiflorum	4.00	10.00	1.27	1.80
1205	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	5.00	0.64	1.20
1206	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	8.00	1.59	2.30
1207	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	7.00	0.80	0.50
1208	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	10.00	1.27	0.50
1209	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	9.00	1.12	0.80
1210	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	4.00	1.59	0.50
1211	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	1.43	1.50
1212	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	3.00	0.64	0.25
1213	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	4.00	0.64	0.50
1214	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.00	12.40	0.48	1.80
1215	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	5.00	0.64	0.23
1216	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	10.00	1.98	1.80
1217	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	11.00	0.80	0.30
1218	ต้ง	D. tuberculatus	6.00	13.00	1.59	3.00
1219	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	3.00	1.75	1.60
1120	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	14.00	2.07	1.50
1221	เหมือดโคน	M. Scutellatum	5.00	8.00	0.48	1.10
1222	เหมือดโคน	M. Scutellatum	5.00	10.00	2.23	1.60
1223	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	4.50	1.27	0.35
1224	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	5.00	1.59	1.60
1225	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	7.00	5.00	0.72	0.80
1226	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	10.00	0.80	0.80

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1227	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	15.00	0.80	0.20
1230	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	3.00	1.59	1.20
1351	ต้ง	D. tuberculatus	6.50	8.00	2.39	1.35
1352	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	5.00	0.48	0.40
1353	ต้ง	D. tuberculatus	3.50	3.00	1.27	2.00
1355	ต้ง	D. tuberculatus	1.50	3.00	0.80	1.00
1356	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	10.00	0.48	0.80
1357	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	4.00	0.48	2.50
1358	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	4.00	0.00	0.30
1359	ต้ง	D. tuberculatus	6.00	17.20	0.64	1.50
1360	ต้ง	D. tuberculatusv	2.10	3.00	0.64	0.50
1361	ต้ง	D. tuberculatus	1.60	4.00	2.74	1.50
1362	ต้ง	D. tuberculatus	2.60	14.00	0.48	1.10
1363	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	10.00	0.64	0.50
1364	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	7.00	2.23	2.20
1365	ต้ง	D. tuberculatus	1.50	3.00	1.59	0.15
1366	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	5.00	1.12	1.30
1367	ต้ง	D. tuberculatus	2.50	5.00	0.48	0.60
1368	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	6.00	0.80	1.20
1369	สารภี	Mammea siamensis kosterm	3.50	5.00	0.80	1.60
1370	ต้ง	D. tuberculatus	7.00	13.80	0.96	0.60
1371	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	4.00	0.80	0.40
1372	ต้ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	2.20	0.50
1373	ต้ง	D. tuberculatus	2.10	4.00	0.64	0.80
1374	ต้ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	0.96	1.60
1375	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	2.50	0.64	0.50
1376	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	3.00	0.96	1.10
1377	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	12.00	0.40	2.80
1378	ต้ง	D. tuberculatus	2.10	6.00	0.48	1.60

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1379	แงะ	Shorea obtusa,	5.50	8.00	1.91	1.50
1380	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	7.00	0.96	1.20
1381	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	1.27	0.30
1382	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	4.50	1.12	0.55
1383	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	3.50	0.64	1.80
1384	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	6.00	0.72	0.60
1385	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	7.00	0.56	1.80
1386	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	7.00	0.96	1.50
1387	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	12.00	1.12	1.80
1388	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	6.00	1.12	1.60
1389	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	1.91	1.60
1390	แงะ	Shorea obtusa,	2.00	4.50	0.96	1.75
1391	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	5.00	1.27	0.70
1392	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	0.72	1.70
1393	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	5.00	0.80	0.30
1394	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.50	6.00	0.64	0.40
1395	แงะ	Shorea obtusa,	1.80	3.00	0.80	1.30
1396	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	4.00	0.96	1.30
1397	ตี่ง	D. tuberculatus	5.50	47.50	0.48	1.00
1398	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	14.80	0.64	0.40
1399	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	8.00	7.56	1.20
1400	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	4.00	2.36	0.40
1401	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	7.00	1.27	1.20
1402	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	3.50	0.64	0.40
1403	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	8.00	1.12	1.50
1404	แงะ	Shorea obtusa,	6.50	19.60	0.56	2.50
1405	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.50	5.00	1.27	1.20
1406	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	5.00	10.00	3.12	1.80

ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1407	ต้ง	D. tuberculatus	2.50	3.00	0.80	0.80
1408	จืดเตียม	-	7.00	15.20	1.59	0.30
1409	ต้ง	D. tuberculatus	1.50	3.00	0.48	0.80
1410	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	3.00	2.42	1.50
1411	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	16.00	0.48	0.50
1412	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	10.00	0.48	0.80
1413	ต้ง	D. tuberculatus	6.50	41.00	2.55	2.50
1414	ต้ง	D. tuberculatus	2.50	4.00	1.59	1.30
1415	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.00	5.00	6.53	1.50
1416	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	3.50	0.64	0.80
1417	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	8.00	0.80	1.80
1418	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	8.50	0.56	1.80
1419	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	7.00	1.27	1.20
1420	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.00	8.00	1.35	1.70
1421	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	7.00	1.12	2.30
1422	ต้ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	1.27	1.50
1423	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	3.00	1.12	1.20
1424	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	5.00	0.96	0.70
1425	ต้ง	D. tuberculatus	3.50	8.00	0.48	1.50
1426	แงะ	Shorea obtusa,	3.60	8.00	0.80	1.70
1427	ต้ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	1.27	1.30
1428	แงะ	Shorea obtusa,	1.80	4.00	1.27	0.80
1429	ต้ง	D. tuberculatus	5.00	10.00	0.64	1.80
1430	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	4.00	0.64	1.80
1431	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	12.80	1.59	1.50
1432	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	12.80	0.64	2.30
1433	ต้ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	2.04	0.80
1434	ต้ง	D. tuberculatus	3.50	4.00	2.04	1.20
1435	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	6.00	1.27	0.50

ตารางที่ (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึง กิ่งแรก(m)
1436	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	13.00	0.64	1.20
1437	แ่งะ	Shorea obtusa,	5.50	16.80	0.96	1.00
1438	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	12.80	2.07	1.00
1439	ตี่ง	D. tuberculatus	1.70	3.00	2.68	0.50
1440	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	6.00	15.00	2.04	0.70
1441	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	12.00	0.48	0.30
1442	แ่งะ	Shorea obtusa,	2.00	3.00	2.39	0.60
1443	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.00	10.80	1.91	1.00
1444	เหมือดโคน	M. Scutellatum	4.00	13.00	0.48	0.01
1445	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	5.00	10.00	1.72	1.20
1446	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	6.00	2.07	0.70
1447	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	11.20	1.59	0.60
1448	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	13.20	0.96	1.00
1449	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	8.00	1.78	0.30
1450	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	13.60	2.10	0.80
1451	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	2.00	1.27	1.00
1452	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	16.80	2.17	0.60
1453	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	16.00	0.32	0.50
1454	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	14.00	2.68	0.25
1455	เหียง	D. obtusifolius,	1.80	3.00	2.55	0.70
1456	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	10.40	2.23	1.00
1457	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	6.00	0.48	1.30

ตารางผนวกที่ 20 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ยืนต้น (แปลงทดลอง D) ในป่าเต็งรังแควะ (Deciduous dipterocarps Forest scrub type)
ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 520 -541 เมตร

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
แฉะ	352	0.004	22.00	16.000	14.08	36.629	88.000	20.561	9.335	3.201		60.390
เก็กม	9	0.174	3.00	3.000	0.36	0.937	12.000	2.804	26.697	9.154		12.894
เหมือด	19	0.082	5.00	3.800	0.76	1.977	20.000	4.673	10.676	3.661		10.311
ยางขาว	4	0.391	2.00	2.000	0.16	0.416	8.000	1.869	6.273	2.151		4.436
เปา	86	0.018	10.00	8.600	3.44	8.949	40.000	9.346	9.583	3.286		21.581
ตุ้มควาย	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	9.051	3.104		4.142
เหียง	70	0.022	15.00	4.667	2.8	7.284	60.000	14.019	10.391	3.563		24.866
ตึง	336	0.005	24.00	14.000	13.44	34.964	96.000	22.430	8.528	2.924		60.318
ตีนนก	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	5.761	1.975		3.014
แดง	5	0.313	2.00	2.500	0.2	0.520	8.000	1.869	16.621	5.699		8.088
มะนะ	5	0.313	2.00	2.500	0.2	0.520	8.000	1.869	25.424	8.718		11.107
ฮักหลวง	51	0.031	6.00	8.500	2.04	5.307	24.000	5.607	9.056	3.105		14.019
เปลือกฝอย	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	9.874	3.386		4.424

ตารางผนวกที่ 20 (ต่อ)

ชนิด พันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
ก้อมัน	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	9.051	3.104	4.142	
ห้าควาย	5	0.313	2.00	2.500	0.2	0.520	8.000	1.869	14.070	4.824	7.214	
ห้าดง	2	0.781	1.00	2.000	0.08	0.208	4.000	0.935	6.995	2.398	3.541	
หนิวเหนือ	2	0.781	1.00	2.000	0.08	0.208	4.000	0.935	18.925	6.489	7.632	
ไข่น้ำ	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	17.280	5.925	6.964	
ปี่เครือ	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	8.229	2.822	3.860	
มะขามป้อม	3	0.521	1.00	3.000	0.12	0.312	4.000	0.935	4.938	1.693	2.940	
แข่งกวาง	2	0.781	1.00	2.000	0.08	0.208	4.000	0.935	28.388	9.734	10.877	
สารภี	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	4.113	1.410	2.449	
ตะมอคงคอง	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	2.468	0.846	1.885	
แสลงใจ	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	7.406	2.539	3.578	
ฮักขาว	1.000	0.040	0.104	1.563	1.00	4.000	0.926	1.000	3.307	1.121	2.151	
จี่เตียม	1	1.563	1.00	1.000	0.04	0.104	4.000	0.935	12.507	4.289	5.327	
รวม	961	21.716		88.067	38.480	100.000	432.000	100.000	294.948	100.000	300.000	

ตารางผนวกที่ 21 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้นที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของป่าเต็งรังแควระ (Deciduous Dry Dipterocarp Forest scrub type) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 520 - 541 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
01	แงะ	Shorea obtusa,	8.50	17.00	2.71	2.50	4.50
02	เก็ก	Canarium subulatum	3.80	13.00	2.07	1.50	2.00
03	เหมือด	M. Scutellatum	4.50	23.00	3.66	0.60	2.00
04	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.00	13.00	2.07	1.00	1.30
05	เหมือด	M. Scutellatum	3.00	14.00	2.23	1.50	3.00
06	เหียง	D. obtusifolius,	4.30	13.00	2.07	2.30	3.20
07	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	13.00	2.07	0.50	2.00
08	ตึง	D. tuberculatus	2.50	12.00	1.91	1.00	2.00
09	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	12.00	1.91	1.00	2.00
10	ตึง	D. tuberculatus	8.00	31.00	4.94	2.50	5.00
11	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	18.00	2.87	0.70	4.00
12	ตึง	D. tuberculatus	2.00	13.00	2.07	0.80	1.30
13	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	11.00	16.00	2.55	1.00	6.00
14	แงะ	Shorea obtusa,	5.00	21.00	3.34	0.50	2.00
15	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	3.00	10.00	1.59	1.00	2.10
16	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	19.00	3.03	1.50	2.00
17	ตึง	D. tuberculatus	4.00	13.00	2.07	2.50	2.00
18	ตึง	D. tuberculatus	3.00	19.00	3.03	0.70	2.40
19	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	8.00	1.27	1.00	2.40
20	ตึง	D. tuberculatus	2.00	13.00	2.07	0.70	1.30
22	เหมือด	M. Scutellatum	3.00	19.00	3.03	2.00	2.00
23	เหมือด	M. Scutellatum	2.30	9.00	1.43	1.00	1.60
24	เก็ก	Canarium subulatum	3.00	11.00	1.75	0.30	2.20
25	ตึง	D. tuberculatus	2.50	19.00	3.03	2.00	2.00
26	เหียง	D. obtusifolius,	16.00	78.00	12.42	10.00	5.00
27	มะนัง	Terminalia chebula Retz. Syn.	3.00	8.00	1.27	0.50	2.10
28	ตึง	D. tuberculatus	2.00	13.00	2.07	0.40	2.00
29	ตึง	D. tuberculatus	7.00	25.50	4.06	3.00	2.00
30	ตึง	D. tuberculatus	13.00	56.00	8.92	5.30	4.00

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
31	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	32.50	5.18	1.40	2.00
32	ตี่ง	D. tuberculatus	2.60	20.00	3.18	0.60	4.00
33	แงะ	Shorea obtusa,	9.00	56.00	8.92	0.30	6.00
34	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	11.00	1.75	0.50	1.60
35	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	10.00	38.00	6.05	4.00	4.00
36	แงะ	Shorea obtusa,	11.00	34.00	5.41	1.00	4.20
37	เหมือด	M. Scutellatum	3.50	14.00	2.23	1.20	3.00
38	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	12.00	1.91	1.30	2.00
39	เหี้ยง	D. obtusifolius,	3.00	9.00	1.43	1.50	2.00
40	มะนะ	Terminalia chebula Retz. Syn.	3.00	11.00	1.75	1.80	2.50
41	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	14.00	51.50	8.20	1.20	4.00
42	ตี่ง	D. tuberculatus	4.20	19.00	3.03	1.30	2.00
43	แงะ	D. obtusifolius,	4.00	21.00	3.34	1.30	2.30
44	เหี้ยง	D. obtusifolius,	4.50	18.00	2.87	3.10	1.70
45	เหมือด	M. Scutellatum	4.00	14.00	2.23	2.00	2.00
46	เหมือด	M. Scutellatum	4.00	28.00	4.46	2.30	3.20
47	แงะ	Shorea obtusa,	5.50	24.00	3.82	1.20	3.20
48	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	8.30	37.00	5.89	2.60	4.50
49	เก็ม	Canarium subulatum	6.50	30.00	4.78	3.10	4.00
50	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	5.30	16.00	2.55	2.50	3.00
52	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.70	31.00	4.94	0.50	2.40
53	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	10.00	1.59	0.50	3.50
54	เหี้ยง	D. obtusifolius,	2.50	9.00	1.43	0.80	2.10
55	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	14.00	2.23	1.30	1.20
56	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	20.00	3.18	0.25	1.00
57	แงะ	Shorea obtusa,	7.30	30.00	4.78	1.30	4.00
58	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	20.00	3.18	1.00	1.70
59	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	25.00	3.98	1.30	2.00
60	แงะ	Shorea obtusa,	7.50	26.00	4.14	1.50	4.00

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ง(นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
61	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	13.00	2.07	1.30	3.10
62	ต้ง	D. tuberculatus	2.00	13.00	2.07	0.40	1.50
63	แงะ	Shorea obtusa,	2.10	10.00	1.59	0.40	2.40
711	ต้ง	D. tuberculatus	4.50	10.00	1.59	2.50	2.30
712	แงะ	Shorea obtusa,	2.30	3.50	0.00	0.80	2.10
713	ต้ง	D. tuberculatus	1.50	2.50	1.59	0.40	1.00
715	แงะ	Shorea obtusa,	2.20	3.50	0.56	0.40	2.00
716	ต้ง	D. tuberculatus	3.50	10.00	0.40	1.80	2.10
717	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	8.00	0.56	1.20	4.50
718	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	8.00	1.59	2.00	2.20
719	แงะ	Shorea obtusa,	4.00	12.00	1.27	1.20	2.00
720	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.60	4.50	1.27	0.30	1.00
721	แงะ	Shorea obtusa,	8.00	20.00	1.91	2.50	4.00
722	แงะ	Shorea obtusa,	3.70	5.00	0.72	0.50	2.10
723	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	6.00	3.18	0.30	2.40
724	แงะ	Shorea obtusa,	1.50	10.00	0.80	0.10	1.00
725	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	4.50	0.96	0.80	1.70
726	แงะ	Shorea obtusa,	2.50	3.00	1.59	0.40	1.50
727	ต้ง	D. tuberculatus	3.00	8.50	0.72	1.40	2.00
728	เหมือด	M. Scutellatum	4.50	10.00	0.48	1.40	2.50
730	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.50	7.00	1.35	0.50	2.20
731	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	3.50	7.00	1.59	0.40	2.00
732	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	7.50	1.11	1.30	2.00
733	แงะ	Shorea obtusa,	1.50	1.00	1.11	0.10	1.50
734	แงะ	Shorea obtusa,	3.80	8.00	1.19	1.80	2.00
735	ตีนนก	Viter limoniifolia	4.00	7.00	0.16	1.00	2.00
736	เหียง	D. obtusifolius,	18.00	8.00	1.27	1.00	8.00
737	เหียง	D. obtusifolius,	25.00	5.00	1.11	1.20	4.00
738	เหมือด	M. Scutellatum	2.30	5.00	0.48	0.40	2.00

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก (m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
739	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	5.00	0.80	1.30	5.50
740	เหียง	D. obtusifolius,	3.20	7.00	0.80	1.40	2.00
741	แงะ	Shorea obtusa,	2.20	4.00	0.80	1.50	2.00
742	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	10.00	1.11	0.60	2.10
743	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	19.00	0.64	2.80	2.80
744	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	8.80	8.00	1.59	2.30	6.00
745	เนื้อเหนียว	Lophopetalum wallichii Kurz.	2.50	4.00	3.03	0.50	1.60
746	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	5.50	1.27	1.00	2.30
747	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	0.64	3.00	2.20
748	แงะ	Shorea obtusa,	6.00	19.50	0.88	2.00	2.50
750	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	3.50	1.27	2.30	2.40
751	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	4.50	3.11	0.50	2.50
752	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.80	3.50	0.56	0.10	1.00
760	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	5.00	0.56	1.30	2.10
761	แงะ	Shorea obtusa,	9.00	28.00	0.00	4.50	5.50
762	แงะ	Shorea obtusa,	3.20	10.00	0.80	2.00	2.50
763	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.50	3.00	4.46	0.30	2.00
764	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.00	1.59	0.60	3.50
765	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	5.00	0.48	0.80	3.50
766	แงะ	Shorea obtusa,	3.00	6.00	0.48	0.50	2.50
767	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	2.00	0.80	0.50	1.40
768	แงะ	Shorea obtusa,	4.50	12.00	0.96	2.50	2.00
770	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	14.00	0.32	0.60	2.50
771	ตี่ง	D. tuberculatus	3.30	9.00	1.91	1.30	2.80
772	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	6.00	2.23	1.60	1.50
773	แงะ	Shorea obtusa,	3.50	9.50	1.43	1.00	1.50
774	ตี่ง	D. tuberculatus	2.10	14.00	0.96	0.80	1.60
775	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	14.00	1.51	1.50	4.00
776	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	5.00	20.00	2.23	3.50	4.00

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคอก (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
777	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	8.00	2.23	1.20	4.00
778	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	6.00	3.18	2.30	2.80
779	ตี่ง	D. tuberculatus	5.50	13.00	1.27	2.00	2.40
780	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	3.00	0.96	1.20	2.70
781	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	2.07	0.60	2.00
782	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	7.00	0.48	1.60	2.00
783	ตี่ง	D. tuberculatus	3.20	7.00	0.64	2.00	2.60
784	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	4.50	1.11	0.50	2.10
785	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	6.00	1.11	1.50	2.40
786	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	4.00	0.72	1.00	2.60
787	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.20	7.00	0.96	0.80	2.00
788	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.30	7.00	0.64	1.50	2.00
789	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	12.00	1.11	0.80	2.00
790	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	1.11	0.80	2.00
791	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	11.00	1.91	2.30	2.60
792	แฉะ	Shorea obtusa,	6.50	14.00	0.96	1.60	2.40
793	แฉะ	Shorea obtusa,	7.00	15.00	1.75	2.30	4.00
1100	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	6.00	2.39	2.30	2.50
1101	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.90	7.50	0.00	1.30	1.00
1102	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	2.00	0.96	0.80	1.80
1103	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	5.00	1.19	1.20	2.50
1104	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	5.00	0.32	0.30	3.00
1105	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	13.00	0.80	1.60	1.00
1106	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	13.00	0.80	0.50	2.10
1107	ตี่ง	D. tuberculatus	3.20	6.00	2.07	2.50	2.00
1108	แฉะ	Shorea obtusa,	1.70	5.00	2.07	0.50	1.00
1109	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	4.00	0.96	0.80	1.30
1110	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	3.00	0.80	1.00	1.50
1111	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	11.20	0.64	0.25	2.00

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง วง(นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
1112	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	0.48	1.50	2.00
1113	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	5.00	1.78	0.23	1.20
1114	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	4.00	0.64	1.20	1.00
1115	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	4.00	0.80	2.00	2.10
1116	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	5.00	0.64	0.80	2.00
1117	แฉะ	Shorea obtusa,	4.50	6.00	0.64	1.50	2.30
1118	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	7.00	0.80	2.00	2.00
1119	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	4.00	0.96	0.80	2.50
1120	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.00	3.00	1.11	0.60	3.00
1121	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	7.00	0.64	1.70	3.00
1122	ตี่ง	D. tuberculatus	1.70	5.00	0.48	1.70	1.00
1123	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	3.00	1.11	1.60	2.00
1124	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	5.00	0.80	2.00	4.00
1125	อี๊กหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	7.00	3.50	0.48	1.40	2.00
1126	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	25.60	0.80	1.50	2.00
1127	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	3.00	0.56	1.30	2.00
1128	ตี่ง	D. tuberculatus	2.30	4.00	4.08	1.30	2.40
1129	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	3.00	0.48	1.60	2.50
1130	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	2.00	0.64	2.30	4.30
1131	แฉะ	Shorea obtusa,	7.00	4.00	0.48	1.10	2.50
1132	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	16.80	0.32	1.30	2.40
1133	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	5.50	0.64	2.00	2.40
1134	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	5.00	2.68	2.00	2.50
1135	แฉะ	Shorea obtusa,	3.50	7.00	0.88	1.60	2.00
1136	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	4.00	0.80	0.60	2.30
1137	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	4.00	1.11	1.80	2.70
1138	อี๊กหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.50	14.00	0.64	2.50	3.10
1139	แฉะ	Shorea obtusa,	5.50	5.00	0.64	2.50	2.00
1140	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	8.00	2.23	1.60	2.00

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคอก (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงกิ่งแรก (m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
1141	แฉะ	Shorea obtusa,	5.50	8.00	0.80	2.00	2.40
1142	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	15.00	1.27	2.00	2.70
1143	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	5.00	1.27	2.50	2.50
1144	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	5.00	2.39	1.30	3.40
1145	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	6.00	3.50	0.80	1.60	2.00
1146	ตัง	D. tuberculatus	3.00	5.00	0.80	2.00	2.10
1147	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	3.50	0.56	0.60	2.50
1148	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	3.00	5.00	0.80	0.30	3.00
1149	ตัง	D. tuberculatus	5.00	4.00	0.56	1.00	2.80
1150	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.00	0.80	2.00	2.50
1151	ตัง	D. tuberculatus	6.00	10.00	0.64	2.50	1.30
1152	ตัง	D. tuberculatus	6.00	16.00	0.80	2.30	1.00
1153	เปา	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.00	13.20	1.59	0.25	1.60
1154	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	3.50	2.55	1.50	3.00
1155	ตัง	D. tuberculatus	5.00	2.00	2.10	0.80	1.00
1156	ตัง	D. tuberculatus	1.70	13.00	0.56	0.20	2.30
1157	ตัง	D. tuberculatus	4.50	4.00	0.32	0.40	4.00
1158	ตัง	D. tuberculatus	5.00	6.00	2.07	0.80	0.80
1159	ตัง	D. tuberculatus	1.70	7.00	0.64	1.70	2.00
1160	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	5.00	0.96	0.40	3.00
1161	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	4.00	1.11	1.70	1.50
1162	ตัง	D. tuberculatus	2.00	20.40	0.80	0.40	2.00
1163	ตัง	D. tuberculatus	4.50	3.00	0.64	1.10	2.30
1164	ตัง	D. tuberculatus	6.00	5.00	3.25	2.00	4.00
1165	ตัง	D. tuberculatus	6.00	11.00	0.48	2.30	2.40
1166	ตัง	D. tuberculatus	3.00	32.50	0.80	0.31	1.20
1167	ตัง	D. tuberculatus	2.00	8.00	1.75	0.20	2.30
1168	ตัง	D. tuberculatus	4	4.00	5.18	1.70	2.50
1169	ตัง	D. tuberculatus	3.00	8.00	1.27	2.50	2.00

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคอก (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
1170	แฉะ	Shorea obtusa,	3.00	7.00	0.64	2.50	1.00
1171	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	3.00	1.27	1.10	2.50
1172	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	8.00	1.11	2.00	4.00
1173	ตี่ง	D. tuberculatus	1.70	3.00	0.48	0.18	3.00
1174	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	1.27	2.00	2.00
1175	แฉะ	Shorea obtusa,	5.50	10.00	0.48	1.80	1.60
1177	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	8.00	1.27	2.00	2.60
1178	แฉะ	Shorea obtusa,	6.00	9.00	1.59	1.21	2.70
1179	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	4.00	1.27	1.30	1.00
1180	ตี่ง	D. tuberculatus	1.80	4.00	1.43	0.80	1.50
1181	แฉะ	Shorea obtusa,	2.50	3.00	0.64	2.30	4.00
1182	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	8.00	0.64	1.70	2.30
1183	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	8.00	0.48	2.30	2.50
1184	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	23.60	1.27	1.60	3.00
1185	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	9.00	1.27	3.50	2.40
1186	ตี่ง	D. tuberculatus	4.50	4.50	3.76	0.50	3.00
1187	แฉะ	Shorea obtusa,	5.00	10.00	1.43	3.00	2.10
1203	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	4.00	1.59	0.80	5.00
1204	ห้ำดง	Syzygium albiflorum	4.00	10.00	0.00	1.80	2.70
1205	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	5.00	0.64	1.20	2.10
1206	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	8.00	1.59	2.30	2.00
1207	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	7.00	0.80	0.50	2.30
1208	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	10.00	1.27	0.50	2.00
1209	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	9.00	1.11	0.80	1.30
1210	เหี้ยง	D. obtusifolius,	2.50	4.00	1.59	0.50	2.50
1211	แฉะ	Shorea obtusa,	4.00	4.00	1.43	1.50	1.30
1212	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	3.00	0.64	0.25	1.00
1213	แฉะ	Shorea obtusa,	2.00	4.00	0.64	0.50	2.30
1214	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.00	12.40	0.48	1.80	2.10
1215	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	5.00	0.64	0.23	1.10

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
1216	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	10.00	1.97	1.80	2.30
1217	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	11.00	0.80	0.30	4.00
1218	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	13.00	1.59	3.00	3.50
1219	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	3.00	1.75	1.60	4.50
1120	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	14.00	2.07	1.50	5.50
1221	เหมือด	M. Scutellatum	5.00	8.00	0.48	1.10	3.20
1222	เหมือด	M. Scutellatum	5.00	10.00	2.23	1.60	1.20
1223	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	4.50	1.27	0.35	2.30
1224	ตี่ง	D. tuberculatus	5.00	5.00	1.59	1.60	2.60
1225	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	7.00	5.00	0.72	0.80	2.00
1226	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.00	10.00	0.80	0.80	2.30
1227	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	15.00	0.80	0.20	2.60
1230	ตี่ง	D. tuberculatus	2.00	3.00	1.59	1.20	2.00
1351	ตี่ง	D. tuberculatus	6.50	8.00	2.39	1.35	2.00
1352	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	5.00	0.48	0.40	4.50
1353	ตี่ง	D. tuberculatus	3.50	3.00	1.27	2.00	2.50
1355	ตี่ง	D. tuberculatus	1.50	3.00	0.80	1.00	2.00
1356	ตี่ง	D. tuberculatus	4.00	4.00	0.48	0.80	0.60
1357	ตี่ง	D. tuberculatus	3.00	4.00	0.48	2.50	2.00
1358	แะ	Shorea obtusa,	2.30	4.00	0.00	0.30	1.30
1359	ตี่ง	D. tuberculatus	6.00	17.20	0.64	1.50	2.00
1360	ตี่ง	D. tuberculatus	2.10	3.00	0.64	0.50	3.10
1361	ตี่ง	D. tuberculatus	1.60	4.00	2.74	1.50	2.00
1362	ตี่ง	D. tuberculatus	2.60	14.00	0.48	1.10	1.00
1363	แะ	Shorea obtusa,	2.50	10.00	0.64	0.50	2.00
1364	แะ	Shorea obtusa,	4.00	7.00	2.23	2.20	1.50
1365	ตี่ง	D. tuberculatus	1.50	3.00	1.59	0.15	1.00
1366	แะ	Shorea obtusa,	3.50	5.00	1.11	1.30	2.40

ตารางผนวกที่ 21 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)	ขนาดทรงพุ่ม (m)
1367	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	5.00	0.48	0.60	2.00
1368	แ่งะ	Shorea obtusa,	3.00	6.00	0.80	1.20	2.00
1369	สาร์ภี	Mammea siamensis kosterm	3.50	5.00	0.80	1.60	2.00
1370	ตี่ง	D. tuberculatus	7.00	13.80	0.96	0.60	4.00
1371	แ่งะ	Shorea obtusa,	2.30	4.00	0.80	0.40	1.30
1372	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	2.20	0.50	1.80
1373	ตี่ง	D. tuberculatus	2.10	4.00	0.64	0.80	0.80
1374	ตี่ง	D. tuberculatus	2.50	6.00	0.96	1.60	2.10

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงค(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
1	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.30	2.00	0.796
2	เหียง	D. obtusifolius,	1.00	2.50	0.995
3	เหมือดโคน	M. Scutellatum	1.10	2.00	0.796
4	เหมือดโคน	M. Scutellatum	1.00	1.50	0.597
5	มะเกี๋ย	Canarium subulatum	1.50	2.00	0.796
6	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.00	2.00	0.796
7	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	1.40	2.50	0.995
8	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	1.50	0.597
9	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	1.50	0.597
10	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.30	2.00	0.796
11	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.20	2.00	0.796
12	แงะ	Shorea obtusa,	1.30	2.00	0.796
13	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	1.50	0.597
14	มะเกี๋ย	Canarium subulatum	1.40	2.00	0.796
15	มะเกี๋ย	Canarium subulatum	1.20	1.50	0.597
16	จืดดำ	Micromelum sp.	1.00	2.50	0.995
17	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.40	2.00	0.796
18	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.50	2.00	0.796
19	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.50	2.50	0.995
20	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.20	2.00	0.796
21	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.00	1.00	0.398
22	เหมือดโคน	M. Scutellatum	1.50	2.50	0.995
23	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.20	2.00	0.796
24	ปงเป้ง	Phoenix loureiri	1.00	10.00	3.981
25	มะนะ	Terminalia chebula Retz. Syn.	1.50	2.50	0.995
26	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.10	2.00	0.796
27	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.00	1.30	0.518
28	มะนะ	Terminalia chebula Retz. Syn.	1.10	2.00	0.796
29	เหียง	D. obtusifolius,	1.00	2.00	0.796

ตารางผนวกที่ 22 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงคืบ(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
30	เหียง	D. obtusifolius,	0.80	1.00	0.398
31	เหมือด	M. Scutellatum	0.50	1.00	0.398
32	เหมือดโคน	M. Scutellatum	1.00	2.00	0.796
33	เหมือดโคน	M. Scutellatum	1.10	2.00	0.796
34	แงะ	Shorea obtusa,	1.20	1.00	0.398
35	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	2.00	0.796
36	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.80	1.00	0.398
37	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.50	1.00	0.398
38	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.00	2.00	0.796
39	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.70	1.00	0.398
40	แงะ	Shorea obtusa,	0.80	2.00	0.796
41	ตี่ง	D. tuberculatus	1.20	2.50	0.995
42	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	2.00	0.796
43	แงะ	Shorea obtusa,	1.20	2.00	0.796
44	แงะ	Shorea obtusa,	0.80	2.50	0.995
45	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.50	1.00	0.398
46	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.20	1.00	0.398
47	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.00	0.80	0.318
48	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.80	2.00	0.796
49	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.70	1.00	0.398
50	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	0.50	1.00	0.398
51	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	0.90	1.00	0.398
52	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.00	2.00	0.796
53	มะกึ้ม	Canariun subulatum	1.20	2.00	0.796
54	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	2.00	0.796
55	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	1.00	0.398
56	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.80	2.00	0.796
57	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.70	1.00	0.398
58	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.20	1.00	0.398

ตารางผนวกที่ 22 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงคืบ(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
59	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.10	2.00	0.796
60	แงะ	Shorea obtusa,	1.20	2.50	0.995
61	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	2.00	0.796
62	ตี่ง	D. tuberculatus	0.80	2.00	0.796
63	ตี่ง	D. tuberculatus	0.70	1.00	0.398
64	แงะ	Shorea obtusa,	0.50	1.00	0.398
65	แงะ	Shorea obtusa,	1.20	1.00	0.398
66	มะเกี๊ยะ	Canariun subulatum	1.00	2.00	0.796
67	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.50	1.00	0.398
68	แงะ	Shorea obtusa,	0.80	1.00	0.398
69	แงะ	Shorea obtusa,	0.60	1.00	0.398
70	ตี่ง	D. tuberculatus	0.50	1.00	0.398
71	แงะ	Shorea obtusa,	0.40	1.50	0.597
72	แงะ	Shorea obtusa,	0.90	1.50	0.597
73	แงะ	Shorea obtusa,	0.40	2.00	0.796
74	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.50	2.00	0.796
75	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.80	2.00	0.796
76	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.90	1.00	0.398
77	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	0.50	2.00	0.796
78	แดง	Xylia xylocarpa var. kerrii ,	1.30	1.00	0.398
79	แงะ	Shorea obtusa,	1.40	2.00	0.796
80	แงะ	Shorea obtusa,	1.00	2.50	0.995
81	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.00	2.00	0.796
82	แงะ	Shorea obtusa,	1.10	2.00	0.796
83	แงะ	Shorea obtusa,	1.10	2.50	0.995
84	แงะ	Shorea obtusa,	0.80	2.00	0.796
85	แงะ	Shorea obtusa,	1.20	2.50	0.995
86	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.00	2.00	0.796
87	เหียง	D. obtusifolius,	0.80	2.00	0.796

ตารางผนวกที่ 22 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงค(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
88	เหียง	D. obtusifolius,	0.50	1.50	0.597
89	แฉะ	Shorea obtusa,	0.60	1.60	0.637
90	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	0.80	2.00	0.796
91	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.10	2.00	0.796
92	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.00	2.00	0.796
93	ตี่ง	D. tuberculatus	1.00	2.50	0.995
94	แฉะ	Shorea obtusa,	1.20	2.00	0.796
95	แฉะ	Shorea obtusa,	1.00	2.00	0.796
96	เป่า	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.10	2.00	0.796

ตารางผนวกที่ 23 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ชั้นล่าง (แปลงทดลอง D) ในป่าเต็งรังแคว (Deciduous dipterocarps Forest scrub type)
ที่ระดับความสูงจาก น้ำทะเล 520 -541 เมตร

ชนิด พันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
แฉะ	30.000	0.005	10.000	3.000	1.200	31.250	66.667	23.810	1.468	6.151		61.211
เกี่ยม	5.000	0.030	4.000	1.250	0.200	5.208	26.667	9.524	1.563	6.550		21.282
เปา	33.000	0.005	11.000	3.000	1.320	34.375	73.333	26.190	1.337	5.606		66.171
เหมือดโคน	6.000	0.025	3.000	2.000	0.240	6.250	20.000	7.143	1.509	6.325		19.718
ฮักหลวง	3.000	0.050	2.000	1.500	0.120	3.125	13.333	4.762	1.645	6.897		14.783
แดง	5.000	0.030	3.000	1.667	0.200	5.208	20.000	7.143	1.234	5.172		17.524
ตี่ง	5.000	0.030	2.000	2.500	0.200	5.208	13.333	4.762	1.482	6.212		16.182
เหียง	5.000	0.030	3.000	1.667	0.200	5.208	20.000	7.143	1.482	6.212		18.563
มะนัะ	2.000	0.075	2.000	1.000	0.080	2.083	13.333	4.762	1.852	7.763		14.608
จี้ดำ	1.000	0.150	1.000	1.000	0.040	1.042	6.667	2.381	2.057	8.621		12.043
ปงเป้ง	1.000	0.150	1.000	1.000	0.040	1.042	6.667	2.381	8.229	34.491		37.914
รวม	96.000	0.580		19.583	3.840	100.000	280.0000	100.000	23.857	100.000		300.000

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	32	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
2	หญ้ามอบาง	scleria sp.	33	หญ้าตีนนก	Eleusine indica
3	หญ้ามอบาง	scleria sp.	34	ยอติณ	Morinda angustifolia
4	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile	35	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
5	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	36	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
6	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	37	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
7	ขมิ้นต้น	C.roscoeana	38	น้ำนมขาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
8	นมวัว	Fissistigma latifolium Merr.	39	หญ้าปากควาย	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
9	หญ้าสามคม	scleria sp.	40	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
10	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile	41	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
11	หญ้ามอบาง	scleria sp.	42	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
12	ตีนตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	43	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
13	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	44	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
14	หญ้ามอบาง	scleria sp.	45	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
15	หญ้ามอบาง	scleria sp.	46	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
16	หญ้าสามคม	scleria sp.	47	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
17	ยอติณ	Morinda angustifolia	48	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
18	ผักกาดขี้หมา	Crassocephalum crepidiodes	49	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
19	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	50	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
20	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	51	แล้งคอแดง	Entada prusaetha DC
21	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	52	หญ้ามอบาง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
22	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	53	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
23	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	54	หญ้ามอบาง	scleria sp.
24	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	55	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
25	หญ้าสามคม	scleria sp.	56	ขมิ้นต้น	C.roscoeana
26	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	57	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
27	ขมิ้นต้น	C.roscoeana	58	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
28	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile	59	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
29	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	60	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
30	หญ้ามอบาง	scleria sp.	61	หญ้ามอบาง	scleria sp.
31	เฟิร์นตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	62	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith

ตารางผนวกที่ 24 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
63	เพรินตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	92	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
64	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	93	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
65	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	94	ตีนตั้ง	Cary copteris Floribunds
66	อวาชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	95	ตีนตั้ง	Cary copteris Floribunds
67	หญ้าขน	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	96	ตีนตั้ง	Cary copteris Floribunds
68	ขมิ้นต้น	C.roscoeana	97	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
69	ตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	98	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
70	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	99	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
71	ตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	100	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
72	ตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	101	อวาชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
73	ขมิ้นต้น	C.roscoeana	102	อวาชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
74	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	103	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
75	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	104	ขมิ้นต้น	C.roscoeana
76	แล้งคอแดง	Entada prusaetha DC	105	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
77	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall	106	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
78	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	107	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
79	หญ้าคมบาง	scleria sp.	108	แล้งคอแดง	Entada prusaetha DC
80	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	109	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
81	หญ้าคมบาง	scleria sp.	110	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
82	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	111	หญ้าคมบาง	scleria sp.
83	หญ้าคมบาง	scleria sp.	112	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
84	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall	113	ตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
85	หญ้าคมบาง	scleria sp.	114	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall
86	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	115	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
87	อวาชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	116	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
88	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	117	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
89	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	118	ตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
90	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall	119	ตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
91	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	120	ตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้

ตารางผนวกที่ 24 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
121	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	151	เคลือบตั้ง	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
122	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	152	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
123	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	153	ใบเล็ก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
124	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	154	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
125	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	155	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
126	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	156	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
127	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	157	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
128	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	158	อวชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
129	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	159	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
130	อังกาบเมือง	Barleria cristata	160	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
131	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	161	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
132	หญ้าคมบาง	scleria sp.	162	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
133	หญ้าคมบาง	scleria sp.	163	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
134	หญ้าคมบาง	scleria sp.	164	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
135	แล้งคอแดง	Entada prusaetha DC	165	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
136	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	166	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
137	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	167	อวชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
138	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	168	หญ้าคมบาง	scleria sp.
139	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	169	อวชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
140	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	170	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
141	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	171	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
142	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	172	อวชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
143	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	173	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
144	หญ้าคมบาง	scleria sp.	174	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
145	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile	175	อวชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
146	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	176	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
147	หญ้าคมบาง	scleria sp.	177	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
148	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	178	อวชาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
149	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	179	กระเจียวขาว	Curcuma parviflora Wall
150	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	180	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้

ตารางผนวกที่ 24 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
181	ขมิ้นต้น	C.roscoeana	211	หญ้าคมบาง	scleria sp.
182	หญ้าลิปภา	Lygondium flexvosum .Sw.	212	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
183	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	213	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
184	หญ้าคมบาง	scleria sp.	214	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
185	หญ้าคมบาง	scleria sp.	215	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
186	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	216	หญ้าคมบาง	scleria sp.
187	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	217	หญ้าคมบาง	scleria sp.
188	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	218	ขมิ้นต้น	C.roscoeana
189	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile	219	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
190	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	220	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
191	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	221	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
192	หญ้าคมบาง	scleria sp.	222	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
193	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	223	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
194	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	224	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
195	ว่านช้าง	Eulophia macrobulbon	225	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
196	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	226	หญ้าคมบาง	scleria sp.
197	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	227	หญ้าคมบาง	scleria sp.
198	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	228	หญ้าคมบาง	scleria sp.
199	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall	229	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
200	เลี้ยงคอแดง	Entada prusaetha DC	230	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall
201	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	231	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
202	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	232	หญ้าคมบาง	scleria sp.
203	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall	233	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
204	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall	234	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
205	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	235	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall
206	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	236	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
207	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith	237	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
208	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile	238	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
209	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall	239	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
210	หญ้าคมบาง	scleria sp.	241	กระเจียวขาว	Curcuma paruiflora Wall

ตารางผนวกที่ 24 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
242	อวขาว	Costus speciosus (Koen) J.E. Smith
243	อวขาว	Costus speciosus (Koen) J.E. Smith
244	กระเจียวขาว	Curcuma parviflora Wall
245	อวขาว	Costus speciosus (Koen) J.E. Smith
246	ขมิ้นแดง	C.roscoeana
247	อวขาว	Costus speciosus (Koen) J.E. Smith
248	อวขาว	Costus speciosus (Koen) J.E. Smith
249	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
250	หญ้าคมบาง	scleria sp.
251	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexuosum .Sw.
252	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
253	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
254	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
255	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
256	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
257	อวขาว	Costus speciosus (Koen) J.E. Smith
258	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
259	อวขาว	Costus speciosus (Koen) J.E. Smith
260	หญ้าถอดปล้อง	Equisetum debile
261	อวขาว	Costus speciosus (Koen) J.E. Smith

ตารางผนวกที่ 25 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้น (แปลงวิจัยที่ E1) ในป่าเต็งรังรุ่น 2 (Deciduous dipterocarps Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 390 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
100	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.50	15.00	5.97	0.60
101	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	14.50	5.77	2.00
102	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	9.00	3.58	2.00
103	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	14.50	5.77	2.10
104	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	6.00	28.00	11.15	3.00
105	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	19.00	7.56	4.20
106	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	22.00	8.76	1.50
107	มะกั่ม	<i>Canariun subulatum</i>	7.50	10.00	3.98	0.60
108	มะกั่ม	<i>Canariun subulatum</i>	4.00	16.00	6.37	0.80
109	มะกั่ม	<i>Canariun subulatum</i>	4.50	29.50	11.74	1.20
121	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	16.00	6.37	3.10
122	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	16.50	6.57	1.10
123	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	16.50	6.57	2.50
120	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	16.50	6.57	2.00
124	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.00	32.50	12.94	3.40
125	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	7.50	14.00	5.57	3.00
126	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.00	49.00	19.51	2.10
127	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	9.50	3.78	1.00
128	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.30	9.00	3.58	1.00
129	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	18.00	7.17	2.50
130	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	9.00	3.58	0.90
131	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	7.50	13.00	5.18	0.70
132	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	25.00	9.95	2.00
133	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	29.00	11.54	3.40
134	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.50	20.00	7.96	2.50
135	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	15.00	5.97	2.70
136	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.50	10.00	3.98	1.60
137	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	6.00	2.39	2.10
138	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.50	15.00	5.97	2.00
139	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	8.50	46.00	18.31	4.20

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
140	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	5.00	19.00	7.56	3.00
141	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	5.00	19.00	7.56	2.10
142	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	1.50	10.00	3.98	0.20
143	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	12.00	4.78	3.00
144	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	8.00	3.18	2.60
145	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	4.00	1.59	0.28
146	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	6.00	10.00	3.98	5.10
147	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	6.00	9.00	3.58	0.50
148	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	6.00	12.00	4.78	3.00
149	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	6.50	2.59	2.50
150	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.10	6.20	2.47	4.50
151	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	8.40	3.34	2.10
152	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	3.50	1.39	1.20
153	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	5.50	2.19	1.20
154	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.50	3.40	1.35	1.00
155	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	6.20	2.47	2.30
156	มะกิม	<i>Canariun subulatum</i>	3.00	4.60	1.83	1.90
157	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	3.60	1.43	1.00
158	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	4.30	1.71	2.00
159	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.50	6.20	2.47	2.10
160	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	6.80	2.71	2.00
161	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.50	3.70	1.47	1.50
162	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	8.00	3.18	0.16
163	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.50	3.00	1.19	0.30
164	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	5.00	1.99	0.80
165	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	9.50	3.78	2.30
166	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	5.90	2.35	3.50
167	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	4.00	6.80	2.71	0.80

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (เส้นรอบวงค (	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความสูงถึงกิ่ง
			m)	นิ้ว)	แรก(m)
169	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	6.60	2.63
170	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	6.00	6.80	2.71
171	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	1.40	3.00	1.19
172	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	4.50	1.79
173	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	5.90	2.35
174	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	6.00	2.39
175	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	8.00	3.18
176	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	5.00	4.00	1.59
177	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	5.80	2.31
178	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.20	6.70	2.67
179	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.19
180	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	5.50	2.19
181	ชะมวงเครือ	<i>Garcinia acuminata Planch</i>	4.50	4.20	1.67
182	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	4.00	1.59
183	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	3.00	1.19
184	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.30	3.00	1.19
185	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	5.00	1.99
186	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	3.60	1.43
187	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.40	1.35
188	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	6.50	2.59
189	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	8.20	3.26
190	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	7.60	3.03
191	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	7.00	2.79
192	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	4.50	1.79
193	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	4.60	1.83
194	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	4.00	1.59
195	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	3.00	1.19
196	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	5.00	1.99
197	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	5.20	2.07
198	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.70	5.80	2.31

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
199	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	4.00	1.59	1.10
200	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.30	3.00	1.19	2.00
201	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	5.60	2.23	1.40
203	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	3.00	1.19	1.10
204	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	6.00	2.39	3.20
205	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	4.50	1.79	2.40
206	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.30	4.00	1.59	1.20
207	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	8.50	9.00	3.58	3.20
208	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	4.00	1.59	3.10
209	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.50	3.00	1.19	1.10
210	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	3.00	1.19	0.20
211	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	5.00	4.00	1.59	0.80
212	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	5.80	2.31	2.00
213	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	5.20	2.07	1.50
214	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	3.00	1.19	0.10
215	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.35	3.20	1.27	0.20
216	มะกิม	<i>Canariun subulatum</i>	3.50	4.00	1.59	2.30
217	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	5.00	4.30	1.71	2.10
218	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	8.00	16.00	6.37	2.50
219	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.20	5.00	1.99	1.20
220	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	5.50	4.30	1.71	0.30
221	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	5.00	1.99	2.30
222	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	4.20	1.67	3.00
223	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.19	1.20
224	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	3.60	1.43	1.40
225	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	4.70	1.87	2.20
226	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.50	4.20	1.67	2.10
227	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.50	3.00	1.19	0.60
228	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.50	3.00	1.19	1.20
229	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	5.40	2.15	2.30

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
230	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	6.00	5.20	2.07	3.00
231	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	6.70	2.67	1.50
232	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	5.00	1.99	2.30
233	มะเกี๋ม	<i>Canarium subulatum</i>	6.50	7.20	2.87	2.50
234	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	5.00	1.99	2.00
235	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.50	3.00	1.19	0.60
236	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	5.40	2.15	2.80
237	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	5.80	2.31	3.40
238	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.50	6.00	2.39	1.20
239	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	6.90	2.75	2.20
240	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	4.00	1.59	0.90
241	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	4.00	1.59	0.60
242	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	8.70	3.46	0.45
243	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.50	8.00	3.18	3.00
244	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.50	3.00	1.19	0.50
245	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.50	4.30	1.71	2.10
246	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	2.20	4.20	1.67	1.40
247	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.19	1.00
248	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.19	1.20
249	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	5.40	2.15	3.20
250	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	5.80	2.31	2.60
251	ต้นเต้ม	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	5.00	1.99	0.80
252	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	8.00	3.18	2.30
253	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	3.00	1.19	0.50
254	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	3.80	1.51	0.20
255	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	10.00	3.98	2.30
256	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.50	6.40	2.55	0.50
257	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.50	3.00	1.19	0.30
258	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	8.20	3.26	0.62
259	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	10.00	3.98	0.56

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่งแรก(m)
260	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	8.20	3.26	2.50
261	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	3.00	1.19	1.00
262	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	4.00	1.59	2.30
263	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	4.60	1.83	1.00
264	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.40	3.20	1.27	1.20
265	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	6.70	2.67	0.68
266	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	5.60	2.23	1.20
267	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	4.30	1.71	2.50
268	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	3.00	1.19	0.40
269	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	3.00	1.19	1.30
270	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	2.80	1.11	1.00
271	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	3.00	1.19	0.30
272	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	5.40	1.19	0.40
273	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	9.60	1.59	2.60
274	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	4.00	5.97	2.20
275	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	8.00	1.19	1.00
276	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	4.00	1.19	0.90
277	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	6.00	1.59	2.00
278	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	4.00	5.97	1.50
279	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	8.60	1.19	2.90
280	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	3.20	1.19	0.30
281	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	6.00	1.59	1.20
282	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	1.40	5.97	2.50
283	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.60	5.00	1.19	0.60
284	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.50	3.20	1.19	0.12
285	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.20	4.20	1.59	1.30
286	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	3.40	5.97	0.30
287	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	8.20	1.19	2.50
288	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	8.20	1.19	0.26
289	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	9.00	1.59	0.31

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
290	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.10	3.20	5.97	2.00
291	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.80	3.20	1.19	0.62
292	จีดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	3.20	1.19	0.20
293	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	12.00	1.59	3.00
294	เต็ม	<i>Bischofia javanica</i> Bl.	1.35	3.20	5.97	0.50
295	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	10.20	1.19	2.00
296	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.50	6.00	1.19	0.20
297	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	4.80	1.59	1.20
299	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.20	5.50	2.19	1.40
300	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	3.20
301	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.90
302	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	0.60
303	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	3.10
306	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.26
307	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.60
308	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.50
309	มะกั่ม	<i>Canariun subulatum</i>	5.50	13.75	5.47	2.30
310	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	5.00	12.50	4.98	1.00
311	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	0.50
312	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	2.00
313	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	3.75	1.49	1.00
314	ตูมเต้น	<i>Duabanga grandiflora</i>	1.50	3.75	1.49	0.30
315	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.00
316	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	2.50
318	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	2.50
434	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	2.00
435	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	4.00
436	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	2.00
437	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.00	7.50	2.99	1.80
439	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.50	11.25	4.48	0.60

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
440	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	2.50
441	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.00
442	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	2.00
443	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
444	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.50
445	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.60
446	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.50
447	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	2.00
448	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	2.00
449	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.50
451	เก็ดดำ	<i>Dalbergia rimosa</i>	3.00	7.50	2.99	1.00
452	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.00
453	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	4.50	11.25	4.48	2.00
454	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.10
455	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.00
456	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	2.50
457	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.50	3.25	1.29	0.20
458	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	4.50
459	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	3.00
460	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	2.50
461	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.00
462	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	2.00
463	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	2.00
464	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	1.80
465	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.35	3.25	1.29	0.20
466	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	2.00
467	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.00
468	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.50
469	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	4.00	10.00	3.98	2.60
470	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.20	10.50	4.18	1.20

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
471	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.50
472	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	5.50
473	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	7.50	2.99	2.50
474	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	3.00
475	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	3.50
476	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	3.80
477	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.50	11.25	4.48	2.80
478	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.50	6.25	2.49	2.50
479	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	1.20
480	จี้ดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.25	2.49	2.50
481	จี้ดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	7.50	2.99	0.55
482	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	1.50
483	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	3.00
484	จี้ดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.20	5.50	2.19	
485	จี้ดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.30	5.75	2.29	0.80
486	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.40	3.50	1.39	0.40
487	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	4.00
488	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.40
489	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	4.00
490	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.75	7.46	0.50
491	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	3.30
492	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.30
493	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	3.00
494	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.90
495	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.10
496	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.40
497	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	4.00
498	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.35	3.25	1.29	0.40
499	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.20	10.50	4.18	3.00
500	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	6.00	15.00	5.97	1.60

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
501	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	2.30
502	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	2.40
503	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.50
504	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.75	7.46	3.00
505	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.60
506	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	7.50	2.99	0.60
507	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.20	13.00	5.18	4.50
508	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.75	7.46	4.60
509	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	4.00
510	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.00
511	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.50	8.75	3.48	1.30
512	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.75	7.46	5.00
513	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	4.00
514	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	0.55
515	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.10
516	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	0.50
517	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	3.00
518	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	1.00
519	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.25	2.49	2.50
520	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	3.00
521	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	9.00	22.50	8.96	3.00
522	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.00
523	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	0.50
524	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.30	5.75	2.29	0.50
525	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	10.00	25.00	9.95	2.10
526	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	11.00	27.50	10.95	4.00
527	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	12.00	30.00	11.94	4.50
528	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.50
529	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	4.50
531	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	8.00	20.00	7.96	0.50

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
532	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	8.00	20.00	7.96	1.00
533	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	6.00	15.00	5.97	2.00
534	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	4.00
535	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	1.00
536	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	5.00	12.50	4.98	0.50
537	มะนัง	<i>Terminalia chebula</i> Retz. Syn.	3.00	7.50	2.99	2.60
538	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.25
539	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	0.50
540	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.60
541	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.35
542	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.40
543	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.40
544	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.45
545	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.75	7.46	3.50
546	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	8.00	20.00	7.96	1.50
547	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.80	12.00	4.78	4.00
548	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.80	14.50	5.77	3.00
549	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	4.00
550	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	3.00
551	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	2.00
552	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	4.50
553	มะกั้ม	<i>Canarium subulatum</i>	8.00	20.00	7.96	3.00
554	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.50
555	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	3.00	7.50	2.99	0.40
556	มะมื่น	<i>Iruingia malayana</i>	8.00	20.00	7.96	3.20
557	มะมื่น	<i>Iruingia malayana</i>	8.50	21.25	8.46	3.20
559	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	3.75	1.49	0.26
560	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	7.00	17.50	6.97	2.30
561	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	5.00	1.99	1.60
562	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.60	6.50	2.59	0.35

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
563	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.50
564	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	7.50	2.99	1.00
567	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.50	8.75	3.48	3.50
568	ดุ่มเต้น	<i>Duabanga grandiflora</i>	5.50	13.75	5.47	1.45
569	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	6.25	2.49	1.45
570	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.40
571	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	7.50	18.75	7.46	2.50
572	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.20
573	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	4.50	11.25	4.48	2.50
574	มะกึ้ม	<i>Canarium subulatum</i>	2.00	5.00	1.99	0.30
575	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	1.40
576	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	7.00	17.50	6.97	1.50
577	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.00	5.00	1.99	1.60
578	มะกึ้ม	<i>Canarium subulatum</i>	2.00	5.00	1.99	1.80
579	ส้าน	<i>Dillenia aurea</i>	4.00	10.00	3.98	1.00
580	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.50	3.75	1.49	0.18
581	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	1.80
582	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.10	12.75	5.08	1.40
583	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	0.80
584	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	0.50
585	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	0.55
586	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	0.71
587	จืดำ	<i>Micromelum sp.</i>	4.50	11.25	4.48	0.82
589	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.20	13.00	5.18	0.95
590	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.14
591	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.20	18.00	7.17	1.11
592	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.27
593	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	1.03
594	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	1.27
595	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	1.05

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
596	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	6.60	16.50	6.57	1.58
597	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	10.00	25.00	9.95	1.27
598	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	8.00	20.00	7.96	0.79
599	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.95
600	มะมื่น	<i>Iruingia malayana</i>	6.00	15.00	5.97	0.19
601	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.60	3.00	1.19	0.40
602	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.87
603	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	0.63
604	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	0.55
605	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.03
606	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.80	7.00	2.79	1.11
607	ตูมเต้น	<i>Duabanga grandiflora</i>	4.50	11.25	4.48	0.60
608	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	0.79
609	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.19
610	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.80	9.50	3.78	1.27
611	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.63
612	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.75	7.46	1.03
613	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	1.03
614	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	0.51
615	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	1.19
616	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	0.71
617	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.20	8.00	3.18	0.95
618	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.75	7.46	0.48
619	สีน	<i>Dillenia aurea</i>	4.50	11.25	4.48	1.03
620	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.03
622	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	7.50	2.99	1.03
624	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	1.11
625	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	0.50
626	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	1.10
627	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	3.00

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
628	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.25	2.49	-
629	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.40	11.00	4.38	2.00
630	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.30	10.75	4.28	0.60
631	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.50	1.00	0.20
632	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.20	10.50	4.18	2.50
633	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	10.00	3.98	2.00
634	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	5.00	12.50	4.98	2.00
635	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.00	17.50	6.97	1.10
636	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.00	17.50	6.97	0.30
637	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.50	11.25	4.48	2.00
638	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.40	6.00	2.39	1.80
639	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.80	7.00	2.79	1.80
640	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	6.00	15.00	5.97	1.20
641	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	10.00	25.00	9.95	2.00
642	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	8.00	20.00	7.96	2.00
643	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	10.00	3.98	1.20
644	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	10.00	25.00	9.95	2.30
645	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.00	17.50	6.97	2.00
646	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	9.00	22.50	8.96	-
647	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	15.00	5.97	3.00
648	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.50	8.75	3.48	2.00
649	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.30	5.75	2.29	2.00
650	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.00	17.50	6.97	0.80
651	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	15.00	5.97	1.80
652	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	7.50	18.75	7.46	3.00
653	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	10.00	3.98	1.10
654	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	10.00	3.98	0.70
655	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	5.00	12.50	4.98	3.00
656	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	7.50	2.99	0.50
657	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.00	15.00	5.97	1.80

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
658	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	2.00
659	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.40	2.50	1.00	1.00
660	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.50	6.25	2.49	0.30
661	แต้, ไซ้อ	<i>Gmelina arborea</i> Roxb	3.00	7.50	2.99	1.10
662	แต้, ไซ้อ	<i>Gmelina arborea</i> Roxb	11.00	27.50	10.95	0.80
665	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	4.00	10.00	3.98	2.50
666	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	2.00
667	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	3.50
668	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	-
669	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	-
670	จี้ดำ	<i>Micromelum</i> sp.	4.00	10.00	3.98	1.10
671	มะนัะ	<i>Terminalia chebula</i> Retz. Syn.	2.00	5.00	1.99	0.25
672	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	1.20
673	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.50
674	จี้ดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	1.00
675	จี้ดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	7.50	2.99	1.00
676	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.30
677	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.20
678	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	5.00	1.99	2.00
679	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.50	21.25	8.46	1.50
680	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.50
681	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.80
683	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.80
684	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	3.50
686	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.80
687	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.50
688	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.50
689	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.50
690	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	2.50
691	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	1.80

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
692	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	0.90
693	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	6.50	16.25	6.47	0.10
694	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	2.00
695	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.00
697	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	3.00
698	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.80
699	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	0.70
700	มะนะ	<i>Terminalia chebula</i> Retz. Syn.	8.00	20.00	7.96	0.30
701	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	2.00
702	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.50
703	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.30	8.25	3.28	1.10
704	มะเกี๊ยะ	<i>Canarium subulatum</i>	7.00	17.50	6.97	1.80
705	แดง ,ข้อ	<i>Gmelina arborea</i> Roxb	3.80	9.50	3.78	0.70
706	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.20	8.00	3.18	1.80
707	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.50
941	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	8.00	20.00	7.96	1.10
942	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	6.25	2.49	2.00
943	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	2.30
944	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.50
945	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	6.50	16.25	6.47	1.40
946	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	0.60
947	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.50
948	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.70
949	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.40
950	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.22
951	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	2.50
952	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	3.00	7.50	2.99	0.80
953	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.50
954	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.20

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
955	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.30
956	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	1.80
957	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	3.75	1.49	0.20
958	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	2.00	5.00	1.99	1.70
959	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.80
960	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.00
961	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	6.25	2.49	2.00
962	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	3.75	1.49	0.17
963	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.80
964	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.30
984	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	8.75	3.48	0.60
985	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.80
986	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.50
988	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.00
989	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.80
990	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.80	4.50	1.79	0.25
991	ตูมดง	<i>Aphanamixis polystachya</i>	3.00	7.50	2.99	1.80
992	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.00
993	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	2.00
994	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.10
995	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.00
996	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.10	7.75	3.09	2.00
998	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.60	4.00	1.59	0.20
1000	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	1.60
1001	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	7.50	2.99	2.50
1002	ช้างน้ำ	<i>Ochna integerrima</i>	4.00	10.00	3.98	1.50
1003	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.50	6.25	2.49	1.80
1004	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.60	4.00	1.59	0.25
1005	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	4.00	10.00	3.98	1.20
1006	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	7.50	2.99	2.50

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1007	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.80
1008	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.50
1009	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.00
1010	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.10
1011	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	5.00	1.99	1.80
1012	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.50
1013	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	0.00	0.00	0.00	1.20
1014	มะกึ่ม	<i>Canarium subulatum</i>	5.00	12.50	4.98	1.30
1015	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.30
1016	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	3.00
1017	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.40
1018	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.90
1019	สะกึ้ย	<i>Morinda tomentosa heyne</i> ex. Roth	1.80	4.50	1.79	1.10
1020	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.25	2.49	0.80
1021	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.20
1022	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	0.00	0.00	0.00	2.00
1023	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	2.00
1024	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	6.00	15.00	5.97	1.80
1025	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.00
1026	มะมิด	<i>Iruingia malayana</i>	5.50	13.75	5.47	0.70
1027	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	0.80
1028	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.50
1029	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.50
1030	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.80
1031	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.50
1032	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.30
1033	ตุ้มดง	<i>Aphanamixis polystachya</i>	2.00	5.00	1.99	0.70
1034	มะกึ่ม	<i>Canarium subulatum</i>	2.00	5.00	1.99	0.70
1035	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.50
1036	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.80

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1037	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.30
1038	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.50
1039	มะกิม	<i>Canarium subulatum</i>	2.80	7.00	2.79	1.50
1040	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	0.00	0.00	0.00	0.80
1041	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.00
1042	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	2.00
1043	เหมือดโค	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	10.00	3.98	0.70
1044	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.00	7.50	2.99	2.00
1045	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.50
1046	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.00
1047	เหมือดโค	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	2.00
1048	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	0.70
1049	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.25
1050	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	0.20
1051	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.30
1052	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.50
1053	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	0.00	0.00	0.00	1.80
1054	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	1.20
1055	เหมือดโค	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	1.80
1056	เหมือดโค	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	1.30
1057	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	4.00
1058	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.60
1059	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.50
1060	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	0.00	0.00	0.00	1.50
1061	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	0.00	0.00	0.00	2.50
1062	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.50
1063	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.70
1064	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
1065	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.50
1066	มะมิด	<i>Iruingia malayana</i>	2.00	5.00	1.99	1.00

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1067	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.60
1068	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	9.00	22.50	8.96	1.80
1069	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
1070	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.20
1071	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.50
1072	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.30
1073	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.80
1074	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.10
1075	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.30
1076	มะมีด	<i>Iruingia malayana</i>	3.50	8.75	3.48	1.00
1077	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.30
1078	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.20
1079	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.80
1080	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	0.10
1081	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	4.50	11.25	4.48	2.00
1082	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	5.00	1.99	0.30
1083	มะมีด	<i>Iruingia malayana</i>	6.00	15.00	5.97	0.60
1084	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.60
1085	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.50
1086	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.00
1087	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.20	5.50	2.19	1.30
1088	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.30
1089	มะเกี๊ยะ	<i>Canarium subulatum</i>	2.00	5.00	1.99	1.30
1090	มะเกี๊ยะ	<i>Canarium subulatum</i>	2.50	6.25	2.49	1.00
1091	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	5.50	13.75	5.47	1.40
1092	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.10
1093	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	3.00
1094	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.50	11.25	4.48	1.00
1095	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.00

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1096	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	0.60
1097	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.80
1098	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.00
1099	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.20
1100	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.50
1101	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	4.00	10.00	3.98	1.30
1102	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.00	5.00	1.99	1.80
1103	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	1.10
1104	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.30
1105	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.50
1106	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	0.16
1107	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.30
1108	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	6.00	15.00	5.97	0.80
1109	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	4.00	10.00	3.98	2.30
1110	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.70	4.25	1.69	0.35
1111	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	0.80
1112	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.70
1115	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	2.00
1116	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.10
1117	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.00
1118	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	2.10
1119	ตูมดง	<i>Aphanamixis polystachya</i>	3.00	7.50	2.99	2.00
1120	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.00
1121	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.80
1122	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.50	6.25	2.49	0.90
1123	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	0.40
1124	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.50
1125	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.10
1126	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	4.50	1.79	1.00
1127	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.00

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1128	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	0.20
1129	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.14
1130	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.20
1131	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	6.25	2.49	1.60
1132	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.30	5.75	2.29	1.10
1133	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	1.30
1134	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.80
1135	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	6.25	2.49	0.40
1136	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	0.20
1137	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.50
1138	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.40	6.00	2.39	1.60
1139	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	2.10
1140	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.50	8.75	3.48	1.30
1141	มะเกี๊ยะ	<i>Canarium subulatum</i>	3.00	7.50	2.99	1.40
1142	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	3.20
1143	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	3.50
1144	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.20
1145	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	3.75	1.49	0.50
1146	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.00
1147	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.40
1148	มะมื่อ	<i>Iruingia malayana</i>	6.00	15.00	5.97	1.10
1149	มะเกี๊ยะ	<i>Canarium subulatum</i>	6.00	15.00	5.97	3.20
1150	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	6.25	2.49	2.00
1151	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.50	3.75	1.49	1.20
1152	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.30	5.75	2.29	1.40
1153	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.10
1154	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.25	6.47	2.30
1155	มะเกี๊ยะ	<i>Canarium subulatum</i>	2.20	5.50	2.19	0.20
1156	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.50
1157	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.00	7.50	2.99	2.00

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1158	อีกลหวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	2.00	5.00	1.99	1.50
1159	เนื้อเหนียว	<i>Lophopetalum wallichii</i> Kurz	1.80	4.50	1.79	0.40
1160	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	7.50	2.99	0.60
1161	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	10.00	3.98	2.30
1162	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	7.50	2.99	1.00
1163	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.50	8.75	3.48	2.50
1164	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	5.00	1.99	1.20
1165	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	5.00	1.99	0.30
1166	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	7.50	2.99	2.30
1167	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	7.50	2.99	1.40
1168	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.50	8.75	3.48	1.20
1169	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	10.00	3.98	1.40
1170	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	6.25	2.49	1.00
1171	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	0.60
1174	มะมี้ด	<i>Iruingia malayana</i>	5.00	12.50	4.98	1.60
1175	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	6.50	16.25	6.47	2.30
1176	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	3.00	7.50	2.99	1.40
1178	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	5.00	1.99	0.50
1179	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	12.50	4.98	2.30
1180	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	5.00	1.99	1.00
1181	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	5.00	1.99	0.60
1182	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.00	7.50	2.99	2.00
1183	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.50	6.25	2.49	0.60
1184	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	3.00	7.50	2.99	0.70
1185	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	10.00	3.98	2.50
1186	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	4.00	10.00	3.98	1.20
1187	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	2.00	5.00	1.99	1.00
1188	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	10.00	3.98	2.00
1189	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	5.00	1.99	0.60
1190	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	5.00	12.50	4.98	2.00

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1191	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.50
1192	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.30	10.75	4.28	1.20
1193	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.10
1194	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.40
1195	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.00
1196	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.20
1197	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.20
1198	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	2.60
1199	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	5.50	13.75	5.47	2.50
1200	เคลื่อขาว	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var <i>extensa</i> Benth	-	0.14	0.06	1.20
1201	ขี้ยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb	3.50	8.75	3.48	1.40
1202	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	0.60
1203	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	0.12
1204	สะกีย	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	3.00	7.50	2.99	1.30
1205	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	5.00	1.99	0.30
1206	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	5.00	1.99	1.00
1207	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	0.26
1208	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.80	4.50	1.79	0.31
1209	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	2.00
1210	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.00	7.50	2.99	0.62
1211	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.00	10.00	3.98	1.20
1212	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
1213	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.10	5.25	2.09	0.50
1214	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	1.00
1215	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.00
1216	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.20
1217	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	7.50	2.99	1.40
1218	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	3.20
1219	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	1.80	4.50	1.79	0.50
1120	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.80	9.50	3.78	0.60

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1221	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	2.10	5.25	2.09	1.10
1222	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	0.26
1223	เนื้อเหนียว	<i>Lophopetalum wallichii Kurz</i>	1.60	4.00	1.59	0.50
1224	อีกลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.60	4.00	1.59	0.30
1225	เนื้อเหนียว	<i>Lophopetalum wallichii Kurz</i>	1.50	3.75	1.49	0.40
1226	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.00
1227	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.50	8.75	3.48	0.50
1228	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
1229	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
1230	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.50
1233	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.00
1234	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.00
1235	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.00
1236	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.00
1237	กำวม	<i>P.suberosa</i>	2.30	5.75	2.29	1.10
1238	ตึง	<i>D. tuberculatus</i>	3.00	7.50	2.99	1.30
1239	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.80
1240	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.25	2.49	0.60
1241	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	0.50
1242	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
1243	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	0.40
1244	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.80	4.50	1.79	1.00
1245	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.50
1246	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.60	3.00	1.19	0.60
1247	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	3.00	1.19	2.00
1248	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	4.00	1.59	0.50
1249	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.00
1250	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.50
1251	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	5.00	1.99	1.00
1252	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	2.00

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1253	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.00	5.00	1.99	0.50
1254	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	5.00	1.99	1.10
1255	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	2.00
1256	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	4.00	1.59	2.50
1257	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.50	1.39	0.60
1258	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.50	1.39	0.50
1259	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	3.50	1.39	0.60
1260	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	5.00	1.99	2.50
1261	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	5.40	2.15	1.60
1262	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	7.50	2.99	2.50
1263	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.30	4.50	1.79	1.50
1264	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	3.50	1.39	1.80
1265	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	3.70	1.47	1.50
1266	มะมื่น	<i>Iruingia malayana</i>	3.00	4.00	1.59	1.20
1267	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.50	1.39	0.60
1268	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.50	1.39	0.50
1269	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	1.80	3.00	1.19	0.30
1270	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	10.00	3.98	2.00
1271	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	15.00	5.97	1.10
1272	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.00	1.19	0.40
1273	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	2.50	3.50	1.39	1.50
1274	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	3.00	1.19	0.20
1275	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.30	5.75	2.29	1.30
1276	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.25	2.49	1.30
1277	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.40	6.00	2.39	0.60
1278	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	10.00	3.98	1.40
1279	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	3.00	7.50	2.99	1.90
1280	เกิดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	2.50	6.25	2.49	1.10
1281	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.80
1282	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.20

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1283	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	2.00
1284	แะ	<i>Shorea obtusa,</i>	2.00	5.00	1.99	0.50
1285	จี้ดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.80	3.00	1.19	0.60
1286	มะเก็ม	<i>Canarium subulatum</i>	2.30	3.00	1.19	0.80
1287	ตีนนก	<i>V. pinnata,</i>	2.00	4.00	1.59	0.70
1288	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.80	4.50	1.79	0.80
1289	เก็ดดำ	<i>Dalbergia rimosa</i>	2.00	3.50	1.39	1.50
1290	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	5.00	12.00	4.78	1.50
1291	เนื้อเหนียว	<i>Lophopetalum wallichii</i> Kurz	1.80	4.50	1.79	0.20
1292	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.80	4.50	1.79	0.40
1293	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.30
1294	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.20
1295	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	3.00
1296	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	2.50
1297	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.75	5.47	1.80
1298	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	1.30
1299	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	1.50
1300	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.25	4.48	1.50
1301	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	0.80
1302	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.80	4.50	1.79	1.00
1303	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	0.50
13.4	มะมึด	<i>Iruingia malayana</i>	2.00	5.00	1.99	0.70
1305	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.00
1306	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.50
1307	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	17.50	6.97	1.00
1308	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.00
1309	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	0.70
1310	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	7.50	2.99	0.25
1311	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.50	3.00	1.19	0.20
1312	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	3.00	1.19	1.30

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1313	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	3.00	4.00	1.59	1.50
1314	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.50	6.25	2.49	1.80
1315	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.00
1316	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	8.75	3.48	0.50
1317	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.00	5.00	1.99	1.50
1318	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	5.00	1.99	0.60
1319	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.75	7.46	0.80
1320	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	15.00	5.97	1.20
1321	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	4.00	1.59	3.10
1322	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	10.00	3.98	1.10
1323	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.00	4.78	2.50
1324	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.30	10.00	3.98	2.00
1325	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	18.50	7.36	3.40
1326	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	5.40	2.15	3.00
1327	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.50	7.50	2.99	2.10
1328	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	4.50	1.79	1.00
1329	เคลื่อขาว	<i>Millettia auriculata</i> Bak.Var.extensa Benth	-	12.00	4.78	1.00
1330	ชี้อ้าย	<i>Wasura robusta</i> Roxb	3.00	3.70	1.47	2.00
1331	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	10.00	3.98	0.90
1332	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	15.50	6.17	0.70
1333	สะกึย	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	1.80	3.50	1.39	0.50
1334	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	3.50	1.39	0.30
1335	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.30	5.50	2.19	0.50
1336	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	8.30	3.30	2.70
1337	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	8.00	3.18	1.60
1338	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	10.20	4.06	2.10
1339	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	5.00	13.50	5.37	2.00
1340	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.40	8.50	3.38	0.80
1341	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.80	4.50	1.79	0.50
1342	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	2.00	3.20	1.27	1.10

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1343	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	15.50	6.17	5.00
1344	อักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	3.50	5.50	2.19	2.00
1345	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.30	4.90	2.60
1346	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	9.00	3.58	2.80
1347	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.50	6.57	3.50
1348	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.20	8.50	3.38	0.50
1349	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	4.50	1.79	0.80
1350	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	3.00	5.50	2.19	2.50
1351	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	15.50	6.17	2.30
1352	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	5.20	2.07	2.10
1353	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	13.50	5.37	1.20
1355	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	18.60	7.40	1.20
1356	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.50	4.00	1.59	1.00
1357	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	10.00	3.98	2.30
1358	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	2.00	3.50	1.39	0.80
1359	อักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	5.50	10.20	4.06	1.00
1360	เนื้อเหนียว	<i>Lophopetalum wallichii</i>	2.00	4.30	1.71	0.50
1361	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	11.20	4.46	2.10
1362	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	13.50	5.37	2.00
1363	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.00	6.37	1.50
1364	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	20.00	7.96	4.50
1365	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.60	14.50	5.77	0.30
1366	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	10.40	4.14	0.80
1367	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	17.50	6.97	2.30
1368	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	15.50	6.17	3.50
1369	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	14.20	5.65	2.50
1370	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.40	11.30	4.50	1.70
1371	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	4.00	12.50	4.98	2.60
1372	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	6.00	2.39	1.00
1373	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	10.20	4.06	1.00

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค้ำ (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1374	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	10.60	4.22	2.10
1375	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	4.10	1.63	2.70
1376	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	3.50	8.50	3.38	1.00
1377	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	6.50	14.00	5.57	0.80
1378	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.00	6.00	2.39	0.90
1379	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.30	4.90	0.40
1380	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	18.50	7.36	3.00
1381	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.00	4.38	1.10
1382	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	14.80	5.89	2.00
1383	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.00	4.38	2.70
1384	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	5.00	10.00	3.98	0.20
1385	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	16.00	6.37	2.50
1386	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	6.50	15.60	6.21	1.20
1387	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	15.50	6.17	3.00
1388	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	5.50	14.10	5.61	1.10
1389	เค็ดือกาว	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	8.50	3.38	1.30
1390	ชี้อยาย	<i>Wasura robusta</i> Roxb	5.00	10.00	3.98	2.80
1391	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	15.00	5.97	0.40
1392	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	15.50	6.17	0.20
1393	สะก๊วย	<i>Morinda tomentosa heyne</i> ex Roth	2.30	5.20	2.07	1.50
1394	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	2.00	3.50	1.39	1.10
1395	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	.2.5	3.50	1.39	1.00
1396	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	14.00	5.57	1.30
1397	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	10.00	3.98	1.40
1398	เดิม	<i>Bischofia javanica</i> Bl.	4.50	6.00	2.39	2.00
1399	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	10.20	4.06	1.10
1400	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.00	9.40	3.74	1.20
1401	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	11.20	4.46	1.10
1402	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	6.50	13.50	5.37	2.00
1403	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	1.40

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1404	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	16.00	6.37	1.10
1405	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.70	14.50	5.77	3.20
1406	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	8.00	21.40	8.52	2.40
1407	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	17.50	6.97	1.20
1408	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	4.00	10.20	4.06	1.30
1409	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	14.20	5.65	3.10
1410	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.30	4.50	1.10
1411	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.50	4.98	0.50
1412	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.00	6.37	1.20
1413	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	10.20	4.06	2.00
1414	มะกึ่ม	<i>Canarium subulatum</i>	3.50	6.00	2.39	1.50
1415	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	14.00	5.57	2.00
1416	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	12.00	4.78	1.30
1417	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	16.50	6.57	2.30
1418	กาวเครือ	<i>Millettia auriculata</i> Bak. Var extensa Benth	-	12.00	4.78	2.10
1419	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.00	4.38	2.50
1420	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	15.00	5.97	1.20
1421	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.00	3.50	1.39	0.30
1422	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.00	18.50	7.36	2.30
1423	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	6.00	2.39	0.60
1424	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.50	11.20	4.46	1.20
1425	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.50	10.40	4.14	1.40
1426	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	7.50	18.00	7.17	2.20
1427	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	3.50	4.80	1.91	2.10
1428	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	13.50	5.37	0.60
1429	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	18.50	7.36	1.20
1430	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	11.00	4.38	2.30
1431	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	10.40	4.14	3.00
1432	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	2.50	5.50	2.19	1.50
1433	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	16.50	6.57	2.30

ตารางผนวกที่ 25 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคอก (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
1434	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	17.20	6.85	2.50
1435	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	11.20	4.46	2.00
1436	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	8.70	3.46	0.60
1437	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	12.30	4.90	2.80
1438	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	11.00	4.38	2.00
1439	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	15.00	5.97	1.20
1440	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.00	10.00	3.98	2.20
1441	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	5.00	1.99	0.90
1442	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	15.00	5.97	0.60
1443	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.50	12.00	4.78	0.45
1444	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	15.00	5.97	0.20
1445	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.00	6.00	2.39	0.50
1446	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	11.20	4.46	2.10
1447	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	2.50	5.00	1.99	1.40
1448	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.00	10.50	4.18	1.00
1449	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	4.00	10.10	4.02	1.20
1450	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	13.40	5.33	1.10
1451	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.50	16.50	6.57	2.60
1452	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	16.50	6.57	0.80
1453	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	6.00	14.20	5.65	2.30
1454	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	5.00	12.40	4.94	0.50
1455	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	3.50	8.50	3.38	0.20
1456	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	3.00	5.00	1.99	1.40
1457	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	4.50	12.70	5.06	1.50

ตารางผนวกที่ 26 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ยืนต้น (แปลงทดลอง E) ในป่าเต็งรังรุ่น 2 (Deciduous dipterocarps Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 390 เมตร

	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย	ความหนาแน่น	ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ	
ชนิดพันธุ์ไม้	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)		(RDO _A)
เหียง	634.000	0.002	25.000	25.360	25.360	66.597	100.000	15.337	10.149	5.272	87.206
จันท้า	69.000	0.023	22.000	3.136	2.760	7.248	88.000	13.497	5.250	2.727	23.472
มะกั่ม	21.000	0.074	6.000	3.500	0.840	2.206	24.000	3.681	8.041	4.177	10.064
กาวเครือ	21.000	0.074	12.000	1.750	0.840	2.206	48.000	7.362	5.746	2.985	12.553
ฮักหลวง	36.000	0.043	20.000	1.800	1.440	3.782	80.000	12.270	6.697	3.479	19.530
รัง	43.000	0.036	10.000	4.300	1.720	4.517	40.000	6.135	6.470	3.361	14.013
ชะมวงเครือ	2.000	0.781	1.000	2.000	0.080	0.210	4.000	0.613	5.519	2.867	3.691
เหมือดโคน	51.000	0.031	21.000	2.429	2.040	5.357	84.000	12.883	7.441	3.866	22.106
ตุ้มเต้น	3.000	0.521	2.000	1.500	0.120	0.315	8.000	1.227	7.896	4.102	5.644
สะกัย	3.000	0.521	2.000	1.500	0.120	0.315	8.000	1.227	4.775	2.480	4.023
เนื้อเหนียว	5.000	0.313	4.000	1.250	0.200	0.525	16.000	2.454	5.540	2.878	5.857
ตีนนก	4.000	0.391	2.000	2.000	0.160	0.420	8.000	1.227	4.630	2.405	4.052
มะปิ่น	4.000	0.391	2.000	2.000	0.160	0.420	8.000	1.227	12.402	6.443	8.090
ตัง	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.105	4.000	0.613	6.180	3.211	3.929

ตารางผนวกที่ 26 (ต่อ)

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย			ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น	ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
ต้นเต็ง	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.105	4.000	0.613	6.180	3.211	3.929	
ช้างน้ำว	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.105	4.000	0.613	8.227	4.274	4.992	
ส้าน	2.000	0.781	1.000	2.000	0.080	0.210	4.000	0.613	8.743	4.542	5.366	
แต้ม	3.000	0.521	1.000	3.000	0.120	0.315	4.000	0.613	12.195	6.335	7.264	
มะนะ	3.000	0.521	2.000	1.500	0.120	0.315	8.000	1.227	8.909	4.628	6.170	
มะม็ดกระบก	7.000	0.223	3.000	2.333	0.280	0.735	12.000	1.840	8.826	4.585	7.161	
ขี้ยาย	5.000	0.313	2.000	2.500	0.200	0.525	8.000	1.227	6.160	3.200	4.952	
หนามแท่ง	10.000	0.156	5.000	2.000	0.400	1.050	20.000	3.067	5.560	2.888	7.006	
เก็ดแดง	17.000	0.092	12.000	1.417	0.680	1.786	48.000	7.362	7.689	3.994	13.142	
กุ่ม	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.105	4.000	0.613	4.733	2.459	3.177	
แงะ	1.000	1.563	1.000	1.000	0.040	0.105	4.000	0.613	6.180	3.211	3.929	
เต็ง	2.000	0.781	1.000	2.000	0.080	0.210	4.000	0.613	5.767	2.996	3.819	
เก็ดดำ	2.000	0.781	2.000	1.000	0.080	0.210	8.000	1.227	6.594	3.425	4.862	
รวม	952	15.183		75.275	38.080	100.000	652.000	100.000	192.500	100.000	300.000	

ตารางผนวกที่ 27 แสดงข้อมูลไม้ยืนต้นที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของป่าเต็งรังรุ่น 2 (Deciduous Dry Dipterocarp Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 390 เมตร

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
100	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	15.00	5.97	0.60
101	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	14.50	5.77	2.00
102	จืดำ	Micromelum sp.	2.50	9.00	3.58	2.00
103	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	14.50	5.77	2.10
104	จืดำ	Micromelum sp.	6.00	28.00	11.15	3.00
105	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	19.00	7.56	4.20
106	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	22.00	8.76	1.50
107	มะเกี๋ม	Canarium subulatum	7.50	10.00	3.98	0.60
108	มะเกี๋ม	Canarium subulatum	4.00	16.00	6.37	0.80
109	มะเกี๋ม	Canarium subulatum	4.50	29.50	11.74	1.20
121	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	16.00	6.37	3.10
122	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	16.50	6.57	1.10
123	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	16.50	6.57	2.50
120	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	16.50	6.57	2.00
124	เหียง	D. obtusifolius,	7.00	32.50	12.94	3.40
125	กาวเครือ	Millettia auriculata Bak. Var extensa Benth	7.50	14.00	5.57	3.00
126	เหียง	D. obtusifolius,	7.00	49.00	19.51	2.10
127	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	9.50	3.78	1.00
128	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.30	9.00	3.58	1.00
129	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	18.00	7.17	2.50
130	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	9.00	3.58	0.90
131	กาวเครือ	Millettia auriculata Bak. Var extensa Benth	7.50	13.00	5.18	0.70
132	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	25.00	9.95	2.00
133	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	29.00	11.54	3.40
134	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	20.00	7.96	2.50
135	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	15.00	5.97	2.70
136	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.50	10.00	3.98	1.60
137	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	6.00	2.39	2.10
138	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	15.00	5.97	2.00

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
139	เหมือดโคน	M. Scutellatum	8.50	46.00	18.31	4.20
140	กาวเครือ	Millettia auriculata Bak. Var extensa Benth	5.00	19.00	7.56	3.00
141	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	5.00	19.00	7.56	2.10
142	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.50	10.00	3.98	0.20
143	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	12.00	4.78	3.00
144	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	8.00	3.18	2.60
145	เหมือดโคน	M. Scutellatum	2.00	4.00	1.59	0.28
146	กาวเครือ	Millettia auriculata Bak. Var extensa Benth	6.00	10.00	3.98	5.10
147	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	6.00	9.00	3.58	0.50
148	กาวเครือ	Millettia auriculata Bak. Var extensa Benth	6.00	12.00	4.78	3.00
149	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	6.50	2.59	2.50
150	เหียง	D. obtusifolius,	6.10	6.20	2.47	4.50
151	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	8.40	3.34	2.10
152	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	3.50	1.39	1.20
153	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	5.50	2.19	1.20
154	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.40	1.35	1.00
155	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	6.20	2.47	2.30
156	มะกึ่ม	Canarium subulatum	3.00	4.60	1.83	1.90
157	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	3.60	1.43	1.00
158	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	4.30	1.71	2.00
159	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	6.20	2.47	2.10
160	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	6.80	2.71	2.00
161	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.50	3.70	1.47	1.50
162	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	8.00	3.18	0.16
163	เหียง	D. obtusifolius,	1.50	3.00	1.19	0.30
164	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	5.00	1.99	0.80
165	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	9.50	3.78	2.30
166	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	5.90	2.35	3.50
167	หนามแท่ง	Harrisonia perforata	4.00	6.80	2.71	0.80

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
168	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.50	1.39	1.70
169	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	6.60	2.63	2.60
170	เก็ดแดง	Dalbergia oliveri	6.00	6.80	2.71	4.00
171	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	1.40	3.00	1.19	1.00
172	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	4.50	1.79	2.10
173	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	5.90	2.35	2.70
174	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	6.00	2.39	1.00
175	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	8.00	3.18	0.80
176	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.00	4.00	1.59	0.90
177	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.80	2.31	0.40
178	เหียง	D. obtusifolius,	6.20	6.70	2.67	4.20
179	จืดำ	Micromelum sp.	2.00	3.00	1.19	1.10
180	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.50	2.19	3.20
181	ชะม่วงเครือ	Garcinia acuminata Planch	4.50	4.20	1.67	2.70
182	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	4.00	1.59	0.20
183	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	3.00	1.19	0.14
184	เหียง	D. obtusifolius,	2.30	3.00	1.19	1.20
185	เหียง	D. obtusifolius,	7.00	5.00	1.99	3.00
186	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.60	1.43	1.10
187	จืดำ	Micromelum sp.	2.00	3.40	1.35	1.30
188	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	6.50	2.59	2.80
189	เหียง	D. obtusifolius,	7.00	8.20	3.26	0.40
190	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	7.60	3.03	0.20
191	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	7.00	2.79	1.50
192	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	4.50	1.79	2.40
193	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	4.60	1.83	2.10
194	จืดำ	Micromelum sp.	3.00	4.00	1.59	1.30
195	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.00	1.19	1.40
196	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	5.00	1.99	3.20

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคอก (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
197	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	5.20	2.07	3.50
198	เหียง	D. obtusifolius,	6.70	5.80	2.31	1.20
199	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	4.00	1.59	1.10
200	เหียง	D. obtusifolius,	2.30	3.00	1.19	2.00
201	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.60	2.23	1.40
203	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	3.00	1.19	1.10
204	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	6.00	2.39	3.20
205	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	4.50	1.79	2.40
206	เหียง	D. obtusifolius,	2.30	4.00	1.59	1.20
207	เหียง	D. obtusifolius,	8.50	9.00	3.58	3.20
208	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	4.00	1.59	3.10
209	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.00	1.19	1.10
210	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	2.00	3.00	1.19	0.20
211	กาวเครือ	Millettia auriculata Bak. Var extensa Benth	5.00	4.00	1.59	0.80
212	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	5.80	2.31	2.00
213	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	5.20	2.07	1.50
214	เหียง	D. obtusifolius,	1.00	3.00	1.19	0.10
215	เหียง	D. obtusifolius,	1.35	3.20	1.27	0.20
216	มะกุ่ม	Canariun subulatum	3.50	4.00	1.59	2.30
217	กาวเครือ	Millettia auriculata Bak. Var extensa Benth	5.00	4.30	1.71	2.10
218	เหียง	D. obtusifolius,	8.00	16.00	6.37	2.50
219	เหียง	D. obtusifolius,	3.20	5.00	1.99	1.20
220	กาวเครือ	Millettia auriculata Bak. Var extensa Benth	5.50	4.30	1.71	0.30
221	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	5.00	1.99	2.30
222	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	4.20	1.67	3.00
223	จืดำ	Micromelum sp.	2.00	3.00	1.19	1.20
224	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	3.60	1.43	1.40
225	จืดำ	Micromelum sp.	3.00	4.70	1.87	2.20
226	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.50	4.20	1.67	2.10

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคอก (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
227	อีกลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.50	3.00	1.19	0.60
228	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.00	1.19	1.20
229	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.40	2.15	2.30
230	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	6.00	5.20	2.07	3.00
231	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	6.70	2.67	1.50
232	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.00	1.99	2.30
233	มะกิม	Canarium subulatum	6.50	7.20	2.87	2.50
234	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	5.00	1.99	2.00
235	เหมือดโคน	M. Scutellatum	1.50	3.00	1.19	0.60
236	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	5.40	2.15	2.80
237	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	5.80	2.31	3.40
238	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	6.00	2.39	1.20
239	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	6.90	2.75	2.20
240	เหมือดโคน	M. Scutellatum	3.50	4.00	1.59	0.90
241	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	4.00	1.59	0.60
242	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	8.70	3.46	0.45
243	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	8.00	3.18	3.00
244	เหียง	D. obtusifolius,	1.50	3.00	1.19	0.50
245	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	4.30	1.71	2.10
246	หนามแท่ง	Harrisonia perforata	2.20	4.20	1.67	1.40
247	จืดำ	Micromelum sp.	2.00	3.00	1.19	1.00
248	จืดำ	Micromelum sp.	2.00	3.00	1.19	1.20
249	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.40	2.15	3.20
250	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	5.80	2.31	2.60
251	ต้นเต้ม	M. Scutellatum	4.00	5.00	1.99	0.80
252	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	8.00	3.18	2.30
253	จืดำ	Micromelum sp.	1.50	3.00	1.19	0.50
254	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	3.80	1.51	0.20
255	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	10.00	3.98	2.30

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงคอก (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
256	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	6.40	2.55	0.50
257	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.50	3.00	1.19	0.30
258	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	8.20	3.26	0.62
259	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	10.00	3.98	0.56
260	เหียง	D. obtusifolius,	7.00	8.20	3.26	2.50
261	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.00	3.00	1.19	1.00
262	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	4.00	1.59	2.30
263	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	4.60	1.83	1.00
264	เหียง	D. obtusifolius,	2.40	3.20	1.27	1.20
265	เหียง	D. obtusifolius,	7.00	6.70	2.67	0.68
266	เหียง	D. obtusifolius,	7.00	5.60	2.23	1.20
267	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	4.30	1.71	2.50
268	เหียง	D. obtusifolius,	1.50	3.00	1.19	0.40
269	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	3.00	1.19	1.30
270	จืดำ	Micromelum sp.	1.50	2.80	1.11	1.00
271	เหียง	D. obtusifolius,	1.50	3.00	1.19	0.30
272	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	5.40	1.19	0.40
273	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	9.60	1.59	2.60
274	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	4.00	5.97	2.20
275	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	8.00	1.19	1.00
276	เหียง	D. obtusifolius,	1.50	4.00	1.19	0.90
277	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	6.00	1.59	2.00
278	จืดำ	Micromelum sp.	4.00	4.00	5.97	1.50
279	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	8.60	1.19	2.90
280	เหียง	D. obtusifolius,	1.50	3.20	1.19	0.30
281	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	6.00	1.59	1.20
282	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	1.40	5.97	2.50
283	เหียง	D. obtusifolius,	2.60	5.00	1.19	0.60
284	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	2.50	3.20	1.19	0.12

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
285	เหียง	D. obtusifolius,	2.20	4.20	1.59	1.30
286	จืดำ	Micromelum sp.	1.50	3.40	5.97	0.30
287	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	8.20	1.19	2.50
288	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	8.20	1.19	0.26
289	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	9.00	1.59	0.31
290	เหียง	D. obtusifolius,	4.10	3.20	5.97	2.00
291	เหียง	D. obtusifolius,	3.80	3.20	1.19	0.62
292	จืดำ	Micromelum sp.	1.80	3.20	1.19	0.20
293	เหียง	D. obtusifolius,	7.50	12.00	1.59	3.00
294	เดิม	Bischofia javanica Bl.	1.35	3.20	5.97	0.50
295	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	10.20	1.19	2.00
296	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.50	6.00	1.19	0.20
297	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	4.80	1.59	1.20
299	เหมือดโค่น	M. Scutellatum	2.20	5.50	2.19	1.40
300	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	15.00	5.97	3.20
301	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	7.50	2.99	1.90
302	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	15.00	5.97	0.60
303	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	12.50	4.98	3.10
306	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	6.25	2.49	0.26
307	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	7.50	2.99	0.60
308	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	15.00	5.97	1.50
309	มะกั่ม	Canariun subulatum	5.50	13.75	5.47	2.30
310	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	5.00	12.50	4.98	1.00
311	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	16.25	6.47	0.50
312	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	13.75	5.47	2.00
313	เหียง	D. obtusifolius,	1.50	3.75	1.49	1.00
314	ตุ้มเต๋น	Duabanga grandiflora	1.50	3.75	1.49	0.30
315	เหียง	D. obtusifolius,	7.00	17.50	6.97	1.00
316	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	16.25	6.47	2.50

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
318	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	7.50	2.99	2.50
434	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	11.25	4.48	2.00
435	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	16.25	6.47	4.00
436	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	13.75	5.47	2.00
437	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	3.00	7.50	2.99	1.80
439	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	4.50	11.25	4.48	0.60
440	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	8.75	3.48	2.50
441	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	11.25	4.48	1.00
442	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	11.25	4.48	2.00
443	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	5.00	1.99	1.00
444	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	12.50	4.98	0.50
445	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	7.50	2.99	0.60
446	เหียง	D. obtusifolius,	6.00	15.00	5.97	2.50
447	เหียง	D. obtusifolius,	5.50	13.75	5.47	2.00
448	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	16.25	6.47	2.00
449	เหียง	D. obtusifolius,	2.00	5.00	1.99	1.50
451	เกิดดำ	Dalbergia rimosa	3.00	7.50	2.99	1.00
452	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	12.50	4.98	2.00
453	รัง	S. siamensis (Dipterocarpaceae)	4.50	11.25	4.48	2.00
454	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	7.50	2.99	1.10
455	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	12.50	4.98	2.00
456	เหียง	D. obtusifolius,	3.00	7.50	2.99	2.50
457	ฮักหลวง	Gluta usitata (Anacardiaceae),	1.50	3.25	1.29	0.20
458	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	12.50	4.98	4.50
459	เหียง	D. obtusifolius,	6.50	16.25	6.47	3.00
460	เหียง	D. obtusifolius,	4.50	11.25	4.48	2.50
461	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	10.00	3.98	1.00
462	เหียง	D. obtusifolius,	3.50	8.75	3.48	2.00
463	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	6.25	2.49	2.00

ตารางผนวกที่ 27 (ต่อ)

รหัส	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (m)	เส้นรอบวงค (นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความสูงถึงกิ่ง แรก(m)
464	เหียง	D. obtusifolius,	5.00	12.50	4.98	1.80
465	เหียง	D. obtusifolius,	1.35	3.25	1.29	0.20
466	เหียง	D. obtusifolius,	2.50	6.25	2.49	2.00
467	เหียง	D. obtusifolius,	4.00	10.00	3.98	2.00

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงค(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
1	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	2.50	1.00
2	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
3	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	0.80	1.50	0.60
4	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	1.50	0.60
5	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.50	0.60
6	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
7	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
8	มะกึ่ม	<i>Canarium subulatum</i>	0.60	1.00	0.40
9	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	1.00	2.00	0.80
10	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	0.90	1.00	0.40
11	เป้งป่า	<i>Phoenix loureiri</i>	1.00	10.00	3.98
12	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
13	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
14	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	1.00	2.00	0.80
15	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.50	1.00
16	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.10	2.50	1.00
17	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	1.00	2.00	0.80
18	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.00	0.40
19	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.80	1.00	0.40
20	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	0.60	1.00	0.40
21	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.30	2.00	0.80
22	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.00	0.80
23	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	0.80	2.00	0.80
24	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	0.60	1.00	0.40
25	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.30	2.50	1.00
26	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	0.80	1.00	0.40
27	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.35	2.00	0.80
28	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.00	2.00	0.80
29	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	2.00	0.80
30	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.10	2.00	0.80

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงค(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
31	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	2.00	0.80
32	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.20	2.00	0.80
33	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.00	0.40
34	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.30	2.50	1.00
35	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.10	2.00	0.80
36	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.00	0.40
37	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.00	0.40
38	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	0.80	2.00	0.80
39	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	2.50	1.00
40	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
41	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
42	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.60	1.00	0.40
43	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	0.80	1.00	0.40
44	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.20	2.50	1.00
45	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	0.50	2.00	0.80
46	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	2.00	0.80
47	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.50	2.50	1.00
48	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	2.00	0.80
49	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.50	1.30	0.52
50	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.40	0.56
51	เหมือดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.00	1.50	0.60
52	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
53	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.30	2.50	1.00
54	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.00	1.50	0.60
55	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.00	1.30	0.52
56	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.10	2.00	0.80
57	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	2.00	0.80
58	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	0.50	2.00	0.80
59	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	0.80	2.00	0.80
60	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	0.60	2.50	1.00

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงคืบ(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
61	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	0.70	1.50	0.60
62	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.00	0.40
63	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.00	0.40
64	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.00	0.40
65	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	1.00	1.30	0.52
66	เก็ดแดง	<i>Dalbergia oliveri</i>	1.32	1.50	0.60
67	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.34	1.50	0.60
68	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.50	0.60
69	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.00	0.40
70	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	1.00	1.50	0.60
71	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	1.40	1.50	0.60
72	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.60	0.64
73	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	0.80	1.50	0.60
74	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.00	0.40
75	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
76	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.		1.00	0.40
77	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.40	2.00	0.80
78	ชักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.00	2.50	1.00
79	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.10	2.50	1.00
80	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.30	2.50	1.00
81	เหมือดโค่น	<i>M. Scutellatum</i>	1.00	2.00	0.80
82	มะเกี๋ย	<i>Canarium subulatum</i>	1.00	1.00	0.40
83	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.00	0.40
84	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.90	1.50	0.60
85	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.50	0.60
86	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.60	0.64
87	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	0.90	1.80	0.72
88	หนามแพ่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	0.50	1.20	0.48
89	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	0.50	1.20	0.48
90	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	1.30	0.52

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงคืบ(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
91	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	1.00	1.50	0.60
92	เหมือนดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	0.80	1.50	0.60
93	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	0.60	1.50	0.60
94	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	0.70	1.00	0.40
95	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	0.60	1.00	0.40
96	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	0.80	2.00	0.80
97	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	2.50	1.00
98	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	2.50	1.00
99	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	2.50	1.00
100	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.70	2.00	0.80
101	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.80	2.00	0.80
102	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.00	2.00	0.80
103	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	2.00	0.80
104	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.50	1.00
105	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	1.50	0.60
106	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.10	1.50	0.60
107	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.10	1.60	0.64
108	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	1.20	1.00	0.40
109	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.80	1.00	0.40
110	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
111	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.50	1.00
112	หนามแท่ง	<i>Harrisonia perforata</i>	0.90	2.20	0.88
113	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	1.00	2.20	0.88
114	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	2.40	0.96
115	จืดดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.00	0.80
116	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	0.80	2.00	0.80
117	ฮักหลวง	<i>Gluta usitata</i> (Anacardiaceae),	1.00	1.00	0.40
118	เหมือนดโคน	<i>M. Scutellatum</i>	1.20	1.50	0.60
119	รัง	<i>S. siamensis</i> (Dipterocarpaceae)	1.00	1.50	0.60
120	เหียง	<i>D. obtusifolius,</i>	1.40	1.80	0.72

ตารางผนวกที่ 28 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง(m)	เส้นรอบวงคืบ(นิ้ว)	เส้นผ่าศูนย์กลางc.m
121	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.20	1.60	0.64
122	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.30	1.70	0.68
123	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.50	1.00
124	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	1.40	0.56
125	เหียง	<i>D. obtusifolius</i> ,	1.00	1.00	0.40
126	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.90	1.00	0.40
127	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	0.50	1.00	0.40
128	จืดำ	<i>Micromelum</i> sp.	1.00	2.50	1.00

ตารางผนวกที่ 29 แสดงค่าดัชนีความสำคัญของชนิดพรรณไม้ชั้นล่าง(แปลงทดลอง E) ในป่าเต็งรังรุ่น 2 (Deciduous dipterocarps Forest) ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 390 เมตร

ชนิดพันธุ์ไม้	จำนวน	พื้นที่เฉลี่ย	แปลงที่ขึ้น	ความมากมาย		ความหนาแน่น		ความถี่		ความเด่น		ความสำคัญของชนิดพรรณ
	(ต้น)	(M)	จำนวน	(A)	(D)	(RD _A)	(F)	(RF _A)	(RD)	(RDO _A)	(IVI)	
จืดดำ	45.000	0.003	9.000	5.000	3.000	35.156	60.000	26.471	1.360	10.748	72.375	
เหียง	41.000	0.004	9.000	4.556	2.733	32.031	60.000	26.471	1.453	11.483	69.985	
เก็ดแดง	8.000	0.019	4.000	2.000	0.533	6.250	26.667	11.765	1.317	10.405	28.420	
เหมือดโคน	10.000	0.015	3.000	3.333	0.667	7.813	20.000	8.824	1.399	11.058	27.695	
หนามแท่ง	11.000	0.014	3.000	3.667	0.733	8.594	20.000	8.824	1.346	10.634	28.051	
ฮักหลวง	5.000	0.030	2.000	2.500	0.333	3.906	13.333	5.882	1.530	12.088	21.876	
รัง	5.000	0.030	2.000	2.500	0.333	3.906	13.333	5.882	1.399	11.058	20.847	
มะกึ่ม	2.000	0.075	1.000	2.000	0.133	1.563	6.667	2.941	0.823	6.501	11.005	
เป้งป่า	1.000	0.150	1.000	1.000	0.067	0.781	6.667	2.941	2.028	16.024	19.747	
รวม	128.000	0.339		26.556	8.533	100.000	226.667	100.000	12.654	100.000	300.000	

ตารางผนวกที่ 30 แสดงข้อมูลไม้คลุมดินของป่าเต็งรังรุ่น 2 (Deciduous Dry Dipterocarp Forest)

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	หญ้าคมบาง	scleria sp.	31	หญ้าคมบาง	scleria sp.
2	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	32	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
3	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	33	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
4	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	34	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
5	หญ้าลูกลิบ	Chrumulaena oclorata.	35	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
6	หญ้าคมบาง	scleria sp.	36	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
7	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.	37	หญ้าลูกลิบ	Chrumulaena oclorata.
8	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	38	หญ้าคมบาง	scleria sp.
9	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	39	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.
10	มะลิดิน	Geophila repens.	40	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
11	หญ้าสามคม	scleria sp.	41	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
12	หญ้าสามคม	scleria sp.	42	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
13	หญ้าคมบาง	scleria sp.	43	หญ้าสามคม	scleria sp.
14	แก้มขาว	Mussaenda sanderiana.	44	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
15	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	45	แก้มขาว	Mussaenda sanderiana.
16	ขมิ้นต้น	C.roscoeana	46	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
17	หญ้าคมบาง	scleria sp.	47	หญ้าลูกลิบ	Chrumulaena oclorata.
18	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.	48	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
19	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	49	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.
20	หญ้าคมบาง	scleria sp.	50	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
21	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	51	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
22	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	52	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
23	หญ้าคมบาง	scleria sp.	53	หญ้าสามคม	scleria sp.
24	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	54	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
25	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	55	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
26	เพิร์นตีนตุกแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	56	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
27	หญ้าคมบาง	scleria sp.	57	หญ้าลูกลิบ	Chrumulaena oclorata.
28	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	58	หญ้าคมบาง	scleria sp.
29	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	59	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
30	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	60	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.

ตารางผนวกที่ 30 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
61	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	91	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
62	หญ้าสามคม	scleria sp.	92	หญ้าคมบาง	scleria sp.
63	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	93	หญ้าลูกลีบ	Chrumulaena oclorata.
64	มะลิดิน	Geophila repens.	94	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
65	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	95	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
66	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	96	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
67	หญ้าสามคม	scleria sp.	97	หญ้าลูกลีบ	Chrumulaena oclorata.
68	หญ้าคมบาง	scleria sp.	98	หญ้าคมบาง	scleria sp.
69	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	99	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
70	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	100	มะลิดิน	Geophila repens.
71	แก้มขาว	Mussaenda sanderiana.	101	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
72	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	102	หญ้าสามคม	scleria sp.
73	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	103	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.
74	หญ้าลูกลีบ	Chrumulaena oclorata.	104	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
75	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	105	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
76	หญ้าคมบาง	scleria sp.	106	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
77	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	107	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
78	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	108	หญ้าคมบาง	scleria sp.
79	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	109	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
80	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	110	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
81	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	111	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
82	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	112	หญ้าคมบาง	scleria sp.
83	หญ้าคมบาง	scleria sp.	113	หญ้าลูกลีบ	Chrumulaena oclorata.
84	หญ้าคมบาง	scleria sp.	114	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
85	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	115	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
86	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	116	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
87	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	117	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
88	หญ้าคมบาง	scleria sp.	118	หญ้าคมบาง	scleria sp.
89	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	119	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
90	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	120	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi

ตารางผนวกที่ 30 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
121	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	151	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
122	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	152	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
123	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	153	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
124	หญ้าลูกสืบ	Chrumulaena oclorata.	154	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
125	หญ้าคมบาง	scleria sp.	155	หญ้าลูกสืบ	Chrumulaena oclorata.
126	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.	156	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
127	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	157	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
128	หญ้าลูกสืบ	Chrumulaena oclorata.	158	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
129	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	159	ถั่วแปบ	Dolichos lablab
130	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.	160	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
131	หญ้าคมบาง	scleria sp.	161	หญ้าคมบาง	scleria sp.
132	หญ้าคมบาง	scleria sp.	162	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
133	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	163	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
134	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	164	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
135	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	165	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv
136	หญ้าคมบาง	scleria sp.	166	หญ้าคมบาง	scleria sp.
137	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	167	หญ้าคมบาง	scleria sp.
138	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	168	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
139	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	169	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
140	หญ้าคา	Imperato cylindrico Beauv	170	หญ้าคมบาง	scleria sp.
141	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.	171	หญ้าคมบาง	scleria sp.
142	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	172	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
143	หญ้าคมบาง	scleria sp.	173	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
144	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.	174	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
145	ถั่วแปบ	Dolichos lablab	175	หญ้าคมบาง	scleria sp.
146	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi	176	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
147	หญ้าคมบาง	scleria sp.	177	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
148	ผักเผ็ดป่า	Spilonthes acumella Murr.	178	หญ้าคมบาง	scleria sp.
149	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz	179	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
150	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้	180	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.

ตารางผนวกที่ 30 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ	ชื่อวิทยาศาสตร์
181	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
182	หญ้าคมบาง	scleria sp.
183	หญ้าคมบาง	scleria sp.
184	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
185	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
186	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
187	หญ้าคมบาง	scleria sp.
188	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
189	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
190	หญ้าคมบาง	scleria sp.
191	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
192	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi
193	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
194	หญ้าคมบาง	scleria sp.
195	หญ้าคมบาง	scleria sp.
196	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
197	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
200	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
201	หญ้าลิปเภา	Lygondium flexvosum .Sw.
202	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
203	หญ้าคมบาง	scleria sp.
204	หญ้าคมบาง	scleria sp.
205	ตีนตุ๊กแก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
206	ว่านนกคุ้ม	Molinario latifolia Herb.ex Kurz
207	คล้าใบยาว	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
208	หญ้าคมบาง	scleria sp.
209	ลูกใต้ใบ	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้
210	อาวขาว	Costus specious (Koen) J.E. Smith
211	หญ้าคมบาง	scleria sp.
212	ข้าวเม่านก	Tadehagi triquetrum (L.)Ohahi

ตารางผนวกที่ 31 แสดงปริมาณการย่อยสลายของพีช ก.ก/แปลง/เดือนในปี 5 ชนิด

เดือน	เบญจพรรณขึ้น	เบญจพรรณ	เต็งรังพัฒนา	เต็งรังแควะ	เต็งรังรุ่นสอง
	ก.ก/แปลง/เดือน				
Apr-44	102.12	123.17	83.03	53.18	64.81
May-44	178.65	129.71	149.95	78.51	112.46
Feb-45	91.35	58.46	84.71	36.44	49.23
Mar-45	87.6	49.23	78.75	41.92	52.6
รวม	459.72	360.57	396.44	210.05	279.10
เฉลี่ยรวมต่อฤดูร้อน	114.93	90.14	99.11	52.51	69.77
Jun-44	212.74	146.25	202.21	104.72	156.63
Jul-44	135.1	103.08	133.08	83.56	135.77
Aug-44	150.38	119.81	164.04	101.35	128.85
Sep-44	174.33	112.21	148.75	97.02	149.71
รวม	672.55	481.35	648.08	386.65	570.96
เฉลี่ยรวมต่อฤดูฝน	168.14	120.34	162.02	96.66	142.74
Oct-44	145.67	135.1	157.31	79.62	111.92
Nov-44	160.67	76.44	131.06	59.13	89.04
Dec-44	97.4	49.52	87.02	52.6	72.4
Jan-45	77.4	60.67	71.73	29.62	44.42
รวม	481.14	321.73	447.12	220.97	317.78
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	120.29	80.43	111.78	55.24	79.45
รวมทั้งหมดต่อปี	1613.41	1163.65	1491.64	817.67	1167.84

ตารางผนวกที่ 32 แสดงปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าทั้ง 5 ชนิด

เดือน	เบญจพรรณขึ้น	เบญจพรรณ	เต็งรังพัฒนา	เต็งรังแควะ	เต็งรังรุ่นสอง
	ก.ก/แปลง/เดือน				
Apr-44	89.615	184.425	96.92	160.19	163.94
May-44	69.23	127.5	50.86	71.73	67.69
Feb-45	74.81	87.88	57.5	95.58	93.36
Mar-45	106.35	50.38	40	64.23	42.69
รวม	340.01	450.19	245.28	391.73	367.68
เฉลี่ยรวมต่อฤดูร้อน	85.00	112.55	61.32	97.93	91.92
Jun-44	78.46	114.42	49.81	107.12	69.23
Jul-44	110.19	85.19	53.85	149.81	78.08
Aug-44	117.88	116.73	72.31	165.58	101.73
Sep-44	123.08	120.19	82.69	175.58	104.23
รวม	429.61	436.53	258.66	598.09	353.27
เฉลี่ยรวมต่อฤดูฝน	107.40	109.13	64.67	149.52	88.32
Oct-44	131.73	112.88	78.46	215	84.62
Nov-44	96.15	215.38	102.88	176.92	102.88
Dec-44	92.31	162.5	62.5	73.08	71.15
Jan-45	108.27	102.31	63.65	131.73	94.23
รวม	428.46	593.07	307.49	596.73	352.88
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	107.12	148.27	76.87	149.18	88.22
รวมทั้งหมดต่อปี	1198.08	1479.79	811.43	1586.55	1073.83

ตารางที่ แสดง การเปรียบเทียบชนิดพันธุ์ไม้ในป่าทั้ง 5 ชนิด

ลำดับ	ชื่อ	เบญจพรรณชื้น	เบญจพรรณ	เต็งรัง	เต็งรังแคะ	เต็งรังรุ่น 2
1	เพกา	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	unknown	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	กระดังงาป่า	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	กุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	ก่อ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	กุ่ม	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7	กาบเครือ	0.00	0.00	28.00	0.00	21.00
8	กาบดูก	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
9	เก็ดดำ	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
10	เก็ดแดง	0.00	4.00	24.00	0.00	17.00
12	เก็ม	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
13	ช่อย	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ชะเงาะ	21.00	0.00	19.00	0.00	0.00
15	ชะมอก	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
16	ขางหัวหมู	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
17	ซีเหล็กหลวง	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
18	ซีอาย	0.00	3.00	13.00	0.00	5.00
19	เข็มป่า	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20	แข่งกวาง	0.00	1.00	5.00	2.00	0.00
21	ไผ่น้ำ	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22	เครือกวาก	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	เครือจาย	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	เครือตีนตั้ง	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	เครือปี	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	เครือมะน้ำป่า	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	เคลือนางแย้ม	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
29	แคทราย	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	จ้าว	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
31	จิวป่า	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
32	แงะ	0.00	30.00	38.00	352.00	1.00
33	จิดำ	0.00	0.00	112.00	0.00	69.00

ตารางที่ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	เบญจพรรณขึ้น	เบญจพรรณ	เต็งรัง	เต็งรังแควะ	เต็งรังรุ่น 2
34	แฉะ	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00
35	จี๋เดียม	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
36	ชะม่ววงเครือ	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
37	ช้างน้ำว	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
38	โชค	0.00	7.00	4.00	0.00	0.00
39	ซ้อเสียน	13.00	3.00	0.00	0.00	0.00
40	ดงดำ	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00
41	แดง	10.00	5.00	0.00	5.00	0.00
42	ต้นต้ง	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	ต้นเต้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
44	ตองหอม	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
45	ตะเคียน	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	ตะแบกเกียบ	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
47	ไผ่ยเลียด	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00
48	ตะมอคงคอง	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
49	ตาเสือป่า	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	ตีวชน	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00
51	ตีวแดง	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
52	ตีนจ่า	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
53	ตีนนก	0.00	9.00	9.00	0.00	4.00
54	ตีนเป็ด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	ตึง	0.00	0.00	2.00	336.00	1.00
57	ตุ้ม	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
58	ตุ้มควาย	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
59	ตุ้มคำ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	ตุ้มเต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
62	ตุ้มเหลือง	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
63	เต้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
64	แต่้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
66	ไทร	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
67	นมวัว	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00
68	เนื้อเหนียว	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

ตารางที่ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	เบญจพรรณชั้น	เบญจพรรณ	เต็งรัง	เต็งรังแควะ	เต็งรังรุ่น 2
69	ประดู่	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	ประดู่เลือด	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
71	ปอหมีน	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
72	ปีเครือ	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
73	ปีบ	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
74	ปีโปง	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	เปลือกฝอย	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00
76	เปา	0.00	0.00	18.00	86.00	0.00
77	เป่าหลวง	21.00	0.00	2.00	0.00	0.00
78	ผีเสื้อ	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
79	พฤษ	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
80	พวงประดู่	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	โพธิ์	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
82	มอกหลวง	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
83	มะกร่อนนก	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	มะกอกหลวง	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	มะกายขัด	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	มะเกวณ	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
88	มะกิม	0.00	9.00	8.00	0.00	21.00
89	มะขามป้อม	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
90	มะคังดง	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
91	มะเคาะน้ำ	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
92	มะจัก	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	มะดุก	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	มะดุกดำ	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
95	มะนะ	0.00	3.00	2.00	5.00	3.00
96	มะน้ำป่า	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
97	มะป็น	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
98	มะแพน	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00
99	มะไฟ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	มะมีดกระบก	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
101	มะมีน	0.00	0.00	12.00	0.00	4.00

ตารางที่ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	เบญจพรรณขึ้น	เบญจพรรณ	เต็งรัง	เต็งรังแควะ	เต็งรังรุ่น 2
102	มะเฒ่าสาย	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00
103	มะหมื่นน้ำ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	เฒ่าสาย	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	โม่หลวง	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	ไม้ต่างกลม	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
107	ไม้เตม	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	ไม้เฒ่า	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	ยมหิน	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
110	ยางนา	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ยางพาย	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	ยางยาย	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	ยางขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
114	รกฟ้า	0.00	7.00	9.00	0.00	0.00
115	รัง	0.00	26.00	0.00	0.00	43.00
117	รางจืด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	ส้มป่อย	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
119	ส้มเห็ด	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
122	สะกีย	0.00	2.00	5.00	0.00	3.00
123	สัก	15.00	34.00	0.00	0.00	0.00
124	สักเครือทอง	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	ล้าน	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
126	สารภี	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
127	สีเสื่อหลวง	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
128	แสลงใจ	1.00	4.00	4.00	1.00	0.00
129	หนามแท่ง	0.00	4.00	5.00	0.00	10.00
131	หนามมะเกิด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	หนามหัน	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	หนี่วเหนือ	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
134	หัสไฮ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	ห้าควาย	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
136	หาด	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
137	หาดง	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00

ตารางที่ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ	เบญจพรรณชั้น	เบญจพรรณ	เต็งรัง	เต็งรังแคระ	เต็งรังรุ่น 2
138	เหมือดโคน	0.00	1.00	45.00	19.00	51.00
139	เหียง	0.00	27.00	87.00	70.00	634.00
140	แห่น	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	แห่นนา	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	อ้อยช้าง, กุ้ง	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00
143	ฮักหลวง	36.00	36.00	19.00	51.00	36.00

ตารางผนวกที่ 34แสดงปริมาณธาตุอาหารของพืชที่ย่อยสลายลงสู่ดินในแต่ละฤดูของป่าเบญจพรรณขึ้น

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	กรัม/ไร่ / เดือน				
Apr-44	745.04	58.82	137.25	1039.13	117.63
May-44	1303.46	102.91	240.11	1817.99	205.81
Feb-45	1552.16	122.54	285.93	2164.85	245.08
Mar-45	985.66	77.82	181.57	1374.74	155.63
รวม	4586.31	362.08	844.86	6396.70	724.15
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	1146.58	90.52	211.21	1599.17	181.04
Jun-44	1097.21	86.62	202.12	1530.31	173.24
Jul-44	1271.89	100.41	234.30	1773.95	200.82
Aug-44	1062.83	83.91	195.78	1482.37	167.82
Sep-44	1172.27	92.55	215.94	1635.01	185.10
รวม	4604.20	363.49	848.14	6421.64	726.98
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	1151.05	90.87	212.04	1605.41	181.75
Oct-44	710.66	56.10	130.91	991.18	112.21
Nov-44	564.74	44.58	104.03	787.66	89.17
Dec-44	666.46	52.62	122.77	929.54	105.23
Jan-45	639.10	50.46	117.73	891.38	100.91
รวม	2580.96	203.76	475.44	3599.76	407.52
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	645.24	50.94	118.86	899.94	101.88
รวมทั้งหมดต่อปี	11771.47	929.33	2168.44	16418.10	1858.65

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเบญจพรรณขึ้น

ตารางที่ 34 แสดงปริมาณธาตุอาหารของพืชที่ย่อยสลายลงสู่ดินในแต่ละฤดูของป่าเบญจพรรณ

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	กรัม/ไร่ / เดือน				
Apr-44	906.56	39.42	110.36	1016.92	102.48
May-44	954.68	41.51	116.22	1070.90	107.92
Feb-45	1076.40	46.80	131.04	1207.44	121.68
Mar-45	758.65	32.98	92.36	851.00	85.76
รวม	3696.28	160.71	449.98	4146.26	417.84
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	924.07	40.18	112.50	1036.57	104.46
Jun-44	881.78	38.34	107.35	989.13	99.68
Jul-44	825.88	35.91	100.54	926.42	93.36
Aug-44	994.31	43.23	121.05	1115.35	112.40
Sep-44	562.62	24.46	68.49	631.11	63.60
รวม	3264.59	141.94	397.43	3662.01	369.04
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	816.15	35.49	99.36	915.50	92.26
Oct-44	364.46	15.85	44.37	408.83	41.20
Nov-44	446.55	19.42	54.36	500.92	50.48
Dec-44	430.28	18.71	52.38	482.66	48.64
Jan-45	362.34	15.75	44.11	406.45	40.96
รวม	1603.63	69.73	195.22	1798.86	181.28
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	400.91	17.43	48.81	449.72	45.32
รวมทั้งหมดต่อปี	8564.50	372.38	1042.63	9607.13	968.16

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเบญจพรรณ

ตารางที่ 36แสดงปริมาณธาตุอาหารของพืชที่ย่อยสลายลงสู่ดินในแต่ละฤดูของป่าเต็งรังพัฒนา

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	กรัม/ไร่ / เดือน				
Apr-44	414.48	15.94	31.88	281.635	47.82
May-44	748.56	28.79	57.58	508.635	86.37
Feb-45	1009.44	38.82	77.65	685.895	116.47
Mar-45	664.32	25.55	51.1	451.4	76.65
รวม	2836.80	109.10	218.21	1927.57	327.31
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	709.20	27.28	54.55	481.89	81.83
Jun-44	818.88	31.5	62.99	556.42	94.49
Jul-44	742.56	28.56	57.12	504.56	85.68
Aug-44	785.28	30.2	60.41	533.59	90.61
Sep-44	654.24	25.16	50.33	444.55	75.49
รวม	3000.96	115.42	230.85	2039.12	346.27
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	750.24	28.86	57.71	509.78	86.57
Oct-44	434.4	16.71	33.42	295.17	50.12
Nov-44	358.08	13.77	27.54	243.31	41.32
Dec-44	422.88	16.26	32.53	287.34	48.79
Jan-45	393.12	15.12	30.24	267.12	45.36
รวม	1608.48	61.86	123.73	1092.94	185.59
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	402.12	15.47	30.93	273.24	46.40
รวมทั้งหมดต่อปี	1861.56	71.60	143.20	1264.91	214.79

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเต็งรังพัฒนา

ตารางที่ 37 แสดงปริมาณธาตุอาหารของพืชที่ย่อยสลายลงสู่ดินในแต่ละฤดูของป่าเต็งรังแควะ

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	กรัม/ไร่ / เดือน				
Apr-44	245.025	17.02	17.02	190.57	40.83
May-44	361.77	25.125	25.125	281.38	60.295
Feb-45	482.515	33.51	33.51	375.285	80.415
Mar-45	385.03	26.74	26.74	299.47	64.17
รวม	1474.34	102.40	102.40	1146.71	245.71
	368.59	25.60	25.60	286.68	61.43
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน					
Jun-44	467	32.43	32.43	363.22	77.83
Jul-44	447.06	31.05	31.05	347.72	74.51
Aug-44	366.87	25.48	25.48	285.34	61.14
Sep-44	272.49	18.92	18.92	211.94	45.42
รวม	1553.42	107.88	107.88	1208.22	258.90
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	388.36	26.97	26.97	302.06	64.73
Oct-44	242.36	16.83	16.83	188.5	40.39
Nov-44	136.47	9.48	9.48	106.14	22.74
Dec-44	167.93	11.66	11.66	130.61	27.99
Jan-45	193.18	13.42	13.42	150.25	32.2
รวม	739.94	51.39	51.39	575.50	123.32
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	184.99	12.85	12.85	143.88	30.83
รวมทั้งหมดต่อปี	941.93	65.42	65.42	732.61	156.98

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเต็งรังแควะ

ตารางที่ แสดงปริมาณธาตุอาหารของพืชที่ย่อยสลายลงสู่ดินในแต่ละฤดูของป่าเต็งรังรุ่น 2

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	กรัม/ไร่ / เดือน				
Apr-44	327.67	12.45	20.735	207.38	41.47
May-44	568.56	21.595	35.98	359.845	71.965
Feb-45	791.94	30.075	50.13	501.225	100.245
Mar-45	686.45	26.07	43.45	434.46	86.89
รวม	2374.62	90.19	150.30	1502.91	300.57
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	593.66	22.55	37.57	375.73	75.14
Jun-44	651.45	24.74	41.23	412.31	82.46
Jul-44	756.94	28.74	47.91	479.08	95.82
Aug-44	565.88	21.49	35.82	358.15	71.63
Sep-44	450.18	17.1	28.49	284.92	56.98
รวม	2424.45	92.07	153.45	1534.46	306.89
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	606.11	23.02	38.36	383.62	76.72
Oct-44	366.07	13.9	23.17	231.69	46.34
Nov-44	224.6	8.53	14.22	142.15	28.43
Dec-44	248.91	9.45	15.75	157.54	31.51
Jan-45	265.93	10.1	16.83	168.31	33.66
รวม	1105.51	41.98	69.97	699.69	139.94
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	276.38	10.50	17.49	174.92	34.99
รวมทั้งหมดต่อปี	1476.15	56.06	93.43	934.27	186.85

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเต็งรังรุ่น 2

2. ผลการศึกษาลักษณะของดินป่าไม้

2.1 ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเบญจพรรณชื้น

ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเบญจพรรณชื้น พบในความลึกที่ระดับผิวดิน 0 – 10 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 5.60 ซึ่งมีค่าเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 5.6 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินมีน้อยมาก พบในโตรเจน 2.66 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.10 ppm โปรแทสเซียม 216.33 ppm แคลเซียม 1380.67 ppm แมกนีเซียม 136.67 ppm ส่วนในชั้นที่ 10 – 20 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 6.10 มีค่าเป็นกรดน้อยกว่าในชั้นที่ 0 – 10 ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 2.36 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่าน้อยเช่นกัน พบในโตรเจน 2.36 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.11 ppm โปรแทสเซียม 277.67 ppm แคลเซียม 1210.67 ppm แมกนีเซียม 134.00 ppm และในชั้นที่ 20 – 30 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 5.80 มีค่าเป็นกรดมากกว่าในชั้น 10 – 20 ซม. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 2.72 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินมีน้อยมากเช่นกัน พบในโตรเจน 0.10 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 8.81 ppm โปรแทสเซียม 139.33 ppm แคลเซียม 1262.33 ppm แมกนีเซียม 128.33 ppm ศักยภาพโดยรวมในดินป่าเบญจพรรณชื้น เมื่อเทียบกับอัตราความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยทั่วไป ดินเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ย ปริมาณความเป็นกรดต่างของดินอยู่ที่ 5.80 ถือว่ามีค่าความเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณอินทรีย์วัตถุโดยเฉลี่ย 2.58 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณธาตุอาหารในดินโดยเฉลี่ย พบในโตรเจน 0.11 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 6.79 ppm โปรแทสเซียม 211.11 ppm แคลเซียม 1284.56 ppm แมกนีเซียม 133.00 ppm (ดังตารางที่)

2.2 ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเบญจพรรณ

ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเบญจพรรณ ในความลึกที่ระดับผิวดิน 0 – 10 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่างของดิน 5.73 ซึ่งมีค่าเป็นกรดเล็กน้อย อินทรีย์วัตถุ 2.87 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่ามีน้อยมาก โดยพบในโตรเจน 0.23 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 8.77 ppm โปรแทสเซียม 85.33 ppm แคลเซียม 787.33 ppm แมกนีเซียม 124.67 ppm ในชั้นที่ 10 – 20 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 6.43 มีค่าเป็นกรดน้อยกว่าในชั้นที่ 0 – 10 ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 2.28 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่าน้อยเช่นกัน

พบไนโตรเจน 0.08 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 38.25 ppm โปรแทสเซียม 310.33 ppm แคลเซียม 554 ppm แมกนีเซียม 95 ppm และในชั้นที่ 20 – 30 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 6.77 มีค่าเป็นกรดน้อยกว่าในชั้น 10 – 20 ซม. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 1.68 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินมีน้อยมากเช่นกัน พบไนโตรเจน 0.10 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 25.11 ppm โปรแทสเซียม 143.67 ppm แคลเซียม 427 ppm แมกนีเซียม 75 ppm ศักยภาพโดยรวมในดินป่าเบญจพรรณ เมื่อเทียบกับอัตราความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยทั่วไป ดินเป็นดินที่ยังขาดความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับดิน ในป่าเบญจพรรณชั้น โดยเฉลี่ย ปริมาณความเป็นกรดต่างของดินอยู่ที่ 5.83 ถือว่ามีค่าความเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณอินทรีย์วัตถุโดยเฉลี่ย 2.27 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณธาตุอาหารในดินโดยเฉลี่ย พบไนโตรเจน 0.11 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 6.79 ppm โปรแทสเซียม 211.22 ppm แคลเซียม 1284.56 ppm แมกนีเซียม 133 ppm (ดังตารางที่)

2.3 ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเต็งรังพัฒนา

ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเต็งรังพัฒนา ในความลึกที่ระดับ 0 – 10 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่างของดิน 5.30 มีค่าเป็นกรดเล็กน้อย อินทรีย์วัตถุ 1.43 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่า มีน้อยมาก โดยพบไนโตรเจน 0.08 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 10.78 ppm โปรแทสเซียม 0 ppm แคลเซียม 96 ppm แมกนีเซียม 6 ppm ในชั้นที่ 10 – 20 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 5.20 มีค่าเป็นกรดมากกว่าในชั้นที่ 0 – 10 ซม. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 0.73 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่า น้อยด้วยเช่นกัน พบไนโตรเจน 0.05 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 5.82 ppm จากการวิเคราะห์ธาตุอาหารไม่พบ โปรแทสเซียม , แคลเซียม , แมกนีเซียม และในชั้นที่ 20 – 30 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 5.20 มีค่าเป็นกรดเท่ากับชั้น 10 – 20 ซม. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 0.40 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินมีน้อยมาก พบไนโตรเจน 0.05 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 2.88 ppm และไม่พบ โปรแทสเซียม , แคลเซียม , แมกนีเซียม เหมือนกับชั้นที่ 10 – 20 ซม. ศักยภาพโดยรวมในดินป่าเต็งรังพัฒนา เมื่อเทียบกับอัตราความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยทั่วไป ดินเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์มาก เช่นเดียวกับดิน ในป่าชนิดอื่นๆ โดยเฉลี่ย ปริมาณความเป็นกรดต่างของดินจะอยู่ที่ 5.23 ถือว่ามีค่าความเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณอินทรีย์วัตถุโดยเฉลี่ย 0.86 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับที่น้อยมาก

ปริมาณธาตุอาหารในดินโดยเฉลี่ย พบไนโตรเจน 0.06 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 6.49 ppm โปรแทสเซียม 0 ppm แคลเซียม 32.00 ppm แมกนีเซียม 2.00 ppm (ดังตารางที่)

2.4 ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเต็งรังแควะ

ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเต็งรังแควะ ในที่ระดับความลึก 0 – 10 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่างของดิน 5.10 ค่าความเป็นกรดเล็กน้อย อินทรีย์วัตถุ 2.87 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่ามีน้อยมาก โดยพบไนโตรเจน 0.09 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 45.95 ppm โปรแทสเซียม 42.33 ppm แคลเซียม 268.00 ppm แมกนีเซียม 102.00 ppm ในชั้นที่ 10 – 20 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 5.13 มีค่าเป็นกรดน้อยกว่าในชั้นที่ 0 – 10 ซม. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 1.20 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่าน้อยด้วยเช่นกัน พบไนโตรเจน 0.07 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 38.47 ppm ไม่พบโปรแทสเซียม แคลเซียม 13.33 ppm แมกนีเซียม 46.33 ppm และในชั้นที่ 20 – 30 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 5.33 มีค่าเป็นกรดมากกว่าชั้น 10 – 20 ซม. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 0.82 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินมีน้อยมาก พบไนโตรเจน 0.06 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 26.57 ppm และไม่พบ โปรแทสเซียม เหมือนกับชั้นที่ 10 – 20 ซม. แคลเซียม 36.00 ppm แมกนีเซียม 51.00 ppm ศักยภาพโดยรวมในดินป่าเต็งรังแควะ เมื่อเทียบกับอัตราความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยทั่วไป ดินเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์มากเช่นเดียวกับดิน ในป่าชนิดอื่นๆ โดยเฉลี่ยปริมาณความเป็นกรดต่างของดินจะอยู่ที่ 5.1 ถือว่ามีค่าความเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณอินทรีย์วัตถุโดยเฉลี่ย 1.63 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุอาหารในดินโดยเฉลี่ย พบไนโตรเจน 0.07 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 37.00 ppm โปรแทสเซียม 14.11 ppm แคลเซียม 105.78 ppm แมกนีเซียม 66.44 ppm (ดังตารางที่)

2.5 ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเต็งรังรุ่น 2

ปริมาณธาตุอาหารของดินในป่าเต็งรังรุ่น 2 ในความลึกที่ระดับ 0 – 10 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่างของดิน 5.20 มีค่าเป็นกรดเล็กน้อย อินทรีย์วัตถุ 1.58 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่ามีน้อยมาก โดยพบไนโตรเจน 0.08 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 33.33 ppm ไม่พบโปรแทสเซียม แคลเซียม 104.00 ppm แมกนีเซียม 32.00 ppm ในชั้นที่ 10 – 20 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 5.10 มีค่าเป็นกรดมากกว่าในชั้นที่ 0 – 10 ซม. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 1.42 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินพบว่าน้อยด้วยเช่นกัน พบไนโตรเจน

0.07 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 33.92 ppm จากการวิเคราะห์ธาตุอาหารไม่พบ โปรแทสเซียม , แคลเซียม 92.00 ppm แมกนีเซียม 18.00 ppm และในชั้นที่ 20 – 30 ซม. ปริมาณความเป็นกรดต่าง 4.90 มีค่าเป็นกรดมากกว่าชั้น 0 –20 ซม. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ 1.18 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณธาตุอาหารในดินมีน้อยมาก พบไนโตรเจน 0.08 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 19.12 ppm และไม่พบ โปรแทสเซียม , แคลเซียม ส่วนแมกนีเซียม 5.31 ppm ศักยภาพโดยรวมในดินป่าเต็งรังรุ่น 2 เมื่อเทียบกับอัตราความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยทั่วไป ดินเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์มาก เช่นเดียวกับดินในป่าเต็งรังชนิดอื่นๆ โดยเฉลี่ย ปริมาณความเป็นกรดต่างของดินจะอยู่ที่ 5.07 ถือว่ามีค่าความเป็นกรดน้อย ปริมาณอินทรีย์วัตถุโดยเฉลี่ย 1.39 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุอาหารในดินโดยเฉลี่ย พบไนโตรเจน 0.08 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบโปรแทสเซียม ทุกระดับความลึก ฟอสฟอรัส 28.82 ppm แคลเซียม 65.33 ppm แมกนีเซียม 18.44 ppm (ดังตารางที่)

ตารางที่ 39 แสดงปริมาณธาตุอาหารในดินของป่า 5 ชนิด

Plot	Depth	pH	OM	N	P	K	Ca	Mg
			(%)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
ป่าเบญจพรรณชื้น	0-10	5.60	2.66	0.11	5.70	216.33	1380.67	136.67
	1.0 -20	6.10	2.36	0.11	5.85	277.67	1210.67	134.00
	20-30	5.80	2.72	0.10	8.81	139.33	1262.33	128.33
	เฉลี่ย	5.80	2.57	0.11	6.79	211.11	1284.56	133.00
ป่าเบญจพรรณ	0-10	5.73	2.87	0.23	8.77	85.33	787.33	124.67
	1.0 -20	6.43	2.28	0.08	38.25	310.33	554.00	95.00
	20-30	6.77	1.68	0.10	25.11	143.67	427.00	75.00
	เฉลี่ย	5.83	2.27	0.31	24.04	179.77	589.44	98.22
ป่าเต็งรังพัฒนา	0-10	5.30	1.45	0.08	10.78	0.00	96.00	6.00
	1.0 -20	5.20	0.73	0.05	5.82	0.00	0.00	0.00
	20-30	5.20	0.40	0.05	2.88	0.00	0.00	0.00
	เฉลี่ย	5.23	0.86	0.06	6.49	0.00	32.00	2.00
ป่าเต็งรังแคระ	0-10	5.10	2.87	0.09	45.95	42.33	268.00	102.00
	1.0 -20	5.13	1.20	0.07	38.47	0.00	13.33	46.33
	20-30	5.33	0.82	0.06	26.57	14.11	36.00	51.00
	เฉลี่ย	5.19	1.63	0.07	37.00	14.11	105.78	66.44
ป่าเต็งรังรุ่น 2	0-10	5.20	1.58	0.08	33.33	0.00	104.00	32.00
	1.0 -20	5.10	1.42	0.07	33.92	0.00	92.00	18.00
	20-30	4.90	1.18	0.08	19.21	0.00	0.00	5.31
	เฉลี่ย	5.07	1.39	0.08	28.82	0.00	65.33	18.44

ตารางผนวกที่ 40 แสดงปริมาณธาตุอาหารในซากพืชในแต่ละเดือนของป่าเบญจพรรณขึ้น

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	(%)				
Apr-44	1.63	0.12	0.60	1.68	0.43
May-44	2.19	0.11	0.18	3.25	0.38
Feb-45	0.72	0.08	0.05	0.94	0.12
Mar-45	0.66	0.07	0.03	0.69	0.08
รวม	5.19	0.38	0.85	6.56	1.01
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	1.30	0.10	0.21	1.64	0.25
Jun-44	2.29	0.13	0.22	2.88	0.38
Jul-44	1.40	0.07	0.19	2.00	0.24
Aug-44	1.33	0.08	0.51	2.21	0.16
Sep-44	1.25	0.10	0.44	2.82	0.18
รวม	6.27	0.38	1.36	9.91	0.96
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	1.57	0.10	0.34	2.48	0.24
Oct-44	1.29	0.08	0.37	2.20	0.23
Nov-44	1.18	0.08	0.46	1.78	0.17
Dec-44	0.77	0.10	0.03	0.95	0.10
Jan-45	0.69	0.10	0.04	1.12	0.13
รวม	3.93	0.36	0.90	6.05	0.63
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	0.98	0.09	0.23	1.51	0.16
รวมทั้งหมดต่อปี	15.39	1.13	3.11	22.52	2.59

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเบญจพรรณขึ้น

ตารางผนวกที่ 40 แสดงปริมาณธาตุอาหารในซากพืชในแต่ละเดือนของป่าเบญจพรรณ

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	(%)				
Apr-44	1.14	0.01	0.25	1.20	0.16
May-44	1.23	0.04	0.12	2.00	0.16
Feb-45	1.43	0.06	0.04	0.90	0.11
Mar-45	1.32	0.09	0.04	1.00	0.08
รวม	5.12	0.20	0.45	5.10	0.51
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	1.28	0.05	0.11	1.28	0.13
Jun-44	0.99	0.04	0.12	2.40	0.16
Jul-44	1.04	0.04	0.11	1.20	0.20
Aug-44	0.77	0.04	0.15	1.24	0.12
Sep-44	0.87	0.03	0.27	2.00	0.12
รวม	3.67	0.15	0.65	6.84	0.60
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	0.92	0.04	0.16	1.71	0.15
Oct-44	0.77	0.04	0.41	2.01	0.16
Nov-44	0.77	0.03	0.37	1.82	0.16
Dec-44	1.46	0.05	0.02	0.73	0.07
Jan-45	1.32	0.08	0.06	0.83	0.11
รวม	4.32	0.20	0.86	5.39	0.50
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	1.08	0.05	0.22	1.35	0.13
รวมทั้งหมดต่อปี	13.11	0.55	1.96	17.33	1.61

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเบญจพรรณ

ตารางผนวกที่ 40 แสดงปริมาณธาตุอาหารในซากพืชในแต่ละเดือนของป่าเต็งรังพัฒนา

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	(%)				
Apr-44	1.24	0.045	0.07	0.98	0.195
May-44	0.965	0.035	0.07	0.77	0.135
Feb-45	0.83	0.05	0.02	0.28	0.06
Mar-45	0.87	0.05	0.03	0.29	0.06
รวม	3.91	0.18	0.19	2.32	0.45
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	0.98	0.05	0.05	0.58	0.11
Jun-44	1.115	0.035	0.065	0.73	0.1
Jul-44	0.74	0.02	0.06	0.8	0.16
Aug-44	0.66	0.01	0.06	0.59	0.1
Sep-44	0.66	0.01	0.05	0.58	0.07
รวม	3.18	0.08	0.24	2.70	0.43
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	0.79	0.02	0.06	0.68	0.11
Oct-44	0.84	0.03	0.11	0.63	0.09
Nov-44	0.84	0.02	0.13	0.71	0.08
Dec-44	0.87	0.04	0.01	0.37	0.06
Jan-45	0.8	0.05	0.03	0.24	0.06
รวม	3.35	0.14	0.28	1.95	0.29
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	0.84	0.04	0.07	0.49	0.07
รวมทั้งหมดต่อปี	10.43	0.40	0.71	6.97	1.17

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเต็งรังพัฒนา

ตารางผนวกที่ 40 แสดงปริมาณธาตุอาหารในซากพืชในแต่ละเดือนของป่าเต็งรังแควะ

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	(%)				
Apr-44	1.36	0.02	0.08	0.80	0.20
May-44	0.58	0.01	0.04	0.80	0.16
Feb-45	0.66	0.08	0.03	0.35	0.11
Mar-45	0.70	0.08	0.02	0.30	0.07
รวม	3.30	0.19	0.17	2.25	0.54
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	0.83	0.05	0.04	0.56	0.14
Jun-44	0.74	0.02	0.06	0.80	0.16
Jul-44	0.64	0.01	0.05	0.80	0.16
Aug-44	0.59	0.01	0.11	0.69	0.10
Sep-44	0.59	0.01	0.08	0.59	0.09
รวม	2.56	0.05	0.30	2.88	0.51
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	0.64	0.01	0.08	0.72	0.13
Oct-44	0.56	0.01	0.10	0.60	0.12
Nov-44	0.63	0.01	0.07	0.74	0.12
Dec-44	0.80	0.04	0.01	0.42	0.07
Jan-45	0.72	0.10	0.03	0.33	0.10
รวม	2.71	0.16	0.21	2.09	0.41
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	0.68	0.04	0.05	0.52	0.10
รวมทั้งหมดต่อปี	8.57	0.40	0.68	7.22	1.46

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเต็งรังแควะ

ตารางผนวกที่ 40 แสดงปริมาณธาตุอาหารในซากพืชในแต่ละเดือนของป่าเต็งรังรุ่น 2

	N	P	K	Ca	Mg
เดือน	(%)				
Apr-44	1.21	0.05	0.13	0.97	0.20
May-44	1.14	0.04	0.06	0.96	0.19
Feb-45	1.20	0.05	0.08	0.98	0.20
Mar-45	0.88	0.02	0.06	0.80	0.16
รวม	4.42	0.15	0.32	3.70	0.74
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	1.10	0.04	0.08	0.93	0.19
Jun-44	0.66	0.01	0.06	0.61	0.10
Jul-44	0.69	0.01	0.02	0.57	0.08
Aug-44	0.59	0.01	0.14	0.56	0.12
Sep-44	0.73	0.02	0.16	0.57	0.11
รวม	2.67	0.05	0.38	2.31	0.41
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	0.67	0.01	0.10	0.58	0.10
Oct-44	0.89	0.04	0.01	0.22	0.05
Nov-44	0.87	0.04	0.01	0.31	0.07
Dec-44	0.73	0.05	0.01	0.30	0.06
Jan-45	0.90	0.05	0.01	0.24	0.07
รวม	3.39	0.18	0.04	1.07	0.25
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	0.85	0.05	0.01	0.27	0.06
รวมทั้งหมดต่อปี	10.48	0.38	0.74	7.08	1.40

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในแปลงวิจัยป่าเต็งรังรุ่น 2

ตารางที่ แสดงปริมาณธาตุอาหารของพืชที่ย่อยสลายลงสู่ดินของป่า 5 ชนิด

ชนิดป่า	เดือน	กรัม/ไร่ /เดือน				
		N	P	K	Ca	Mg
ป่าเบญจพรรณชื้น	เม.ษ 44	496.69	39.21	91.50	692.75	78.42
	พ.ค	867.80	68.51	159.86	1210.36	137.02
	มิ.ย	997.59	78.76	183.77	1391.37	157.51
	ก.ค	985.66	77.82	181.57	1374.74	155.63
	ส.ค	1097.21	86.62	202.12	1530.31	173.24
	ก.ย	1271.89	100.41	234.30	1773.95	200.82
	ต.ค	1062.83	83.91	195.78	1482.37	167.82
	พ.ย	1172.27	92.55	215.94	1635.01	185.10
	ธ.ค	710.66	56.10	130.91	991.18	112.21
	ม.ค 45	564.74	44.58	104.03	787.66	89.17
	ก.พ	666.46	52.62	122.77	929.54	105.23
	มี.ค	639.10	50.46	117.73	891.38	100.91
	เม.ย	496.69	39.21	91.50	692.75	78.42
	พ.ค	871.31	68.79	160.50	1215.25	137.58
	มิ.ย	1109.13	87.56	204.31	1546.95	175.13
ป่าเบญจพรรณ	เม.ษ 44	439.48	19.11	53.50	492.98	49.68
	พ.ค	610.74	26.55	74.35	685.09	69.04
	มิ.ย	789.78	34.34	96.15	885.93	89.28
	ก.ค	758.65	32.98	92.36	851.00	85.76
	ส.ค	881.78	38.34	107.35	989.13	99.68
	ก.ย	825.88	35.91	100.54	926.42	93.36
	ต.ค	994.31	43.23	121.05	1115.35	112.40
	พ.ย	562.62	24.46	68.49	631.11	63.60
	ธ.ค	364.46	15.85	44.37	408.83	41.20
	ม.ค 45	446.55	19.42	54.36	500.92	50.48
	ก.พ	430.28	18.71	52.38	482.66	48.64
	มี.ค	362.34	15.75	44.11	406.45	40.96
	เม.ย	934.15	40.62	113.72	1047.88	105.60
	พ.ค	687.88	29.91	83.74	771.62	77.76
	มิ.ย	573.23	24.92	69.78	643.02	64.80

ตารางที่ ต่อ

ชนิดป่า	เดือน	กรัม/ไร่/เดือน				
		N	P	K	Ca	Mg
ป่าเต็งรังที่พัฒนา	เม.ษ 44	252.48	9.71	19.42	171.56	29.13
	พ.ค	504.96	19.42	38.84	343.11	58.26
	มิ.ย	650.88	25.03	50.07	442.26	75.10
	ก.ค	664.32	25.55	51.10	451.40	76.65
	ส.ค	818.88	31.50	62.99	556.42	94.49
	ก.ย	742.56	28.56	57.12	504.56	85.68
	ต.ค	785.28	30.20	60.41	533.59	90.61
	พ.ย	654.24	25.16	50.33	444.55	75.49
	ธ.ค	434.40	16.71	33.42	295.17	50.12
	ม.ค 45	358.08	13.77	27.54	243.31	41.32
	ก.พ	422.88	16.26	32.53	287.34	48.79
	มี.ค	393.12	15.12	30.24	267.12	45.36
	เม.ย	324.00	12.46	24.92	220.15	37.38
	พ.ค	487.20	18.74	37.48	331.05	56.22
	มิ.ย	717.12	27.58	55.16	487.27	82.74
ป่าเต็งรังแควะ	เม.ษ 44	182.55	12.68	12.68	141.98	30.42
	พ.ค	216.66	15.05	15.05	168.52	36.11
	มิ.ย	274.71	19.08	19.08	213.66	45.78
	ก.ค	385.03	26.74	26.74	299.47	64.17
	ส.ค	467.00	32.43	32.43	363.22	77.83
	ก.ย	447.06	31.05	31.05	347.72	74.51
	ต.ค	366.87	25.48	25.48	285.34	61.14
	พ.ย	272.49	18.92	18.92	211.94	45.42
	ธ.ค	242.36	16.83	16.83	188.50	40.39
	ม.ค 45	136.47	9.48	9.48	106.14	22.74
	ก.พ	167.93	11.66	11.66	130.61	27.99
	มี.ค	193.18	13.42	13.42	150.25	32.20
	เม.ย	124.95	8.68	8.68	97.18	20.82
	พ.ค	290.22	20.15	20.15	225.72	48.37
	มิ.ย	415.61	28.86	28.86	323.25	69.27

ตารางที่ (ต่อ)

ชนิดป่า	กรัม/ไร่/เดือน					
	เดือน	N	P	K	Ca	Mg
ป่าเต็งรังรุ่น 2	เม.ษ 44	197.38	7.50	12.49	124.92	24.98
	พ.ค	361.70	13.74	22.89	228.92	45.78
	มิ.ย	502.68	19.09	31.82	318.15	63.63
	ก.ค	686.45	26.07	43.45	434.46	86.89
	ส.ค	651.45	24.74	41.23	412.31	82.46
	ก.ย	756.94	28.74	47.91	479.08	95.82
	ต.ค	565.88	21.49	35.82	358.15	71.63
	พ.ย	450.18	17.10	28.49	284.92	56.98
	ธ.ค	366.07	13.90	23.17	231.69	46.34
	ม.ค 45	224.60	8.53	14.22	142.15	28.43
	ก.พ	248.91	9.45	15.75	157.54	31.51
	มี.ค	265.93	10.10	16.83	168.31	33.66
	เม.ย	260.58	9.90	16.49	164.92	32.98
	พ.ค	413.72	15.71	26.18	261.85	52.37
	มิ.ย	578.52	21.97	36.62	366.15	73.23

ตารางที่ แสดงปริมาณการย่อยสลายของซากพืชในแต่ละแปลงทดลอง

เดือน	(กรัม)/ 0.26ตร.ม				
	เบญจพรรณ	เบญจพรรณขึ้น	เต็งรังแคระ	เต็งรังพัฒนา	เต็งรังรุ่นสอง
เม.๕ 44	6.21	7.08	4.12	5.26	4.06
พ.ค	8.63	12.37	4.89	10.52	7.44
มิ.ย	11.16	14.22	6.20	13.56	10.34
ก.ค	10.72	14.05	8.69	13.84	14.12
ส.ค	12.46	15.64	10.54	17.06	13.40
ก.ย	11.67	18.13	10.09	15.47	15.57
ต.ค	14.05	15.15	8.28	16.36	11.64
พ.ย	7.95	16.71	6.15	13.63	9.26
ธ.ค	5.15	10.13	5.47	9.05	7.53
ม.ค 45	6.31	8.05	3.08	7.46	4.62
ก.พ	6.08	9.50	3.79	8.81	5.12
มี.ค	5.12	9.11	4.36	8.19	5.47
เม.ย	13.2	7.08	2.82	6.75	5.36
พ.ค	9.72	12.42	6.55	10.15	8.51
มิ.ย	8.1	15.81	9.38	14.94	11.90

ตารางผนวกที่ 43 แสดงข้อมูลสภาพอากาศในป่าเบญจพรรณชั้น (Lower Mixed Deciduous Forest)

เดือน	ปริมาณฝน (มิลลิเมตร)	อุณหภูมิ (C)			ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	อัตราการระเหย
		สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ย		
Apr-44	0.00	37.30	20.40	28.90	83.20	12.77
May-44	436.00	31.90	21.70	26.80	90.10	29.91
Feb-45	0.00	29.20	13.30	21.30	87.80	19.51
Mar-45	0.00	33.50	15.10	24.30	86.90	16.36
รวม	436.00	131.90	70.50	101.30	348.00	78.55
เฉลี่ยรวมต่อฤดูร้อน	109.00	32.98	17.63	25.33	87.00	19.64
Jun-44	286.00	31.40	21.30	26.40	90.10	33.42
Jul-44	322.00	29.50	21.10	25.30	88.70	34.05
Aug-44	731.00	30.20	21.40	25.80	90.50	33.16
Sep-44	165.00	30.10	21.00	25.60	89.50	33.57
รวม	1504.00	121.20	84.80	103.10	358.80	134.19
เฉลี่ยรวมต่อฤดูฝน	376.00	30.30	21.20	25.78	89.70	33.55
Oct-44	109.00	29.40	19.70	24.60	90.30	35.57
Nov-44	406.00	27.10	14.50	20.80	83.60	35.61
Dec-44	0.00	26.30	12.90	19.60	87.10	22.74
Jan-45	0.00	25.50	12.50	19.00	86.00	21.66
รวม	515.00	108.30	59.60	84.00	347.00	115.58
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	128.75	27.08	14.90	21.00	86.75	28.90
รวมทั้งหมดต่อปี	2455.00	361.40	214.90	288.40	1053.80	328.32
เฉลี่ยในแต่ละเดือน / ปี	204.58	30.12	17.91	24.03	87.82	27.36

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลแปลงศึกษาวิจัยในป่าเบญจพรรณขึ้น

ตารางผนวกที่ 44 แสดงข้อมูลสภาพอากาศในป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous forest)

เดือน	ปริมาณฝน	อุณหภูมิ (C)			ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	อัตราการระเหย
		สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ย		
Apr-44	0.00	38.40	20.90	29.70	81.30	7.85
May-44	451.00	32.40	22.20	27.30	92.50	24.26
Feb-45	0.00	30.10	13.60	21.90	86.60	31.36
Mar-45	0.00	35.00	15.50	25.30	84.90	29.13
รวม	451.00	135.90	72.20	104.20	345.30	92.59
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	112.75	33.98	18.05	26.05	86.33	23.15
Jun-44	295.00	32.30	21.50	26.90	89.20	31.97
Jul-44	322.00	29.90	21.80	25.90	89.50	22.38
Aug-44	692.00	31.10	22.00	26.60	88.60	28.16
Sep-44	162.00	30.80	21.80	26.30	90.10	19.85
รวม	1471.00	124.10	87.10	105.70	357.40	102.36
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	367.75	31.03	21.78	26.43	89.35	25.59
Oct-44	111.00	30.10	20.40	25.30	90.10	20.33
Nov-44	0.00	27.90	14.90	21.40	89.60	14.15
Dec-44	0.00	27.00	13.00	20.00	86.40	10.53
Jan-45	0.00	26.20	12.40	19.30	84.60	5.11
รวม	111.00	111.20	60.70	86.00	350.70	50.12
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	27.75	27.80	15.18	21.50	87.68	12.53
รวมทั้งหมดต่อปี	2033.00	371.20	220.00	295.90	1053.40	245.07
เฉลี่ยในแต่ละเดือน / ปี	169.42	30.93	18.33	24.66	87.78	20.42

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลแปลงศึกษาวิจัยในป่าเบญจพรรณ

ตารางผนวกที่ 45 แสดงข้อมูลสภาพอากาศในป่าเต็งรังพัฒนา (Deciduous Dipterocarps Forest)

เดือน	ปริมาณฝน	อุณหภูมิ (C)			ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	อัตราการระเหย
		สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ย		
Apr-44	0.00	39.10	21.50	30.30	81.90	11.17
May-44	329.00	33.50	22.30	27.90	86.60	25.74
Feb-45	0.00	32.00	14.30	23.20	84.90	11.06
Mar-45	0.00	35.40	16.30	25.90	84.00	10.47
รวม	329.00	140.00	74.40	107.30	337.40	58.43
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	82.25	35.00	18.60	26.83	84.35	14.61
Jun-44	216.00	32.30	22.10	27.20	88.70	26.67
Jul-44	525.00	31.70	22.20	27.00	90.60	28.54
Aug-44	769.00	32.00	22.00	30.40	89.60	27.26
Sep-44	414.00	32.30	21.90	27.10	90.50	27.75
รวม	1924.00	128.30	88.20	111.70	359.40	110.22
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	481.00	32.08	22.05	27.93	89.85	27.56
Oct-44	122.00	32.10	20.80	26.50	87.60	31.04
Nov-44	0.00	29.00	16.00	22.50	91.40	23.81
Dec-44	0.00	29.20	13.80	21.50	93.30	18.59
Jan-45	0.00	28.00	13.20	20.60	88.90	13.34
รวม	122.00	118.30	63.80	91.10	361.20	86.78
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	30.50	29.58	15.95	22.78	90.30	21.70
รวมทั้งหมดต่อปี	2375.00	386.60	226.40	310.10	1058.00	255.43
เฉลี่ยในแต่ละเดือน / ปี	197.92	32.22	18.87	25.84	88.17	21.29

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลแปลงศึกษาวิจัยในป่าเต็งรังพัฒนา

ตารางผนวกที่46 แสดงข้อมูลสภาพอากาศ ของป่าเต็งรังแควะ (Dry Dipterocarp Forest scrub type)

เดือน	ปริมาณฝน	อุณหภูมิ (C)			ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	อัตราการระเหย
		สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ย		
Apr-44	0.00	40.90	23.50	32.20	83.90	2.42
May-44	397.00	34.90	23.00	29.00	92.10	13.64
Feb-45	0.00	34.70	16.20	25.50	85.40	2.06
Mar-45	0.00	38.00	18.40	28.20	84.90	1.40
รวม	397.00	148.50	81.10	114.90	346.30	19.52
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	99.25	37.13	20.28	28.73	86.58	4.88
Jun-44	260.00	34.40	23.00	28.70	90.60	14.25
Jul-44	502.00	32.50	22.70	27.60	88.00	16.21
Aug-44	783.00	33.80	22.60	28.20	92.00	16.07
Sep-44	474.00	34.00	22.40	28.20	92.00	14.84
รวม	2019.00	134.70	90.70	112.70	362.60	61.37
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	504.75	33.68	22.68	28.18	90.65	15.34
Oct-44	188.00	32.60	21.50	27.10	92.70	14.37
Nov-44	0.00	31.10	17.00	24.10	91.20	8.32
Dec-44	0.00	31.10	12.60	21.90	90.90	5.14
Jan-45	0.00	30.30	14.90	22.60	87.70	4.13
รวม	188.00	125.10	66.00	95.70	362.50	31.96
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	47.00	31.28	16.50	23.93	90.63	7.99
รวมทั้งหมดต่อปี	2604.00	408.30	237.80	323.30	1071.40	112.85
เฉลี่ยในแต่ละเดือน / ปี	217.00	34.03	19.82	26.94	89.28	9.40

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลแปลงศึกษาวิจัยในป่าเต็งรังโคระ

ตารางผนวกที่ 47 แสดงข้อมูลสภาพอากาศในป่าเต็งรังรุ่น 2 (Deciduous Dipterocarps Forest)

เดือน	ปริมาณฝน	อุณหภูมิ (C)			ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	อัตราการระเหย
		สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ย		
Apr-44	0.0	40.6	22.7	31.7	84.0	4.43
May-44	258.0	35.5	22.4	29.0	89.4	20.64
Feb-45	0.0	34.1	15.7	24.9	87.5	6.93
Mar-45	0.0	37.8	18.1	28.0	86.1	7.57
รวม	258.00	148.00	78.90	113.60	347.00	39.57
เฉลี่ยรวมในฤดูร้อน	64.50	37.00	19.73	28.40	86.75	9.89
Jun-44	167.0	34.2	22.4	28.3	87.0	24.74
Jul-44	385.0	33.2	22.5	27.9	89.0	26.81
Aug-44	656.0	33.9	22.6	28.3	88.7	25.46
Sep-44	232.0	34.2	22.6	28.4	90.4	25.26
รวม	1440.00	135.50	90.10	112.90	355.10	102.27
เฉลี่ยรวมในฤดูฝน	360.00	33.88	22.53	28.23	88.78	25.57
Oct-44	85.0	33.1	21.7	27.4	90.4	26.81
Nov-44	0.0	30.7	16.4	27.1	91.7	15.79
Dec-44	0.0	29.5	14.4	22.0	91.6	14.85
Jan-45	0.0	29.7	13.8	21.8	88.2	11.24
รวม	85.00	123.00	66.30	98.30	361.90	68.69
เฉลี่ยรวมต่อฤดูหนาว	21.25	30.75	16.58	24.58	90.48	17.17
รวมทั้งหมดต่อปี	1783.00	406.50	235.30	324.80	1064.00	210.53
เฉลี่ยในแต่ละเดือน / ปี	148.58	33.88	19.61	26.74	88.67	17.54

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลแปลงศึกษาวิจัยในป่าเต็งรังรุ่น 2

ตารางผนวกที่ 48 แสดงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อัตราการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
1. เพศ		
1. ชาย	79	79
2. หญิง	21	21
2. ช่วงอายุของประชากร		
16 – 25 ปี	14	14
26 – 40 ปี	54	54
41 – 60 ปี	29	29
61 ปีขึ้นไป	3	3
3. สถานภาพ		
1. โสด	14	14
2. สมรส	78	78
3. หย่า/แยกกันอยู่	2	2
4. หม้าย	6	6
4. ระดับการศึกษาสูงสุด		
1. ไม่ได้รับการศึกษา	2	2
2. ระดับประถมศึกษา	73	73
3. ระดับมัธยมศึกษา	18	18
4. ระดับ ปวช / ปวส	7	7
5. ระดับปริญญาตรี	0	0
6. สูงกว่าปริญญาตรี	0	0
5. อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มานาน กี่ปี		
1. 1 – 4 ปี	4	4
2. 5 – 9 ปี	3	3
3. 10 ปีขึ้นไป	30	30
4. อยู่มาตั้งแต่เกิด	63	63
6. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมทั้งตัวท่าน		
1. 1- 2 คน	6	6
2. 2 –4 คน	87	87

ตารางผนวกที่ 48(ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
3. 4 – 6คน	3	3
4. โสด	4	4
7. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้ ได้แก่		
1. ตัวเอง	15	15
2. สามี หรือ ภรรยา	79	79
3. สามี / ภรรยา / บุตร	6	6
4. อื่นๆ(ระบุ).....	0	0
8. ท่านมีที่ดินถือครองเนื้อที่ทำกินทางการเกษตร และอื่นๆ		
จำแนกเป็น	66	66
1. ที่ดินเป็นของตัวเอง	34	34
2. ที่ดินเช่า	0	0
3. ที่ดินทำกินไม่เรียกค่าเช่า	0	0
9. อาชีพ		
1. ทำไร่	0	0
2. ทำนา	0	0
3. ทำสวน	3	3
4. ทำไร่ / ทำนา	11	11
5. ทำนา / ทำสวน	16	16
6. ทำทั้งไร่ / นา / สวน	67	67
7. อื่นๆ	3	3
10. รายได้ / ปี		
1. น้อยกว่า 10,000 บาท	2	2
2. 10,000 – 30,000 บาท	15	15
3. มากกว่า 30,000 บาท	69	69
4. อื่น ๆ	0	0
11. ท่านเข้าใจคำว่า ป่าชุมชนอย่างไร?		
1. รู้จักความหมาย	100	100
2. ไม่รู้จักความหมาย	0	0

ตารางผนวกที่ 48(ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
12. ท่านมีวิธีการอนุรักษ์ป่าบ้านโป่งอย่างไร?		
1. รู้จักวิธีการอนุรักษ์	100	100
2. ไม่รู้จักวิธีการอนุรักษ์	0	0
13. ท่านคิดว่าในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง		
1. เพิ่มขึ้น	2	2
2. ลดลง	62	62
3. เท่าเดิม	28	28
4. ไม่ทราบ	8	8
14. บทบาทของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบป่าบ้านโป่ง		
1. ไม่มีความคิดเห็น	16	16
2. ห้ามตัดต้นไม้	84	84
3. ห้ามนำทุกอย่างออกจากป่า	0	0
4. อื่นๆ (ระบุ)	0	0
15. ท่านคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ป่าลดลง		
1. ชาวบ้านในชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์	2	2
2. คนจากหมู่บ้านอื่น ๆ เข้าไปใช้ประโยชน์	20	20
3. เกิดการใช้ทั้งคนในหมู่บ้านและรอบนอกเข้ามาใช้ประโยชน์	78	78
16. ในหมู่บ้านมีคนที่ทำหน้าที่ดูแลมีหรือไม่มี	61	61
1. มี	49	49
2. ไม่มี		
17. ท่านคิดว่าการมีต้นไม้มาก ๆ ในป่ามีผลทำให้ฝนตกมาก	3	3
1. ไม่ทราบ	5	5
2. ไม่ใช่	92	92
3. ใช่		

ตารางผนวกที่ 48 (ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
18. การอนุรักษ์ทรัพยากรในลุ่มน้ำห้วยใจ๋ควรอนุรักษ์ทรัพยากรใดมากที่สุด		
1. ทรัพยากรน้ำ	2	2
2. ทรัพยากรดิน	1	1
3. ทรัพยากรป่าไม้	4	4
4. ทรัพยากร น้ำ ดิน และป่าไม้	93	93
18. ท่านคิดว่าป่ามีอิทธิพลต่อดินหรือไม่ ในระบบนิเวศ		
1. มีอิทธิพล	95	95
2. ไม่มีอิทธิพล	3	3
3. ไม่ทราบ	2	2
19. ท่านคิดว่าป่ามีอิทธิพลต่อน้ำหรือไม่ ในระบบนิเวศ		
1. มีอิทธิพล	84	84
2. ไม่มีอิทธิพล	2	2
3. ไม่ทราบ	4	4
20. ท่านคิดว่าน้ำมีอิทธิพลต่อดินหรือไม่ ในระบบนิเวศ		
1. มีอิทธิพล	80	80
2. ไม่มีอิทธิพล	6	6
3. ไม่ทราบ	14	14
21. ท่านคิดว่าอิทธิพลของนิเวศป่ามีผลต่อสภาพอากาศหรือไม่		
1. มีอิทธิพล	79	79
2. ไม่มีอิทธิพล	3	3
3. ไม่ทราบ	18	18
22. ท่านพึ่งพาทรัพยากรจากป่าบ้านโป่งมากที่สุด		
1. เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร	63	63
2. เป็นแหล่งอาหาร	31	31
3. เป็นแหล่งนันทนาการ	6	6
23. การบุกรุกป่าบ้านโป่งควรมีกฎหมายลงโทษผู้ที่กระทำผิดหรือไม่		
1. ไม่มี	0	0

ตารางผนวกที่48 (ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
2.	0	0
3. มี	1	1
4. ปรับเป็นจำนวนเงิน	95	95
5. ใช้การกล่าวตักเตือนหากมีการกระทำผิดจะมีการ ลงโทษ	0	0
6. ประจาน	4	4
7. ปรับเป็นของหรือไม่ให้อยู่ในชุมชน		
24. ถ้าป่าบ้านโป่งถูกทำลาย จะเกิดอะไรกับชุมชน	0	0
1. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น	0	0
2. น้ำท่วม	100	100
3. แห้งแล้ง		
25. การเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า	0	0
1. ทุก ๆ วัน	4	4
2. 2-3 วัน / ครั้ง	21	21
3. อาทิตย์ 1-2 ครั้ง	51	51
4. เดือนละ 1-2 ครั้ง	20	20
5. ปีละ 2-3 ครั้ง	4	4
6. ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์	96คน	100 %
26. วิธีการเก็บหาของป่า		
1. เผา	7	8
2. เดินเก็บไปเรื่อยๆ	62	64
3. ใช้อุปกรณ์อื่นๆ	27	28
4. อื่นๆ.....	-	-
27. พื้นที่ที่เข้าไปเก็บหาของป่ามากที่สุด	8	8
1. ป่าเต็งรังด้านใต้อ่าง	11	11
2. ป่าเต็งรังบนสันอ่าง	42	44
3. ป่าเต็งรังใกล้กับฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้	22	23
4. ป่าเบญจพรรณขึ้น	13	14
5. ป่าเบญจพรรณติดกับวัดดอยแท่นพระ		

ตารางผนวกที่ 48(ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
28. จำนวนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแต่ละชนิดที่ผ่านเข้าไป ใช้ประโยชน์สามารถเลือกได้ มากกว่า 1 ข้อ		
1. ป่าเต็งรังด้านใดบ้าง		
ฤดูร้อน	11	12
ฤดูฝน	75	78
ฤดูหนาว	10	10
2. ป่าเต็งรังบนสันอ่าง		
ฤดูร้อน	39	41
ฤดูฝน	47	49
ฤดูหนาว	10	10
3. ป่าเต็งรังใกล้กับฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้		
ฤดูร้อน	22	23
ฤดูฝน	63	65
ฤดูหนาว	11	22
4. ป่าเบญจพรรณขึ้น		
ฤดูร้อน	21	22
ฤดูฝน	60	62
ฤดูหนาว	15	16
5. ป่าเบญจพรรณติดกับวัดดอยแท่นพระ		
ฤดูร้อน	46	48
ฤดูฝน	47	49
ฤดูหนาว	3	3
29. การเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า		
1. ปลา	2	2
2. ล่าสัตว์	4	4
3. หาพืช	0	0
4. สมุนไพร	25	25
5. หาทุกอย่างที่สามารถหาได้	67	70

ตารางผนวกที่ 48 (ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
30. ปริมาณการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์		
1. พืช		
อาหาร	67	70
สมุนไพร	29	30
2. สัตว์		
อาหาร	96	100
สมุนไพร	0	0

ตารางผนวกที่ 48 แสดงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อัตราการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไผ่

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
1. เพศ		
1. ชาย	79	79
2. หญิง	21	21
2. ช่วงอายุของประชากร		
16 – 25 ปี	14	14
26 – 40 ปี	54	54
41 – 60 ปี	29	29
61 ปีขึ้นไป	3	3
3. สถานภาพ		
1. โสด	14	14
2. สมรส	78	78
3. หย่า/แยกกันอยู่	2	2
4. หม้าย	6	6
4. ระดับการศึกษาสูงสุด		
1. ไม่ได้รับการศึกษา	2	2
2. ระดับประถมศึกษา	73	73
3. ระดับมัธยมศึกษา	18	18
4. ระดับ ปวช / ปวส	7	7
5. ระดับปริญญาตรี	0	0
6. สูงกว่าปริญญาตรี	0	0
5. อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มานาน กี่ปี		
1. 1 – 4 ปี	4	4
2. 5 – 9 ปี	3	3
3. 10 ปีขึ้นไป	30	30
4. อยู่มาตั้งแต่เกิด	63	63
6. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมทั้งตัวท่าน		
1. 1- 2 คน	6	6
2. 2 –4 คน	87	87

ตารางผนวกที่ 48(ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
3. 4 – 6คน	3	3
4. โสด	4	4
7. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้ ได้แก่		
1. ตัวเอง	15	15
2. สามี หรือ ภรรยา	79	79
3. สามี / ภรรยา / บุตร	6	6
4. อื่นๆ(ระบุ).....	0	0
8. ท่านมีที่ดินถือครองเนื้อที่ทำกินทางการเกษตร และอื่นๆ		
จำแนกเป็น	66	66
1. ที่ดินเป็นของตัวเอง	34	34
2. ที่ดินเช่า	0	0
3. ที่ดินทำกินไม่เรียกค่าเช่า	0	0
9. อาชีพ		
1. ทำไร่	0	0
2. ทำนา	0	0
3. ทำสวน	3	3
4. ทำไร่ / ทำนา	11	11
5. ทำนา / ทำสวน	16	16
6. ทำทั้งไร่ / นา / สวน	67	67
7. อื่นๆ	3	3
10. รายได้ / ปี		
1. น้อยกว่า 10,000 บาท	2	2
2. 10,000 – 30,000 บาท	15	15
3. มากกว่า 30,000 บาท	69	69
4. อื่น ๆ	0	0
11. ท่านเข้าใจคำว่า ป่าชุมชนอย่างไร?		
1. รู้จักความหมาย	100	100
2. ไม่รู้จักความหมาย	0	0

ตารางผนวกที่ 48(ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
12. ท่านมีวิธีการอนุรักษ์ป่าบ้านโป่งอย่างไร?		
1. รู้จักวิธีการอนุรักษ์	100	100
2. ไม่รู้จักวิธีการอนุรักษ์	0	0
13. ท่านคิดว่าในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง		
1. เพิ่มขึ้น	2	2
2. ลดลง	62	62
3. เท่าเดิม	28	28
4. ไม่ทราบ	8	8
14. บทบาทของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบป่าบ้านโป่ง		
1. ไม่มีความคิดเห็น	16	16
2. ห้ามตัดต้นไม้	84	84
3. ห้ามนำทุกอย่างออกจากป่า	0	0
4. อื่นๆ (ระบุ)	0	0
15. ท่านคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ป่าลดลง		
1. ชาวบ้านในชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์	2	2
2. คนจากหมู่บ้านอื่น ๆ เข้าไปใช้ประโยชน์	20	20
3. เกิดการใช้ทั้งคนในหมู่บ้านและรอบนอกเข้ามาใช้ประโยชน์	78	78
16. ในหมู่บ้านมีคนที่ทำหน้าที่ดูแลมีหรือไม่มี	61	61
1. มี	49	49
2. ไม่มี		
17. ท่านคิดว่าการมีต้นไม้มาก ๆ ในป่ามีผลทำให้ฝนตกมาก	3	3
1. ไม่ทราบ	5	5
2. ไม่ใช่	92	92
3. ใช่		

ตารางผนวกที่ 48 (ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
18. การอนุรักษ์ทรัพยากรในลุ่มน้ำห้วยใจ๋ควรอนุรักษ์ทรัพยากรใดมากที่สุด		
1. ทรัพยากรน้ำ	2	2
2. ทรัพยากรดิน	1	1
3. ทรัพยากรป่าไม้	4	4
4. ทรัพยากร น้ำ ดิน และป่าไม้	93	93
18. ท่านคิดว่าป่ามีอิทธิพลต่อดินหรือไม่ ในระบบนิเวศ		
1. มีอิทธิพล	95	95
2. ไม่มีอิทธิพล	3	3
3. ไม่ทราบ	2	2
19. ท่านคิดว่าป่ามีอิทธิพลต่อน้ำหรือไม่ ในระบบนิเวศ		
1. มีอิทธิพล	84	84
2. ไม่มีอิทธิพล	2	2
3. ไม่ทราบ	4	4
20. ท่านคิดว่าน้ำมีอิทธิพลต่อดินหรือไม่ ในระบบนิเวศ		
1. มีอิทธิพล	80	80
2. ไม่มีอิทธิพล	6	6
3. ไม่ทราบ	14	14
21. ท่านคิดว่าอิทธิพลของนิเวศป่ามีผลต่อสภาพอากาศหรือไม่		
1. มีอิทธิพล	79	79
2. ไม่มีอิทธิพล	3	3
3. ไม่ทราบ	18	18
22. ท่านพึ่งพาทรัพยากรจากป่าบ้านโป่งมากที่สุด		
1. เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร	63	63
2. เป็นแหล่งอาหาร	31	31
3. เป็นแหล่งนันทนาการ	6	6
23. การบุกรุกป่าบ้านโป่งควรมีกฎหมายลงโทษผู้ที่กระทำผิดหรือไม่		
1. ไม่มี	0	0

ตารางผนวกที่48 (ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
2.	0	0
3. มี	1	1
4. ปรับเป็นจำนวนเงิน	95	95
5. ใช้การกล่าวตักเตือนหากมีการกระทำผิดจะมีการ ลงโทษ	0	0
6. ประจาน	4	4
7. ปรับเป็นของหรือไม่ให้อยู่ในชุมชน		
24. ถ้าป่าบ้านโป่งถูกทำลาย จะเกิดอะไรกับชุมชน	0	0
1. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น	0	0
2. น้ำท่วม	100	100
3. แห้งแล้ง		
25. การเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า	0	0
1. ทุก ๆ วัน	4	4
2. 2-3 วัน / ครั้ง	21	21
3. อาทิตย์ 1-2 ครั้ง	51	51
4. เดือนละ 1-2 ครั้ง	20	20
5. ปีละ 2-3 ครั้ง	4	4
6. ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์	96คน	100 %
26. วิธีการเก็บหาของป่า		
1. เผา	7	8
2. เดินเก็บไปเรื่อยๆ	62	64
3. ใช้อุปกรณ์อื่นๆ	27	28
4. อื่นๆ.....	-	-
27. พื้นที่ที่เข้าไปเก็บหาของป่ามากที่สุด	8	8
1. ป่าเต็งรังด้านใต้อ่าง	11	11
2. ป่าเต็งรังบนสันอ่าง	42	44
3. ป่าเต็งรังใกล้กับฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้	22	23
4. ป่าเบญจพรรณขึ้น	13	14
5. ป่าเบญจพรรณติดกับวัดดอยแท่นพระ		

ตารางผนวกที่ 48(ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
28. จำนวนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแต่ละชนิดที่ผ่านเข้าไป ใช้ประโยชน์สามารถเลือกได้ มากกว่า 1 ข้อ		
1. ป่าเต็งรังด้านใดบ้าง		
ฤดูร้อน	11	12
ฤดูฝน	75	78
ฤดูหนาว	10	10
2. ป่าเต็งรังบนสันอ่าง		
ฤดูร้อน	39	41
ฤดูฝน	47	49
ฤดูหนาว	10	10
3. ป่าเต็งรังใกล้กับฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้		
ฤดูร้อน	22	23
ฤดูฝน	63	65
ฤดูหนาว	11	22
4. ป่าเบญจพรรณขึ้น		
ฤดูร้อน	21	22
ฤดูฝน	60	62
ฤดูหนาว	15	16
5. ป่าเบญจพรรณติดกับวัดดอยแท่นพระ		
ฤดูร้อน	46	48
ฤดูฝน	47	49
ฤดูหนาว	3	3
29. การเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า		
1. ปลา	2	2
2. ล่าสัตว์	4	4
3. หาฟืน	0	0
4. สมุนไพร	25	25
5. หาทุกอย่างที่สามารถหาได้	67	70

ตารางผนวกที่ 48 (ต่อ)

คำถาม	จำนวน (คน)	จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ (%)
30. ปริมาณการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์		
1. พืช		
อาหาร	67	70
สมุนไพร	29	30
2. สัตว์		
อาหาร	96	100
สมุนไพร	0	0

[illegible]

ตารางผนวกที่ 50 ปริมาณการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ

คำถาม	ชื่อวิทยาศาสตร์	ราคา /ก.ก	อัตราการใช้ / ก.ก		ราคารวม (บาท)
			บริโภค	ขาย	
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นอาหาร		80	12	226	
1. เห็ดหล่ม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์	40- 50	14	44	
2. เห็ดไข่ห่าน	<i>Amanita vaginata.</i>	50-70	3	9	19040
3. เห็ดขออนขาว	<i>Clitocybe sp.</i>	70-90	6	17	1980
4. เห็ดลม	<i>Lentinus praerigidus</i>	30-50	1	5	720
5. เห็ดถ่าน	<i>Russuta delica</i>	100	25	114	1840
6. เห็ดเพาะ	<i>Astreus hygrometricus</i>	30-50	32	208	240
7. เห็ดแดง	<i>Russula lepida</i>	200	2	9	13900
8. เห็ดโคน	<i>Termitomyces furtiginosus</i>	30	3	7	9600
9. เห็ดครก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์	40-60	5.2	3.8	2200
10. เห็ดก่อ	<i>Tuber melanofporun</i>	50	2.6	28.4	300
11. ผักหวาน	<i>Melientha suavis</i>	15	8.5	465.7	450
12. หน่อไม้	<i>Gigantochloa albociliata mumro</i>	30	0	145.5	1550
13. ผักพ้อคำ	-	7	180	929	7380
14. ดอกตัง	<i>D. tuberculatus -</i>	-	12	-	4440
15. มะไฟ					6503
16. ผักกูด					-
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นสมุนไพร	<i>Tacca intergrifolia. Ker - Gawl</i>	-	2.00		
1. ดิงเหว้า	-	-	5.00		-
2. ใค้ไม่รู้ล้ม	<i>Croton oblongifolius</i>	-	2.50		-
3. เป้าหลวง	<i>Oroxylum indicum (L.)Vrnt</i>	-	10.50		-
4. มะลิไม้	-	-	1.50		-
5. ฝาง	-	-	1.30		-
6. หญ้าหนวดแมว	<i>Chrumulaena oclorata.-</i>	-	5.00		-
7. หญ้าลูกสืบ	<i>Chrumulaena oclorata</i>	-	2.00		-
8. หญ้าวงวาย	-	-	-		-
9. เอื้องหมายนา					-
การใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อเป็นอาหาร	<i>Oecophylla smaragding</i>	50	1.5	23	-
1. ไช้เม็ดแดง	-	-	0.3	-	
2. ไช้จั่น	-	-	-	-	1225
3. งู	-	-	-	-	-
4. หนู	-	-	-	-	-
5. จ๋อนขุย	-	-	-	-	-
6. ตุ่น	-	-	-	-	-
7. ปลา	-				-

ตารางผนวกที่ 51 แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ของประชากรในชุมชนบ้านโป่ง และชุมชนใกล้เคียง

รายการ	เบญจพรรณชั้น	เบญจพรรณ	เต็งรังพัฒนา	เต็งรังแควะ	เต็งรังรุ่น 2
พื้นที่ที่ประชากรเข้าไปเก็บหาของป่ามากที่สุด (%)	23.00	14.00	8.00	11.00	44.00
ปริมาณการเข้าไปใช้ประโยชน์ฤดูร้อน (%)	22.00	48.00	12.00	41.00	23.00
ปริมาณการเข้าไปใช้ประโยชน์ฤดูฝน (%)	62.00	49.00	78.00	49.00	65.00
ปริมาณการเข้าไปใช้ประโยชน์ฤดูหนาว (%)	16.00	3.00	10.00	10.00	22.00
อัตราการใช้บริโภค (ก.ก)	67.20	26.80	123.60	98.50	65.10
อัตราการซื้อขาย (ก.ก)	451.80	260.70	515.00	704.40	363.50
อัตราการใช้รวม (ก.ก)	519.00	287.50	318.60	802.90	428.60
ราคาซื้อขาย (บาท)	12210.00	10957.50	8955.00	21370.00	7325.00
ราคารวม (บาท)	14277.00	11744.50	10595.00	24243.50	7385.00

ตารางผนวกที่ 52 แสดงอัตราการใช้ประโยชน์จากพืช และ สัตว์ในป่าเบญจพรรณขึ้น ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้

การใช้ประโยชน์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ราคา /ก.ก		อัตราการใช้		ราคาที่ขาย	ราคารวม
		(บาท)	บริโภค (ก.ก)	ขาย(ก.ก)	อัตราใช้รวม (ก.ก)	(บาท)	(บาท)
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นอาหาร							
1. เห็ดหล่ม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์	80.00	2.00	55.00	57.00	4400.00	4560.00
2. เห็ดไข่ห่าน	Amanita vaginata.	45.00	1.50	8.00	9.50	360.00	427.50
3. เห็ดถ่าน	Russuta delicata	40.00	0.30	1.00	1.30	40.00	52.00
4. เห็ดแดง	Russula lepida	40.00	6.00	44.00	50.00	1760.00	2000.00
5. เห็ดโคน	Termitomyces furtiginosus	200.00	0.20	1.00	1.20	200.00	240.00
6. เห็ดครก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์	30.00	3.00	7.00	10.00	210.00	300.00
7. เห็ดก่อ	Tuber melanofporum	50.00	2.20	1.80	4.00	90.00	200.00
8. หน่อไม้	Gigantochloa albociliata mumro	15.00	6.50	330.00	336.50	4950.00	5047.50
9. มะไฟ	-	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
10. ผักกูด	-	50.00	25.00	4.00	29.00	200.00	1450.00
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นสมุนไพร							
1. ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3. เป้าหลวง	Croton oblongifolius	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
4. มะลิไม้	Oroxylum indicum (L.)Vrnt	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
5. ฝาง	-	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
การใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อเป็นอาหาร							
1. งู	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. หนู	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. จ่อนขุย	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. สัตว์น้ำ	-	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
5. ตุ่น	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			67.20	451.80	519.00	12210.00	14277.00

ตารางผนวกที่52 แสดงอัตราการใช้ประโยชน์จากพืช และ สัตว์ในป่าเบญจพรรณ กลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ

การใช้ประโยชน์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ราคา /ก.ก		อัตราการการใช้		ราคาที่ขาย	ราคารวม
		(บาท)	บริโภค (ก.ก)	ขาย(ก.ก)	อัตราใช้รวม (ก.ก)	(บาท)	(บาท)
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นอาหาร							
1. เห็ดหล่ม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์	80.00	3.00	69.00	72.00	5760.00	6000.00
2. เห็ดไข่ห่าน	Amanita vaginata.	45.00	5.00	11.00	16.00	720.00	945.00
3. เห็ดถ่าน	Russuta delica	40.00	0.80	2.00	2.80	112.00	144.00
4. เห็ดแดง	Russula lepida	40.00	4.00	41.00	45.00	1800.00	1960.00
5. เห็ดโคน	Termitomyces furtiginosus	200.00	0.50	2.00	2.50	500.00	600.00
6. หน่อไม้	Gigantochloa albociliata mumro	15.00	2.00	135.70	137.70	2065.50	2095.50
7.มะไฟ	-	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นสมุนไพร							
1. ดิงเหว้า	Tacca intergrifolia. Ker - Gawl	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2. มะลิไม้	-	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3. ฝาง	Croton oblongifolius	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
การใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อเป็นอาหาร					0.00	0.00	0.00
1. ปลา	-	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
รวม			26.80	260.70	287.50	10957.50	11744.50

ตารางผนวกที่ 52 แสดงอัตราการใช้ประโยชน์จากพืช และ สัตว์ในป่าเต็งรังพัฒนา กลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ

การใช้ประโยชน์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ราคา /ก.ก		อัตราการใช้		ราคาที่ขาย	ราคารวม
		(บาท)	บริโภค (ก.ก)	ขาย(ก.ก)	อัตราใช้รวม (ก.ก)	(บาท)	(บาท)
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นอาหาร							
1. เห็ดหล่ม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์	80.00	5.00	40.00	45.00	3200.00	3600.00
2. เห็ดไข่ห่าน	Amanita vaginata.	45.00	4.00	15.00	19.00	675.00	855.00
3. เห็ดขอนขาว	Clitocybe sp.	40.00	1.00	4.00	5.00	160.00	200.00
4. เห็ดลม	Lentinus praerigidus	40.00	1.00	8.00	9.00	320.00	360.00
6. เห็ดเพาะ	Astreus hygrometricus	30.00	10.00	48.00	58.00	1440.00	1740.00
7. เห็ดแดง	Russula lepida	50.00	10.00	31.00	41.00	1550.00	2050.00
8. เห็ดโคน	Termitomyces furtiginosus	15.00	1.00	4.00	5.00	60.00	75.00
9. เห็ดก่อ	Tuber melanofporun	50.00	3.00	2.00	5.00	100.00	250.00
ผักพ้อคำ	-	30.00	0.00	35.00	0.00	1050.00	1050.00
10. ดอกตี่ง	D. tuberculatus -	0.00	80.00	320.00	115.00	0.00	0.00
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นสมุนไพร							
1. โดไม่รู้ล้ม	-	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2. หญ้าลูกสืบ	Chrumulaena oclorata.-	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
3. หญ้าวงววย	Chrumulaena oclorata	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
4. เอื้องหมายนา	-	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00
การใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อเป็นอาหาร							
1. ไช้เม็ดแดง	Oecophylla smaragding	50.00	0.30	8.00	8.30	400.00	415.00
2. ปลา	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			123.60	515.00	638.60	8955.00	10595.00

ตารางผนวกที่ 52 แสดงอัตราการใช้ประโยชน์จากพืช และ สัตว์ในป่าเต็งรังแควะ กลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ

การใช้ประโยชน์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ราคา /ก.ก		อัตราการการใช้		ราคาที่ขาย	ราคารวม
		(บาท)	บริโภค (ก.ก)	ขาย(ก.ก)	อัตราใช้รวม (ก.ก)	(บาท)	(บาท)

การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นอาหาร

1. เห็ดหล่ม	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์	80.00	2.00	62.00	64.00	4960.00	5120.00
2. เห็ดไข่ห่าน	Amanita vaginata.	45.00	2.50	10.00	12.50	450.00	562.50
3. เห็ดขอนขาว	Clitocybe sp.	60.00	1.00	2.00	3.00	120.00	180.00
4. เห็ดคลม	Lentinus praerigidus	80.00	3.00	5.00	8.00	400.00	640.00
5. เห็ดถ่าน	Russuta delica	40.00	1.90	3.00	4.90	120.00	196.00
6. เห็ดเพาะ	Astreus hygrometricus	100.00	15.00	66.00	81.00	6600.00	8100.00
7. เห็ดแดง	Russula lepida	40.00	4.00	50.00	54.00	2000.00	2160.00
8. ผักหวาน	Melientha suavis	50.00	2.60	28.40	31.00	1420.00	1550.00
9. ผักพ้อคำ	-	30.00	0.00	70.00	70.00	2100.00	2100.00
10. ดอกตี่ง	D. tuberculatus -	7.00	60.00	400.00	460.00	2800.00	3220.00

การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นสมุนไพร

1. หญ้าลูกสืบ	Chrumulaena oclorata.-	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2. หญ้าหนวดแมว	-	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
3. เอื้องหมายนา	-	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
4. เปลือกไม้รัง		0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

การใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อเป็นอาหาร

1. ไช้ผดแดง	Oecophylla smaragding	50.00	0.30	8.00	8.30	400.00	415.00
2. ไช้จั่น	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ตุ่น	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวม			98.50	704.40	802.90	21370.00	24243.50
-----	--	--	-------	--------	--------	----------	----------

ตารางผนวกที่ 52 แสดงอัตราการการใช้ประโยชน์จากพืช และ สัตว์ในป่าเต็งรังรุ่น 2 กลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไผ่

การใช้ประโยชน์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ราคา /ก.ก		อัตราการการใช้		ราคาที่ขาย	ราคารวม

		(บาท)	บริโภค (ก.ก)	ขาย(ก.ก)	อัตราใช้รวม (ก.ก)	(บาท)	(บาท)
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นอาหาร							
1. เห็ดขอนขาว	Clitocybe sp.	60.00	1.00	3.00	4.00	180.00	240.00
2. เห็ดลม	Lentinus praerigidus	80.00	2.00	4.00	6.00	480.00	480.00
3. เห็ดแดง	Russula lepida	40.00	4.00	50.00	54.00	2160.00	2160.00
4. เห็ดโคน	Termitomyces furtiginosus	50.00	8.00	42.00	50.00	2500.00	2500.00
5. เห็ดครก	ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์	30.00	0.50	3.00	3.50	105.00	105.00
6. ผักพ้อคำ	-	30.00	1.50	40.50	42.00	1260.00	1260.00
7. ดอกตัง	D. tuberculatus -	0.00	40.00	209.00	249.00	0.00	0.00
การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อเป็นสมุนไพร							
1. ฝรั่ง	-	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2. เปลือกไม้	-	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3. หญ้าลูกลิบ	Chrumulaena oclorata.-	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
การใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อเป็นอาหาร							
1. ไช้เม็ดแดง	Oecophylla smaragding	50.00	0.80	12.00	12.80	640.00	640.00
2. งู	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ตุ่น	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			65.10	363.50	428.60	7325.00	7385.00

ตารางผนวกที่ 53 แสดงความเหมาะสมของปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช

Level	pH	N (%)	C (%)	C : N	Avail P ppm	Total P	CEC	Exchangeabil (ppm)				Bases
							Meq/100 g	Ca	Mg	K	Na	saturation %
Vary high	>8.5	>1.0	>20.1	>24.0	>50.0	-	>40.0	>4000	>850	>300	>450	80 – 100
	7.6 – 8.4											
High	7.1-7.5	0.5 – 1.0	10.0 – 20.0	16.0-24.0	40.0-50.0	>1000	25.0-40.0	2000-4000	500-800	200-300	160-450	60-80
	6.6-7.0											
Medium	6.0-6.5	0.2-0.5	4.0-10.0	12.0-16.0	20.0-40.0	200-1000	15.0-25.0	1000-2000	60-500	100-200	70-160	20-60
	5.3-5.9											
Low	4.6-5.2	0.1-0.2	2.0-4.0	10.0-12.0	10.0-20.0	<200	5.0-15.0	400-1000	30-60	40-100	20-70	<20
Vary low	<4.5	<0.1	<10.0	<10.0	<10.0		<5.0	<400	<30	<40	<20	

ที่มา : จากภาควิชาดินและปุ๋ย คณะ ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตารางผนวกที่ 54 แสดงการวิเคราะห์พันธุ์ไม้ทั้งหมดในกลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ

รายการ	ป่าเบญจพรรณชื้น	ป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	ป่าเต็งรังแควระ	ป่าเต็งรังรุ่น 2
จำนวนไม้ต้น	234.00	272.00	579.00	961.00	952.00
จำนวนไม้ชั้นกลาง	73.00	43.00	101.00	84.00	93.00
จำนวนไม้ชั้นลูกไม้	18.00	8.00	8.00	12.00	35.00
จำนวนไม้คลุมดิน	130.00	158.00	210.00	263.00	212.00
การปกคลุมไม้ต้น	89.00	67.00	85.00	80.00	75.00
การปกคลุมไม้ชั้นกลาง	84.00	61.00	87.00	58.00	63.00
การปกคลุมไม้ชั้นล่าง	32.00	61.00	78.00	45.00	35.00
ความสูงเฉลี่ย	8.22	9.54	5.49	4.08	4.20
การปกคลุมเรือนยอดเฉลี่ย / ต้น	4.70	4.55	3.19	2.69	2.63
ชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้น	57.00	41.00	51.00	27.00	26.00
ชนิดพันธุ์ไม้ชั้นกลาง	23.00	19.00	10.00	9.00	11.00
ชนิดพันธุ์ไม้คลุมดิน	25.00	19.00	28.00	16.00	26.00
สมุนไพรจากไม้ยืนต้น	26.00	15.00	24.00	16.00	13.00
สมุนไพรจากไม้ชั้นกลาง	11.00	8.00	12.00	8.00	16.00

สมุนไพรจากไม้คลุมดิน

24.00

19.00

15.00

20.00

12.00