

## บทที่ 2

### การตรวจเอกสาร

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย หากการเก็บรักษามล็ดข้าวในโรงเก็บที่ไม่เหมาะสม ข้าวภายในโรงเก็บก็สามารถถูกแมลงศัตรูโรงเก็บหลายชนิดเข้าทำลายได้ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเสื่อมหรือการสูญเสียของเมล็ดหรือผลิตผลคือ 1) ชนิดของเมล็ดพืช 2) สภาพแวดล้อมก่อนการเก็บรักษา 3) สภาพแวดล้อมในขณะที่เก็บรักษาหรือสภาพแวดล้อมภายในโรงเก็บ นอกจากนี้ก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบนิเวศวิทยาในโรงเก็บด้วยซึ่งต้องพิจารณาสองส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) องค์ประกอบทางกายภาพ เช่น แบบหรือลักษณะโครงสร้างของโรงเก็บ เมล็ดหรือผลิตภัณฑ์ และความชื้น เป็นต้น และ 2) องค์ประกอบทางชีวภาพ เช่น แมลง ไร หนู และนก เป็นต้น (ชุมพล, 2533) ซึ่งยอมรับกันว่าแมลงเป็นศัตรูที่สำคัญ และทำความเสียหายให้ข้าวหลังการเก็บเกี่ยวมากที่สุด เนื่องจากแมลงมีขนาดเล็กต้องการอาหารในการดำรงชีวิตน้อย สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว และเจริญเติบโตได้ในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับอุณหภูมิ และความชื้นในประเทศไทยเหมาะสมกับการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลง ดังนั้นการแพร่ระบาดของแมลงจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว (สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร, 2548) แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวเป็นปัญหาสำคัญที่พบอยู่ทั่วโลก แม้ว่าในแต่ละแห่งจะพบแมลงศัตรูที่สำคัญเฉพาะพืชเพียง 2-3 ชนิดเท่านั้น แต่เนื่องจากแมลงศัตรูโรงเก็บสามารถแพร่กระจายได้ไปทั่วโลกซึ่งเป็นลักษณะที่พิเศษกว่าแมลงชนิดอื่น ๆ คือ สามารถอาศัย และมีชีวิตอยู่ได้ทุกสภาพอากาศ และภูมิภาคต่าง ๆ เนื่องจากแมลงเหล่านี้มีการเคลื่อนย้าย และแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางโดยติดไปกับผลิตผลที่เป็นสิ่งบริโภครวมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทั่วโลก เราจึงพบว่าแมลงศัตรูโรงเก็บมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ระบาดได้ทั้งปี และสร้างความเสียหายของเมล็ดอีกทั้งยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะเวลา เช่น ระยะก่อนการเก็บ ขณะที่เก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว ขณะทำการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา (บุษรา, 2547) ลักษณะการทำลายของแมลงต่อผลิตผลเกษตร ได้แก่ การกัดกิน หรือแทะเล็มภายนอก คือการที่แมลงอาศัย และทำลายอยู่ภายนอกเมล็ด (external feeder) ทำความเสียหายเฉพาะภายนอกโดยทำให้เกิดขุย ผิวของเปลือก ผิวของเมล็ด หรือผลิตผลถูกทำลายคุณภาพ ตลอดจนชักใยให้เมล็ดพืช หรือผลิตผลเกาะติดกันเป็นก้อน รวมถึงพวกที่กัดกินเศษอาหาร แมลงประเภทนี้ได้แก่ ผีเสื้อข้าวสาร มอดแป้ง ไร และเหาหนังสือ การที่แมลงอาศัยกัดกินอยู่

ภายในเมล็ด (internal feeder) คือการที่แมลงอาศัย และทำลายอยู่ภายในเมล็ด โดยตัวเต็มวัยของแมลงจะวางไข่อยู่ที่ผิวภายนอกเมล็ดหรือวางไข่ภายในเมล็ด เมื่อฟักไข่เป็นตัวหนอนจะเข้าไปภายในกัดกินเจริญเติบโตจนกระทั่งครบวงจรชีวิต ตัวเต็มวัยจะเจาะเมล็ดออกมาทำให้เป็นรู และภายในเป็นโพรง แมลงประเภทนี้ได้แก่ ค้างคาวข้าว ค้างคาวโพด ผีเสื้อข้าวเปลือก และมอดหัวป้อม (สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร, 2548)

นอกจากนี้แมลงศัตรูโรงเก็บยังสร้างความเสียหายให้กับเมล็ดพืชที่เก็บไว้ในโรงเก็บ ซึ่งอาจแบ่งความเสียหายได้ดังนี้ สูญเสียน้ำหนัก สูญเสียคุณค่าทางอาหาร สูญเสียความงอก สูญเสียคุณภาพ สูญเสียเงิน และสูญเสียชื่อเสียง (พรทิพย์ และคณะ, 2548)

### มอดพื้นเลื้อย

มอดพื้นเลื้อยเป็นแมลงศัตรูโรงเก็บชนิดหนึ่งที่สามารถทำลายข้าวสาร และธัญพืชหลาย ๆ ชนิด นอกจากนั้นยังพบการเข้าทำลายในข้าวสารบรรจุถุง และสร้างความเสียหายทางด้านชื่อเสียงให้กับผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง มอดพื้นเลื้อย (Sawtoothed grain beetle) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Oryzaephilus surinamensis* (Linnaeus) มีขนาดลำตัวประมาณ 2.5 - 3.0 มิลลิเมตร จัดอยู่ในอันดับ Coleoptera วงศ์ Silvanidae ลักษณะการทำลายของมอดพื้นเลื้อยไม่สามารถทำลายเมล็ดพืชได้ด้วยตัวเองซึ่งมักพบการเข้าทำลายต่อจากแมลงชนิดอื่น หรือเมล็ดที่มีรอยแตกอยู่แล้ว ตัวเต็มวัยจะทะลุเปลือกที่ผิวเมล็ดสามารถกัดกินเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดธัญพืชแปรสภาพที่แตกหักได้ เป็นแมลงศัตรูสำคัญของข้าวสาร และธัญพืช (พรทิพย์ และคณะ, 2548) มอดพื้นเลื้อยตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลแดงส่วนอกสีค่อนข้างคล้ำกว่าส่วนอื่นเล็กน้อย ที่ส่วนอกด้านข้างมีขีดแหลมเล็กยื่นออกมาข้างละ 6 ขีด ซึ่งทำให้สามารถจำแนกแมลงชนิดนี้ออกจากแมลงชนิดอื่นได้โดยง่าย มอดพื้นเลื้อยมีอุปนิสัยขบถวและมักหลบซ่อนอยู่ในอาหารจนกว่าจะถูกรบกวนจึงขึ้นมาบนผิวของอาหาร มอดพื้นเลื้อยเป็นแมลงที่กินนอกเมล็ดพืช และจะสามารถกัดกินเมล็ดได้หลายเมล็ด แมลงเพศเมียวางไข่บนอาหารตามพื้น หรือตามซอกของถุง แมลงตัวหนึ่ง ๆ วางไข่ได้ 45 - 285 ฟอง โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ไข่มีขนาด 0.720 x 0.242 มิลลิเมตร (Kucerova and Stejskal, 2001) มีสีขาวเรียวยาวไม่รวมบริเวณตรงกลาง และมีผิวเรียบ (กุสุมา และคณะ, 2548) หนอนมีลำตัวเรียวยาวสีขาวนวล ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ลอกคราบ 2 - 5 ครั้ง จึงเข้าดักแด้โดยใช้เศษอาหารเป็นปลอกหุ้มตัว ลักษณะเด่นของดักแด้คือ ด้านข้างของส่วนอกจะมีรยางค์เล็ก ๆ ยื่นออกมาข้างละ 6 เส้น ระยะดักแด้ 6 - 10 วัน วงจรชีวิตใช้เวลา 24 - 30 วัน ตัวเต็มวัยอยู่ได้นาน 6 - 10 เดือน และมอดพื้นเลื้อยมีอุปนิสัยชอบกัดกินตรงจุดงอกของเมล็ด (germ) มอดพื้นเลื้อยพบการแพร่กระจายไปทั่วโลก ในประเทศไทยมักพบทุกจังหวัด

ที่มีโรงสีข้าว และยุ้งข้าว ระบาดกระจายทั้งปีในยุ้งข้าวเปลือกแต่มีจำนวนไม่มากนัก พบแพร่ระบาดมากในดอนปลายปีหรือก่อนเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีเล็กน้อย (พรทิพย์ และคณะ, 2548)

### ก๊าซธรรมชาติโอโซน

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ เช่น มอดพื้นเลื้อยนิยมใช้สารรมเมทิลโบรไมด์ และ สารรมฟอสฟีน ซึ่งเป็นสารเคมีทำให้มอดพื้นเลื้อยเกิดความต้านทานต่อสารรมทั้งสองชนิด ดังนั้น การใช้ก๊าซโอโซนจึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันกำจัดมอดพื้นเลื้อยที่มีความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนได้ (Sousa *et al.*, 2008) ก๊าซโอโซน (ozone หรือ  $O_3$ ) เป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยออกซิเจน 3 อะตอม ปรากฏอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก และมีการใช้งานในทางอุตสาหกรรม และเครื่องใช้ตามบ้านทั่วไป ก๊าซโอโซนถูกค้นพบครั้งแรกโดย คริสเตียน ฟรีดริช เซินไบน์ (Christian Friedrich Schönbein) นักเคมีชาวเยอรมัน ในปี ค.ศ. 1840 โดยตั้งชื่อตามภาษากรีก คำว่า ozein ซึ่งแปลว่ากลิ่น โอโซนเข้มข้นที่มีสีฟ้าที่อุณหภูมิ และความดันมาตรฐาน (Standard Temperature ND Pressure; STP) เมื่ออุณหภูมิลดลงถึง  $-112$  องศาเซลเซียส โอโซนจะเป็นของเหลวสีน้ำเงิน และเมื่ออุณหภูมิลดต่ำกว่า  $-193$  องศาเซลเซียส ก็จะกลายเป็นของแข็งสีดำ ปัจจุบันมีการนำก๊าซโอโซนไปใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น การฆ่าเชื้อโรค (Environmental Protection Agency, 1999) คือ ก๊าซโอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่า และรวดเร็วกว่าคลอรีน 3,125 เท่า และยังไม่เหลือสารตกค้าง (Kim *et al.*, 1999) การฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซนในการผลิตน้ำดื่ม (โอโซนนิค อินเตอร์เนชันแนล, 2551) ใช้ฆ่าเชื้อในเครื่องมือทางการแพทย์ ใช้กำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และสารฆ่าแมลง เป็นต้น (ZhangGui *et al.*, 2003)

ก๊าซโอโซนเป็นตัว oxidation ที่ดี สามารถทำให้การทำงานของปอดของมนุษย์ทำงานผิดปกติ และเป็นสาเหตุทำให้ปอดของมนุษย์เสียหาย และเกิดการอักเสบ เช่น เมื่อสัมผัสกับก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 0.1-0.3 ppm เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง จะทำให้รู้สึกแสบจมูก และคอ ที่ความเข้มข้น 1.0-2.0 ppm จะทำให้ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ (ตาราง 2.1) เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยา oxidation กับเซลล์ epithelial และ surfactant ซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในปอดของมนุษย์ หากมนุษย์ได้รับปริมาณที่มากกว่าปกติ คือ 0.08 ppm เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งจะมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพของมนุษย์ (ตาราง 2.2) และทำให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของโปรตีน dityrosine และ tyrosine ทำให้โปรตีนเสียสภาพไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และทำให้เซลล์ตายในที่สุด (Wang *et al.*, 2002) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cross *et al.* (1998) ว่าโปรตีน dityrosine และ tyrosine จะเป็นตัวชี้วัดอัตราการเสียหายของโปรตีนที่ถูกทำลายด้วยปฏิกิริยา oxidation และเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมที่สูงขึ้นเช่นกัน

ตาราง 2.1 ระดับความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่มีผลทางสุขภาพ

| ระดับของโอโซน (ppm) | ข้อมูลด้านสุขภาพ                              |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 0.02-0.05           | สามารถไต่กลิ่น                                |
| 0.1-0.3             | ใน 2-3 ชั่วโมง จะรู้สึกแสบจมูก และคอ          |
| 0.6-0.8             | ใน 2-3 ชั่วโมง จะมีการกระตุ้นระบบทางเดินหายใจ |
| 1.0-2.0             | ใน 2-3 ชั่วโมง จะทำให้ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ |
| 10                  | อันตรายต่อสุขภาพไม่ควรสัมผัสเกิน 60 นาที      |
| 20                  | อันตรายต่อสุขภาพไม่ควรสัมผัสเกิน 10 นาที      |

ที่มา : ชมพูศักดิ์ และ เทพพนม (2540)


ตาราง 2.2 ผลกระทบต่อสุขภาพ และค่าความปลอดภัยมาตรฐานของก๊าซโอโซน

| ผลกระทบต่อสุขภาพ<br>(Health Effects)                                                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factors)                                                                                                                                                                                                                          | ค่ากำหนดมาตรฐาน<br>(Health Standards)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ที่ได้รับอาจจะได้ผลกระทบดังต่อไปนี้:<br><br>1. ปอดมีประสิทธิภาพน้อยลง<br>2. มีปัญหาหอบหืด<br>3. ระคายเคืองคอ ไอ<br>4. เจ็บหน้าอกหายใจไม่ออก<br>5. ปอดอักเสบ<br>6. ดิฉเชื่อในระบบทางเดินหายใจ | ปัจจัยที่จะเพิ่มความเสื่อ ความรุนแรงของสุขภาพมีต่อไปนี้:<br><br>1. ปริมาณของโอโซนในอากาศเข้มข้นมากขึ้น<br>2. สัมผัสโอโซนเป็นเวลายาวนานขึ้น เพิ่มปัญหาสุขภาพมากขึ้น<br>3. ออกกำลังกายในที่ที่มีโอโซนปริมาณมาก<br>4. มีปัญหาโรคปอด เช่น โรคหอบหืดอยู่แล้ว | 1. FDA หรือ อย. แห่งสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดว่าเครื่องผลิตโอโซนไม่ควรผลิตโอโซนเกิน 0.05 ppm (ส่วนในล้านส่วน) สำหรับใช้ภายในอาคาร<br>2. OSHA หรือ (Occupational Safety and Health Administration) ตั้งข้อกำหนดว่า ไม่ควรทำงานในบริเวณที่มีความเข้มข้นของก๊าซโอโซนเกิน 0.10 ppm เกินกว่า 8 ชั่วโมง<br>3. สถาบัน NIOSH หรือ (National Institute of Occupational Safety and Health) ตั้งข้อกำหนดว่า ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีโอโซนเกิน 0.10 ppm ไม่ว่ากรณีใด |

ที่มา : Environmental Protection Agency (1999)

### หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน

เครื่องผลิตก๊าซโอโซนโดยทั่วไปจะใช้หลักการของ electric discharge ก็คือสนามไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ออกซิเจนโมเลกุล ( $O_2$ ) แตกตัวเป็นออกซิเจนอะตอม (O) แล้วรวมกับออกซิเจนโมเลกุลตัวอื่น ๆ กลายเป็นโอโซน ( $O_3$ ) (ภาพ 2.1) (Mason *et al.*, 1997) ซึ่งก๊าซโอโซนสามารถกำจัดแมลงโดยการทำให้โปรตีนถูกทำลายโดยปฏิกิริยา oxidation ทำให้มีผลกระทบต่อระบบหายใจของแมลง ส่งผลให้มีอัตราการเกิด เมตาบอลิซึม (metabolism) และการขยายของหลอดลมสูงขึ้นซึ่งมีผลต่อสารตั้งต้นที่ใช้ในการหายใจ ทำให้การหายใจล้มเหลว (Chown and Gaston, 1999) จากการศึกษาของ Oliveira *et al.* (2007) พบว่าน้ำหนักรักตัว และอัตราการหายใจของแมลง มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เกิดจากการกิจกรรมของแมลง และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายในร่างกาย ซึ่งตัวแปรทั้งสองทำให้ทราบถึงปริมาณการหายใจของแมลง (Chown and Gaston, 1999) แต่ขัดแย้งกับการศึกษาของ Sousa *et al.* (2008) พบว่าลักษณะของแมลงแต่ละชนิดมีการหายใจและน้ำหนักรักตัวแตกต่างกัน แต่อัตราการหายใจ และน้ำหนักรักตัวไม่มีผลต่อความอ่อนแอของแมลงต่อก๊าซโอโซน



ภาพ 2.1 ลักษณะการเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนไปเป็นก๊าซโอโซนด้วยเครื่องกำเนิดโอโซน  
ที่มา: ณรงค์ (2552)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซโอโซนในผลผลิตทางการเกษตรมีดังนี้ ธนะชัย และอรุณทัย (2545) รายงานว่า การให้ก๊าซโอโซนแก่ผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิในอัตรา 100 มิลลิกรัม/ชั่วโมง เป็นเวลา 30, 40 และ 60 นาที ก่อนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบว่า ก๊าซโอโซนสามารถลดอัตราการเน่าเสียของผลได้เป็นเวลา 24 วัน สิริริยา และธนะชัย (2545) รายงานว่า

ลำไยที่ผ่านการรมด้วยก๊าซโอโซนสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าผลลำไยที่ไม่ได้รมด้วยก๊าซโอโซน 6-9 วัน และผลลำไยที่ได้ผ่านการรมก๊าซโอโซนเป็นเวลา 30 นาที สีเปลือกมีความสว่าง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด ต่อมาได้มีการศึกษาการรมลำไยสดด้วยก๊าซโอโซน สามารถลดการเกิดโรคระหว่างการเก็บรักษา เมื่อรมด้วยก๊าซโอโซนเป็นเวลา 30 นาทีที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ชั่วโมงนั้นเหมาะสม พบว่ามีปริมาณเปอร์ออกไซด์ทั้งหมดในเปลือกผลลำไยมากกว่าในเนื้อลำไย เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมด้วยก๊าซโอโซนที่ 0, 60 และ 90 นาที และปริมาณเปอร์ออกไซด์ในเปลือกผลจะมีเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 1 หลังจากการรมด้วยก๊าซโอโซน และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ส่วนในเนื้อผลพบการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ศรัณยา และคณะ, 2549) ผลเงาที่ผ่านการรมด้วยก๊าซโอโซนในความเข้มข้น 1 ppm เป็นเวลานาน 30 นาที สามารถลดปริมาณเชื้อราที่ผิวผลได้ 93.9 เปอร์เซ็นต์ (ดวงธิดา และคณะ, 2549)

การใช้ก๊าซโอโซนในการควบคุมแมลงสามารถลดความเสียหายของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลกซึ่งเกิดจากแมลงได้ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (Callahan, 2003) มีรายงานการใช้ก๊าซโอโซนในการกำจัดมอดพินเลื้อยที่อยู่ในข้าวบาร์เลย์ที่ระดับ 0.66 ถึง 0.83 มิลลิกรัม/นาฬิกา หรือ 878-1102 ppm เป็นเวลา 18 ชั่วโมง กำจัดตัวเต็มวัยมอดพินเลื้อยได้ 46 เปอร์เซ็นต์ (Yoshida, 1974) จากการใช้ก๊าซโอโซนกำจัดมอดพินเลื้อยที่เข้าทำลายอินทผลัม (date) พบว่าระยะไข่กับระยะดักแด้ของมอดพินเลื้อยมีแนวโน้มอ่อนแอต่อก๊าซโอโซน ซึ่งไข่ และดักแด้ของมอดพินเลื้อยมีการตายอย่างสมบูรณ์เมื่อได้รับก๊าซโอโซน 7 ppm เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และมอดพินเลื้อยระยะหนอนกับตัวเต็มวัยในผลอินทผลัมที่ใช้ก๊าซโอโซนเพิ่มขึ้นเป็น 30 ppm ใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมง จึงทำให้แมลงตายอย่างสมบูรณ์ (Al-Ahmadi *et al.*, 2009) กิจกรรมการหายใจของแมลงในระยะต่าง ๆ อาจมีบทบาทสำคัญต่อการตอบสนองของก๊าซโอโซน ซึ่งโดยปกติแล้วแมลงในกลุ่มที่มีการถอดรูปสมบูรณ์แบบ (complete metamorphosis) ระยะไข่ และระยะดักแด้ มีกิจกรรมการหายใจ และการใช้ออกซิเจนน้อยกว่าระยะอื่น ๆ นอกจากนี้ ไข่ของแมลงยังมีโอกาสที่จะสูญเสียน้ำได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับระยะอื่น ๆ (Schmolz and Lamprecht, 2000) แมลงต่างชนิดกันมีการตอบสนองต่อก๊าซโอโซนแตกต่างกัน แมลงศัตรูในโรงเก็บ เช่น มอดแป้ง และด้วงงวงข้าว ในการทดลองของ Kells *et al.* (2001) เมื่อรมด้วยก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 25-50 ppm เป็นระยะเวลา 3-5 วัน ทำให้มอดแป้ง และด้วงงวงข้าวโศก มีอัตราการตายมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มปริมาณก๊าซโอโซนมากขึ้นจะช่วยใช้เวลาการใช้ก๊าซโอโซนลดลง ซึ่ง Yoshida (1974) รายงานว่า ก๊าซโอโซนที่ใช้ในความเข้มข้น 95 -120 ppm ให้ค่า  $LT_{95} = 70$  นาที ในขณะที่การทดลองของ Mason *et al.* (1997) ใช้ก๊าซโอโซนที่ระดับความเข้มข้นต่ำเพียง 5 ppm ใช้เวลายาวนานกว่าเป็น 3-5 วัน จึงจะทำให้แมลงตายอย่างสมบูรณ์ จากการศึกษาของ Erdman (1979) รายงานว่า เมื่อใช้ก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 95 -115 ppm เป็น

ระยะเวลา 3.5 – 6 ชั่วโมงทำให้ มอดแป้งทั้ง 2 ชนิดคือ *Tribolium confusum* และ *T. castaneum* มี อัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาของ Kells *et al.* (2001) เมื่อรมก๊าซโอโซนที่ระดับความเข้มข้น 50 ppm เป็นเวลา 3 วัน ภายในโรงเก็บข้าวโพดน้ำหนักรวม 8.9 ตัน พบว่ามอดแป้งที่ระบาดใน ข้าวโพดมีเปอร์เซ็นต์การตายของระยะตัวเต็มวัยอยู่ในช่วง 92-100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ก๊าซโอโซนกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ *Hypothenemus hampei* ซึ่งเป็นแมลงศัตรู เข้าทำลายเจาะผลกาแฟสด และกาแฟกะลา เมื่อรมด้วยก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 10,000 ppm ที่ อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสในสภาพสุญญากาศนาน 6 ชั่วโมง พบว่ามีแมลงทุกระยะมีการตายอย่าง สมบูรณ์ (Armstrong, 2008) การรมก๊าซโอโซนในการกำจัดแมลงพบว่า มีปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพหลายปัจจัย เช่น หากมีความชื้นสัมพัทธ์สูง ก๊าซโอโซนจะทำปฏิกิริยากับน้ำที่มีอยู่ใน อากาศทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงลดลง ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่จะทำให้ลด ประสิทธิภาพของก๊าซโอโซนได้ ความเข้มข้นของก๊าซโอโซน และระบบสุญญากาศ ปัจจัยดังกล่าว มีผลต่อการกำจัดแมลงทั้งสิ้น (Hollingsworth and Armstrong, 2005)

อย่างไรก็ตามก๊าซโอโซนมีประสิทธิภาพแทรกซึมผ่านวัตถุได้ไม่ดีเท่ากับการใช้สารเคมีรม ผลผลิต และการใช้ก๊าซโอโซนรมเพื่อกำจัดแมลงในข้าวสาลี น้ำหนัก 2 กิโลกรัม พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ การตายลดลง หรือน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์การตายในกรรมวิธีที่รมด้วยก๊าซโอโซนกับแมลงโดยตรง (Isikber and Oztenkin, 2009)