

T 161907

ภาพันท์ เจริญสวรรค์ : ความชุกของภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (PREVALENCE OF DEPRESSION AFTER STROKE IN PHYSICAL REHABILITATION PATIENTS AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL) อาจารย์ที่ปรึกษา :รศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ, 80 หน้า ,ISBN : 974-17-4254-1

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความวิตกกังวลและความซึมเศร้า (Hospital anxiety and depression ฉบับภาษาไทย), แบบสอบถามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel ADL index) , แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม ส่วนที่ II (The Personal Resource Questionnaires PRQ part II) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test, Stepwise multiple regression analysis

ผลการวิจัยพบว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 38.8 ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้ามี 4 ปัจจัย คือ อายุที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญที่ $p < 0.05$ ระยะเวลาที่ป่วยมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญที่ $p < 0.05$ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญที่ $p < 0.001$ และแรงสนับสนุนทางสังคมในทุกด้านต่างมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญที่ $p < 0.001$ เมื่อทำการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ปัจจัยพยากรณ์ภาวะซึมเศร้าได้แก่ระยะเวลาที่ป่วยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.05$ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันที่ลดลงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.001$ และแรงสนับสนุนทางสังคมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < 0.05$

4575239730 MAJOR : PSYCHIATRY

KEY WORDS : DEPRESSION / STROKE / PHYSICAL REHABILITATION / KING

CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL

PAPAN JARERNSWAN : PREVALENCE OF DEPRESSION AFTER STROKE IN

PHYSICAL REHABILITATION PATIENTS AT KING CHULALONGKORN

MEMORIAL HOSPITAL .THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF.NANTIKA

THAVICHACHART,MD.;80PP ISBN : 974-17-4254-1

The purpose of this study was to examine the prevalence of depression and associated factors of 85 stroke patients who come to attend physical rehabilitation programs at King Chulalongkorn Memorial Hospital. The instruments used comprised of demographic data, Thai version of Hospital Anxiety and Depression scale, The Barthel ADL index, The Personal Resource Questionnaires : PRQ Part II. The data were analyzed for descriptive statistic : percentage, mean, standard deviation, Chi-square test, Stepwise multiple regression analysis by SPSS for Windows

The result of this study were as follows : Prevalence of depression was 38.8%. There were 4 factors associated with depression .Elderly age was statistical significant related with depression at $p < 0.05$, duration after stroke was statistical significant related depression at $p < 0.05$. Activities Daily Living was statistical significant related with stroke at $p < 0.001$, and social support was statistical negative related with depression every subscale at $p < 0.001$.After analyzed by stepwise multiple regression ,factors still predicted depression were duration after stroke statistical significant at $p < 0.05$, Activities Daily Living statistical significant at $p < 0.001$, and social support statistical significant at $p < 0.05$