

ตารางผนวกที่ 1 การเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลาสลิดที่เลี้ยงในบ่อดินด้วยฟางข้าวร่วมกับมูลไก่แห้งในอัตราส่วนต่างกัน 3 ระดับและชุดควบคุม ภายในเวลา 168 วัน

เวลา (วัน)	การเจริญเติบโต							
	ชุดควบคุม(มูลไก่แห้ง)		อัตราส่วน ฟางข้าว : มูลไก่แห้ง					
			1 : 1		2 : 1		3 : 1	
	ความยาวตัว (ซม.)	น้ำหนักตัว (กรัม)	ความยาวตัว (ซม.)	น้ำหนักตัว (กรัม)	ความยาวตัว (ซม.)	น้ำหนักตัว (กรัม)	ความยาวตัว (ซม.)	น้ำหนักตัว(กรัม)
1	5.5±0.21	2.20±0.08	5.5±0.21	2.20±0.08	5.5±0.21	2.2±0.08	5.5±0.21	2.20±0.08
30	8.0±0.45	7.28±0.90	7.3±0.25	5.68±0.91	7.1±0.15	5.67±1.07	6.9±0.61	5.59±0.84
60	7.5±0.16	6.24±0.77	7.6±0.35	6.97±1.01	8.2±0.18	8.12±1.35	8.4±0.17	7.54±0.81
90	9.1±0.69	11.50±2.31	9.7±0.31	14.38±1.70	10.0±0.27	15.27±1.76	9.4±0.32	12.77±1.37
120	10.2±0.47	15.62±1.85	12.1±0.76	25.27±5.15	11.6±0.38	22.29±2.43	11.4±0.57	22.01±3.66
150	9.9±0.59	14.11±2.51	13.5±0.87	34.24±6.13	11.9±0.35	24.82±3.48	11.4±0.38	21.55±3.08
168	9.9±0.23	14.22±1.13	13.2±0.35	32.70±2.55	12.0±0.42	25.01±3.20	11.5±0.15	23.00±0.99

ตารางผนวกที่ 2 แสดงอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) ของพลาสติกที่เลี้ยงในบ่อดินด้วยฟางข้าวร่วมกับมูลไก่แห้งในอัตราส่วนต่างกัน 3 ระดับ และชุดควบคุม ภายในเวลา 168 วัน

เวลา (วัน)	อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)															
	ชุดควบคุม(มูลไก่แห้ง)				อัตราส่วน ฟางข้าว : มูลไก่แห้ง											
					1 : 1				2 : 1				3 : 1			
	ซ้ำที่1	ซ้ำที่2	ซ้ำที่3	เฉลี่ย	ซ้ำที่1	ซ้ำที่2	ซ้ำที่3	เฉลี่ย	ซ้ำที่1	ซ้ำที่2	ซ้ำที่3	เฉลี่ย	ซ้ำที่1	ซ้ำที่2	ซ้ำที่3	เฉลี่ย
30	4.0	4.4	3.5	3.97±0.42	3.6	3.3	2.5	3.13±0.55	2.8	2.7	3.8	3.12±0.60	3.6	3.1	2.6	3.08±0.50
60	1.7	1.5	1.9	1.73±0.20	2.0	1.6	2.1	1.91±0.25	2.5	2.1	1.9	2.16±0.27	1.9	2.0	2.2	2.05±0.18
90	2.1	1.6	1.8	1.82±0.22	2.2	2.0	2.0	2.08±0.13	2.2	2.2	2.0	2.15±0.13	1.8	2.0	2.0	1.95±0.12
120	1.7	1.5	1.7	1.63±0.10	2.0	1.9	2.2	2.02±0.16	2.0	1.9	1.9	1.93±0.09	1.8	2.1	1.8	1.91±0.13
150	1.2	1.1	1.4	1.23±0.12	1.9	1.7	1.8	1.82±0.12	1.7	1.5	1.7	1.61±0.10	1.5	1.6	1.4	1.59±0.10
168	1.1	1.1	1.2	1.11±0.05	1.6	1.6	1.7	1.61±0.05	1.5	1.4	1.5	1.44±0.08	1.4	1.4	1.4	1.40±0.03

ตารางผนวกที่ 3 ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัวต่อมิลลิลิตร) ที่พบภายในบ่อเลี้ยงปลาสดที่ใช้ฟางข้าวร่วมกับมูลไก่แห้ง ในอัตราส่วน 1: 1 ในเวลา 150 วัน

ชนิด	เวลา (วัน)						
	1	30	60	90	120	150	เฉลี่ย
Rotifer							
(ตัวต่อมิลลิลิตร)							
ซ้ำที่ 1	220	192	210	948	2466	876	818.67±878.10
ซ้ำที่ 2	195	181	216	1596	2916	996	1016.67±1091.61
ซ้ำที่ 3	213	151	151	1296	2388	870	844.83±888.55
เฉลี่ย	209.33±12.90	174.67±21.22	192.33±35.92	1280.00±324.30	2590.00±253.68	914.00±71.08	893.39±107.56
Copepod							
(ตัวต่อมิลลิลิตร)							
ซ้ำที่ 1	201	152	23	6	30	24	72.67±82.30
ซ้ำที่ 2	187	170	11	6	42	18	72.33±83.33
ซ้ำที่ 3	179	195	20	12	35	48	81.50±82.81
เฉลี่ย	189.00±10.38	172.33±21.59	21.50±2.12	8.00±3.46	35.67±6.03	30.00±15.87	75.50±5.20

ตารางผนวกที่ 4 ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัวต่อมิลลิลิตร) ที่พบภายในบ่อเลี้ยงปลาสดที่ใช้ฟางข้าวร่วมกับมูลไก่แห้ง อัตราส่วน 2: 1 ในเวลา 150 วัน

ชนิด	เวลา (วัน)						
	1	30	60	90	120	150	เฉลี่ย
Rotifer							
(ตัวต่อมิลลิลิตร)							
ซ้ำที่ 1	235	300	511	1302	2436	672	909.33±839.75
ซ้ำที่ 2	220	213	657	480	2340	702	768.67±797.39
ซ้ำที่ 3	250	250	542	1074	2580	786	913.67±867.10
เฉลี่ย	235.00±15.00	254.33±43.66	570.00±76.92	1188.00±351.82	2452.00±120.80	720.00±59.09	863.89±82.49
Copepod							
(ตัวต่อมิลลิลิตร)							
ซ้ำที่ 1	250	232	27	12	12	12	90.83±116.60
ซ้ำที่ 2	223	245	24	12	30	6	90.00±112.08
ซ้ำที่ 3	274	269	42	12	24	12	105.50±129.06
เฉลี่ย	249.00±25.51	248.67±18.77	31.00±9.64	12.00±0.00	22.00±7.55	10.00±3.46	95.44±8.72