

ตารางผนวกที่ 5 ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัวต่อมิลลิลิตร) ที่พบภายในบ่อเลี้ยงปลาสดที่ใช้ฟางข้าวร่วมกับมูลไก่แห้ง ในอัตราส่วน 3: 1 ในเวลา 150 วัน

ชนิด	เวลา (วัน)						เฉลี่ย
	1	30	60	90	120	150	
Rotifer (ตัวต่อมิลลิลิตร)							
ซ้ำที่ 1	323	65	441	1350	348	408	489.17±442.13
ซ้ำที่ 2	335	50	342	1416	504	402	508.17±469.67
ซ้ำที่ 3	300	27	350	2484	504	702	727.83±889.03
เฉลี่ย	319.33±17.79	47.33±19.14	377.67±54.99	1750±636.52	452.00±90.07	504.00±171.50	575.06±132.65
Copepod (ตัวต่อมิลลิลิตร)							
ซ้ำที่ 1	350	198	30	18	12	0	101.33±142.45
ซ้ำที่ 2	334	169	18	30	24	0	95.83±131.77
ซ้ำที่ 3	336	197	25	18	35	0	101.83±135.39
เฉลี่ย	340.00±8.72	188.00±16.46	24.33±6.03	22.00±6.93	23.67±11.50	0.00±0.00	99.67±3.33

ตารางผนวกที่ 6 ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัวต่อมิลลิลิตร) ที่พบภายในบ่อชุดควบคุม ในเวลา 150 วัน

ชนิด	เวลา (วัน)						
	1	30	60	90	120	150	เฉลี่ย
Rotifer							
(ตัวต่อมิลลิลิตร)							
ซ้ำที่ 1	194	186	489	569	738	1716	648.67±565.65
ซ้ำที่ 2	176	156	936	570	402	1410	608.33±486.95
ซ้ำที่ 3	156	138	560	444	378	2364	673.33±844.42
เฉลี่ย	175.33±19.01	160.00±24.25	524.50±50.20	527.67±72.46	506.00±201.28	1830.00±487.11	643.44±32.81
Copepod							
(ตัวต่อมิลลิลิตร)							
ซ้ำที่ 1	220	191	235	134	192	174	191.00±35.54
ซ้ำที่ 2	198	211	306	192	198	168	212.17±48.09
ซ้ำที่ 3	178	223	200	126	150	174	175.17±34.54