

เอกสารอ้างอิง

- กรมพัฒนาที่ดิน. (ไม่ปรากฏวันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). การใช้ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยบำรุงดิน. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548. จาก <http://www.ddd.go.th/web-ddd/soil/Page10.htm>
- ตระกูล นามโลมา และ วิโรจน์ โรจน์สุวณิชกร. 2546. การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกคะน้า กรณีศึกษาตำบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 104 หน้า.
- สมศักดิ์ วังโน. 2541. การตรึงไนโตรเจน: ไรโซเบียม-พืชตระกูลถั่ว. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 252 หน้า.
- Moreno, J. L., Aliaga, A., Navarro, S., Hernández, T. and García, C. 2006. Effects of Atrazine on Microbial Activity in Semiarid Soil Applied Soil Ecology, In Press.
- Valenzuela, H. and J. Smith. 2002. Cowpea. In Sustainable Agriculture: Green Manure Crops. Cooperative Extension Service. University of Hawaii at Manoa. USA. pp.3.

Output ที่ได้จากโครงการ

ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สารไกลโฟเสตในสภาพดินกรดในอัตราแนะนำ ต่อการปลูกถั่วลาย ว่าไม่มีผลต่อการเกิดปมรากและการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมในธรรมชาติและเชื้อไรโซเบียมที่เพิ่มเติมลงไปดิน และไม่มีผลโดยรวมต่อการสร้างมวลชีวภาพของถั่วพุ่ม



