

## เอกสารอ้างอิง

- กรมประมงเกษตรกลาง. 2554. ปลาจีน (ออนไลน์). สืบค้นจาก <http://www.fisheries.go.th>
- ค้วน ขาวหนู. 2534. โภชนศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์ กรุงเทพฯ. 516 หน้า
- ชาติชาย วิสัยลักษณ์ และคณะ. ผลของการทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโปแตสเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอ์เตอร์. (ออนไลน์). สืบค้นจาก <http://kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC4806001.pdf>
- นิติพงศ์ จิตรโกชน. (2554). คุณสมบัติทางเคมีของลิปิด. เอกสารประกอบการสอน เรื่องไขมันและน้ำมัน. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- บริษัท โพรโมสต์ จำกัด. 2554. ลดโซเดียมลดเกลือ เลือกอาหารที่มีโพแทสเซียมให้มากขึ้น. บทความโพรโมสต์ (ออนไลน์). สืบค้นจาก <http://www.foremostforlife.com/articles/inner.aspx?id=11>
- พลทรัพย์ วิรุฬหกุล จิราวรรณ แยมประยูร และอมรรัตน์ สุขโข.(2542). ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตปลาร้า. วารสารการประมง. 52(6); 580-585
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food science and technology). 2546. คณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหารและ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สงวน แก้วกวาง. 2548. การสร้างชุดการเรียนรู้เรื่องการทำปลาหมักกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่3
- สมจินตนา สมิตสุวรรณค์. 2539. ผลของเกลือโปแตสเซียมคลอไรด์ กากสับปะรดและรำข้าวสาลีต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชันที่ลดปริมาณไขมัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- สันต์ บัณทุกุล. 2498. เกลือที่ใช้ในการทำปลาเค็ม. ข่าวการประมง. 8: 243-268.
- สุวรรณ วิรัชกุล. 2531. การถนอมและแปรรูปปลา = Preservation and processing of fish. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2548. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน: ปลาหมัก. ผ.ม.ช. 26/2548.

- Adams, M.R. 1986. Fermented fish products. In: Adams, M.R. (Ed.), *Micro-Organism in the Production of Food*. Elsevier, Amsterdams, 23: 179-193.
- Antonios, T.F.T. and G.A. MacGregor. 1997. Scientific basis for reducing the salt (sodium) content in food products, pp. 84-100. In A.M. Pearson and T.R. Dutson (eds.) *Production and processing of healthy meat, poultry and fish products*. Chapman & Hall, London.
- AOAC 2000. *Official Methods of Analysis*. 15<sup>th</sup> ed., A.O.A.C. Inc., Washington, D.C. 1141 p.
- APHA. 2000. *Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods*. 3ed., American Public Health Association, Washinton, D.C. 1219 p.
- Beriain, J. A., Pena, M. P. and Bello, J. 1993. A study of the chemical components which characterize Spanish suacisson. *Food Chemistry*. 48:31-37
- Buege J.A. and Aust S.D. 1978. Microsomal lipid peroxidation, *Method in Enzymology*.52: 302-310.
- De Castro, A., Montano, A., Sanchez, H. A. and Rejano, E. 1998. Lactic acid fermentation and storage of blanched garlic. *Int. J. Food Microbiol.* 39: 205-211.
- Feldbreg, R. R., Chang, S. C., Kotik, A. N., Nadler, M., Neuwirth, Z., Sumdastron, D. C and Thonpson, N. H., 1988. In vitro mechanism of inhibition of bacterial cell growth by allicin. *Antimicrob. Agent. Chemother.* 32, 1763-173-68
- Fellows, P. and Hampton, A. 1992. *Small-scale food processing-A guide for appropriate equipment*. Intermediate Technology Publications 103-105 Southampton Row, London WC1B4HH, UK.
- Foegeding, E. A., Laneir, T. C., & Hultin, H. O. (1996). Characteristics of edible muscle tissues. In O. R. Fennema (Ed.), *Food chemistry* (pp. 879-942). New York, USA: Mercel Dekker.

- Frank, R.L. and o. Mickelsen. 1970. US. Patent 3, 514, 296, pp. 187-191. *In* N.D. Pintauro (ed.) Nutrition Technology of Processed Food. No Yes Data Corporation, London.
- Frazier, W. C. 1967. Food Microbiology. 2nd ed. McGraw-Hill Book Company.
- Guthrie, H.A. 1979. Introductory Nutrition. C.V. Mosby Company, United States of America. 693 p.
- Hagen, B. F., Berdague, J. L., Holck, A. L., Naes, H., & Bloom, H. (1996). Bacterial proteinase reduces maturation time of dry fermented sausages. *Journal of Food Science*, 61, 1024-1029.
- Hultin, H. O. (1992). Lipid oxidation in fish muscle. *In* G. J. Flick, & R. E. Martin (Eds.), *Advances in seafood biochemistry* (pp. 99-122). USA: Technomic Publishing Co., Inc.
- Jiménez Comenero, F., Ayo, M.J. and Carballo, J. 2005. Physicochemical properties of low sodium frankfurter with added walnut: effect of transglutaminase combined with caseinate, KCl and dietary fibre as salt replacers. *Meat Science* 69: 781-788.
- Lewis, R.J. 1989. Food Additive Handbook. Van Nostrand Reinhold, New York. 592 p.
- Lilic, S., Matekalo-Sverak, V. and Borovic, B. 2008. Possibility of replacement of sodium chloride by potassium chloride in cooked sausages-sensory characteristics and health aspects. *Biotec. Ani. Hus.* 24: 133 – 138.
- Nakao et al., Y. Nakao, A. Konno, T. Taguchi, T. Tawada, H. Kasai and J. Toda. 1991. Curdlan: properties and application to foods. *Journal of Food Science* 56: 769-772.
- Ostergraad, A., Emberk, P. K. B., Yamprayoon, J., Wedel-Neergaard, W., Huss, H. H., & Gram, L. (1998). Fermentation and spoilage of som fak, a Thai low-salt fish product. *Tropical Science*, 38, 105-112.

- Park, J.N. Hwang, K.T., Kim, S.B. and Kim S.Z. 2009. Partial replacement of NaCl by KCl in salted mackerel (*Scomber japonicus*) fillet products: effect on sensory acceptance and lipid oxidation. *Int. Food Sci.* 44: 1572-1578.
- Phitakpol, B. 1993. Fish fermentation technology in Thailand. In C. H. Lee & K. H. Steinkraus (Eds.), *Fermentation Technology* (pp. 155-166). Tokyo, Japan: United Nation University Press.
- Prescott, S. C. and Dunn, C. G. 1959. *Industrial Microbiology*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Saisithi, P., Yongnanitchai, P., Chimanage, P. Wongkhalaung, C., Boonyaratanakornit, M. and Maleehuan, S. 1986. Improvement of a Thai traditional fermented fish product: som-fug. Institute of Food Research and Product Development. Bangkok: Kasetsart University.
- Sikorski, Z. E. (2001). Chemical reaction in proteins in food systems. In Z. E. Sikorski (Ed.), *Chemical & functional properties of food proteins* (pp. 191-215). USA: Technomic Publishing Co., Inc.
- Stansby, M. E. 1962. Proximate composition of fish. *Fish in Nutrition*. London: Fishing News (Book) Ltd. 55-60.
- Swetwivathana, A., Leutz, U., & Fischer, A. (1999). Role of garlic on growth and lactic acid production of starter cultures. *Flaeschwirtschaft International*, 1, 26-29
- Van Loo J., Coussement, P., De Leenheer, L., Hoebreghe, H. and Smits. G., 1995. On the presence of inulin and Oligofructose as natural in ingredients in the western diet. *Crit. Rev. Food Science. Technol.* 35: 525-552

Vissessanguan, W., Benjakul, S., & An, H. (2003). Purification and characterization of cathepsin L in arrowtooth flounder (*Atheresthes stomias*) muscle. *Comparative Biochemistry and Physiology, Part B*, 134, 477-478.



ภาคผนวก ก

การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical analysis) และทางเคมี (chemical analysis)

### 1.1 วิธีการวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH) (AOAC, 2002)

บดปลาซั่มให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex ซั่งตัวอย่างปลาซั่มที่บดละเอียด 10 กรัม ละลายในน้ำปริมาตร 90 มิลลิลิตร (AOAC,2000) ผสมให้เข้ากัน นำไปวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ด้วย เครื่อง pH meter ทำการวัดตัวอย่างละ 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย บันทึกผลที่ได้

### 1.2 วิธีการวัดปริมาณกรด (Acidity)

บดปลาซั่มให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex ซั่งตัวอย่างปลาซั่มที่บดละเอียด 2 กรัม เจือจางด้วยน้ำกลั่น 30 มิลลิลิตร หยดฟีนอล์ฟทาลีน 2-3 หยด ไตเตรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 N จนถึงจุดยุติ (สีชมพูอ่อน) บันทึกค่าที่ไตเตรตได้และคำนวณหาปริมาณกรดจากสูตร

Acidity =

$$\frac{\text{ความเข้มข้น NaOH} \times \text{มล.ของ NaOH} \times 0.07 \times 100}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)}}$$

\*หมายเหตุ 1 มิลลิลิตร ของ 0.1 N NaOH ทำปฏิกิริยาพอดีกับ Citric acid = 0.0070

Acitric acid = 0.0060

Malic acid = 0.0067

Tartaric acid = 0.0075

### 1.3 วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเกลือ (AOAC, 2000)

บดปลาซั่มให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex ซั่งตัวอย่างปลาซั่มที่บดละเอียด 2 กรัม เจือจาง ด้วยน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร หยดโพแทสเซียมโครแมท 2 มิลลิลิตร ไตเตรตกับซิลเวอร์ไนเตรท จนถึงจุดยุติ (สีส้มแดงอิฐ) บันทึกผลที่ได้ และคำนวณหาปริมาณเกลือ

$$\text{จากสูตร} \quad \text{ปริมาณ NaCl} = \frac{\text{ปริมาตร AgNO}_3 \times 0.585}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)}}$$

#### 1.4 วิธีการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analysis)

เตรียมตัวอย่างโดยตัดชิ้นปลาต้มให้มีขนาดความหนา 1 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซนติเมตร และยาว 1.5 เซนติเมตร เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส TA-XT2 (Stable Micro System, UK) โดยใช้หัววัด Warner-Bratzler shear blade ทำการวัดเนื้อสัมผัสตัวอย่างปลาต้มตัวอย่างละ 3 ชิ้น ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) โดยมีสภาวะการทดสอบดังนี้ : cross-head speed 2.0 มิลลิเมตรต่อวินาที compression load ที่ 20 กิโลกรัม จากนั้นทำการวิเคราะห์และอธิบายค่าที่ใช้บ่งชี้ลักษณะเนื้อสัมผัส ได้แก่ ค่าความแข็ง ซึ่งคำนวณจากแรงเฉือนสูงสุด (maximum shear force) และค่างานที่ทำทั้งหมดในการวัดเนื้อสัมผัสของปลาต้ม คำนวณจากกราฟของแรง-เวลา (force time) ตาม Bourne (1976) ใช้ probe ชนิด Cylindrical aluminum (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm) ตัวอย่างสูง 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm ที่อุณหภูมิห้องความเร็ว 5.0 mm/s 50% Strain surface sensing force 99.0 g threshold 30.0 g ช่วงระยะเวลาในการกดแต่ละครั้ง 1 วินาที โดยหาค่า Hardness, Gumminess, Adhesive force, Adhesiveness, Springiness, Cohesiveness, Chewiness และ Deformation

#### 1.5 การวิเคราะห์ค่าสี ด้วย Colorimeter: Hunter Color System

กดเปิดเครื่องเพื่อ warm up เครื่องประมาณ 45 นาที จากนั้นกดปุ่ม CAL เพื่อทำการ standardize เครื่องโดยวางแผ่นมาตรฐานสีด้านล่างบนที่วาง แล้วกด read key และวางแผ่นสีขาว แล้วกด read key จาก read mode กด setup key เพื่อเข้าสู่ setup mode จากนั้นกดปุ่มลูกศรไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกตัวเลข 0-99 และกดลูกศรลงเข้าสู่ mode name เพื่อตั้งชื่อ กดลูกศรทางขวาเพื่อเลือกค่า L เป็นค่าแรกที่ต้องการทดสอบ และกด read key เพื่อ accept ค่า L จากนั้นกดลูกศรไปยัง display mode เลือกปุ่ม difference แล้วจึงกดลูกศรเพื่อเลือกค่า color scale : L\*a\*b จากนั้นกดลูกศรมายัง standard mode แล้วกดลูกศรทางซ้ายหรือขวามือเพื่อเลือก physical กดลูกศรลงเพื่อเลือก 1st target value วางปลาต้มที่ทำการบดแล้วบนที่วาง แล้วกด ready key แล้วอ่านค่าสีที่ได้ และกด clear key เพื่อทำการวัดตัวอย่างต่อไป

#### 1.6 วิธีการหาปริมาณ weight loss (Nakao et al. (1991))

แบ่งตัวอย่างปลาต้ม 1 ชิ้น มาใส่ในถุงที่สะอาด ชั่งน้ำหนักตัวอย่างก่อนทำการหมัก (วันที่ 0) ด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักตัวอย่างระหว่างกระบวนการหมัก (ทุกๆ 12 ชั่วโมง) หาคความต่างระหว่างน้ำหนักของปลาต้มก่อนและหลังการหมัก (ชั่งตัวอย่าง 3 ครั้ง)

#### 1.7 การวิเคราะห์ค่า water activity (Aw)

ทำการ Calibrate เครื่องวัดค่า water activity จากนั้นนำเนื้อปลาต้มที่บดแล้ว 2 กรัม ใส่ในภาชนะสำหรับวัดค่า Aw โดยใส่ปริมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ นำภาชนะดังกล่าวไปใส่ในหลุมวัดค่า Aw และบันทึกค่า Aw ที่ได้

### 1.8 วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น

บดปลาสามให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex นำเนื้อปลา 1 กรัมใส่ใน ถาดอะลูมิเนียมฟลอยด์สำหรับวัดปริมาณความชื้นตั้งค่าเครื่องวัดปริมาณความชื้นและทำการวัดปริมาณ ความชื้นในปลาสามรจนเครื่องทำงานเสร็จ จะปรากฏคำว่า END บนหน้าปัดเครื่อง บันทึกค่า ความชื้นที่ได้

### 1.9 วิธีการวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาของ thiobarbituric acid (TBARS) (Buege and Aust (1978))

บดปลาสามให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex ชั่งตัวอย่าง นำตัวอย่าง 5 กรัม มาทำการ homogenised ด้วยสารละลาย TBARS\* 25 มิลลิลิตร\* TBA (0.375 กรัม/100มิลลิลิตร), TCA (15 กรัม/100 มิลลิลิตร) และ 0.25mol/L HCl ให้ความร้อนใน boiling water อุณหภูมิ 95–100 °C นาน

1 ชั่วโมงจะเกิดเป็นสารละลายสีชมพู ทำให้เย็นด้วยการผ่านน้ำนำมา centrifuge ที่ 5500g เป็นเวลา 25 นาที นำเอาส่วนที่ใสไปทำการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 532 nm ด้วยเครื่อง spectrophotometer ค่า TBARS จะคำนวณได้จากสูตร

ค่า TBARS =

$$\frac{7.8 * D}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง}}$$

; D คือค่าการดูดกลืนแสงที่ 532 nm

### 1.10 วิธีการหาปริมาณ Expressible water (Funami, Yada, and Nakao(1998))

ตัดตัวอย่างปลาสามให้เป็นทรงกระบอก (ความสูง 2 cm x เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 cm) นำไป วางระหว่างชั้นของกระดาษกรอง (Whatman No. 4) จะถูกให้แรงกดโดยใช้ texture analyser (Stable Micro Systems, Surrey, England)

cylindrical aluminum probe ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm

crosshead speed เท่ากับ 3 mm/s

70% strain

เวลา 60 วินาที

คำนวณปริมาณ expressible water ตามสมการดังนี้

$$\text{Expressible water (\%)} = \frac{\text{apparent expressible water} \times 100}{\text{Total moisture content}}$$

ซึ่งปริมาณ apparent expressible water หาได้จาก

$$\text{apparent expressible water content} = \frac{100 \times (W_{\text{before}} - W_{\text{after}})}{W_{\text{before}}}$$

โดยที่  $W_{\text{before}}$  = น้ำหนักของตัวอย่างก่อนการกด

$W_{\text{after}}$  = น้ำหนักของตัวอย่างหลังจากการกด

#### 1.11 วิธีการหาปริมาณ Peroxide value (AOAC, 2002)

บดปลาซั่มให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex ชั่งตัวอย่าง 5 กรัม ในขวดรูปชมพู่เติมสารละลาย acetic acid - chloroform (3:2) ปริมาตร 30 ml ลงไป เติมสารละลาย potassium iodide อิมตัวลงไปเขย่าเป็นเวลา 1 นาที แล้วเติมน้ำกลั่น 30 ml ทำการไตเตรทอย่างช้าๆด้วย 0.01N sodium thiosulfate ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) ด้วยปริมาตรคงที่และเขย่าตลอดเวลา จนกระทั่งสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน เติมสารละลายน้ำแป้ง 1% ปริมาตร 0.5 ml ให้เป็น indicator สารละลายจะเป็นสีน้ำเงิน ทำการไตเตรทต่อจนถึงจุดยุติ คือจุดที่สีน้ำเงินของสารละลายหายไป คำนวณหาปริมาณ peroxide value ด้วยสมการดังนี้

$$\text{meq of peroxide /kg of oil} = \frac{S \times M \times 1000}{\text{น้ำหนักของตัวอย่าง (g)}}$$

\*หมายเหตุ S คือ ปริมาตรของ  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  (ml)

M คือ 0.01 (ความเข้มข้นของสารละลาย  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ )

### 1.12 วิธีการวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหารโดยวิธี Soxhlet Method

บดปลาซั่มให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex นำไปอบแห้งให้เหลือความชื้นประมาณ 10 % ชั่งตัวอย่างที่อบแห้ง 2 กรัม ใส่ใน Thimble และปิดจุกสำลี ชั่งน้ำหนัก Round flask ที่ล้างสะอาดและผ่านการอบแห้งและเก็บในโถดูดความชื้น นำมาวางบนเตาหลุมและยึดด้วยตัวหนีบ จากนั้นนำ Thimble ไปใส่ใน soxhlet tube ทาบบริเวณรอยต่อของ soxhlet tube ที่ใช้ต่อกับ Round flask ด้วยกรีซ และต่อ soxhlet tube กับ Round flask เติมปิโตรเลียมอีเทอร์ปริมาตร 300 ml. ลงใน soxhlet tube ผ่านตัวอย่างลงใน Thimble ไหลสู่ Round flask ด้านล่าง ต่อ soxhlet tube กับ condenser เข้าด้วยกันและทารอยต่อด้วยกรีซ ปิดสำลีที่ปลายด้านบนของ condenser และต่อสายยางเข้ากับ condenser เพื่อเชื่อมต่อแต่ละชุดเข้าด้วยกัน ต่อสายยางจาก cooling bath เข้ากับ condenser ชุดแรกและต่อสายยางน้ำทิ้งเข้ากับ condenser ชุดสุดท้าย เปิดน้ำทิ้งจาก cooling bath ให้เต็ม condenser ทั้ง 4 ชุด เปิดเตาหลุมเพื่อให้ความร้อนแก่ปิโตรเลียมอีเทอร์และทิ้งไว้ให้เกิดการกลั่นประมาณ 4 ชั่วโมงโดยให้มีอัตราการควบแน่น 5-6 หยดต่อวินาที เมื่อครบเวลาให้ปิดสวิทช์เตาหลุมเพื่อหยุดการให้ความร้อนแก่ปิโตรเลียมอีเทอร์รอจนไม่มีการหยด (และไม่มีการควบแน่น) แล้วจึงปิด cooling bath ถอด Soxhlet tube ออกจาก Round tube แล้วเทปิโตรเลียมอีเทอร์ไซฟอนอาร์มลง Soxhlet tube ให้หมด แล้วเอียงให้ปิโตรเลียมอีเทอร์ดังกล่าวไหลลงสู่ Round flask ให้หมด นำ Round flask ไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนปิโตรเลียมอีเทอร์ระเหยไปหมด เก็บ Round flask ที่มีแต่น้ำมันไว้ใน Desicator ชั่งน้ำหนักน้ำมันใน Round flask และคำนวณหาเปอร์เซ็นต์กรดไขมัน

### 1.13 วิธีการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน โดยวิธี Kjeldahl method

บดปลาซั่มให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex นำไปอบแห้งให้เหลือความชื้นประมาณ 10 % ชั่งตัวอย่างที่อบแห้ง 1 กรัม ใส่ในกระดาดชามวนบุหรี และห่อตัวอย่างใส่ในหลอดย่อย ชั่ง Mixed catalyst 10 กรัม ใส่ในหลอดย่อย เติมกรดซัลฟูริก 98 % ปริมาตร 20 ml ลงในหลอดย่อย นำเข้าเครื่องย่อยประมาณ 30 นาที หรือจนกว่าจะใส (สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลง) ทำการย่อย blank ซึ่งเป็นการเติม Mixed catalyst 10 กรัม และกรดซัลฟูริก 98% 20 ml เอาตัวอย่างเครื่องแล้วรอให้เย็นประมาณ 20 นาที นำหลอดย่อยเข้าเครื่องกลั่นแล้วเปิดสวิทช์เครื่อง (ทำการย่อย blank ก่อน) เติมน้ำกลั่นในเครื่อง 50 ml เพื่อเจือจางและเติม NaOH 32% 70 ml เพื่อปรับให้เป็นกลาง ทำ reciever โดยการเติมกรดบอริก 2% 60 ml (ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml) เติมน้ำกลั่น 2 หยด แล้วเขย่า นำ reciever เข้าเครื่องกลั่นโดยให้ปลายท่อนำก๊าซแอมโมเนียจุ่มลงในกรดบอริก ทำการกลั่น 4 นาที นำหลอดย่อยและขวดรูปชมพู่ออกจากเครื่องกลั่น ทิ้งให้เย็นและใช้น้ำกลั่นล้างปลายท่อให้สะอาด นำขวดรูปชมพู่ที่ได้มา ไตเตรทกับกรดซัลฟูริกมาตรฐาน 0.1 N (ไตเตรท blank ก่อน) จนถึงจุดยุติ คือสารละลายเปลี่ยนเป็น สีส้ม คำนวณหา % ปริมาณโปรตีน

#### 1.14 วิธีการวิเคราะห์ปริมาณ crude fiber ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือ (Instrumental method)

บดปลาสำ้มให้ละเอียดด้วยเครื่อง moulinex นำไปอบแห้งให้เหลือความชื้นประมาณ 10 % ชั่งตัวอย่างที่อบแห้ง 1 กรัม (w) ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 500 ml เติมกรดซัลฟูริกความเข้มข้น 0.128 M ปริมาตร 150 ml เติม n-octanol 3 หยด (ป้องกันการเกิดฟอง) วางบีกเกอร์บนแท่นสำหรับวางในเครื่องสกัด ยกแท่นขึ้นให้ปิดฝาบีกเกอร์ให้พอดี ปิดสวิทช์เครื่องทำน้ำเย็น เปิดสวิทช์เครื่องสกัดให้ความร้อนจนเดือดลดความร้อนลงและทำการสกัด 30 นาที นำบีกเกอร์ออกจากเครื่องสกัด นำมากรองใส่ crucible โดยล้างด้วย น้ำร้อน 3 ครั้งๆละ 30 ml โดยพยายามเฉพาะสารละลายให้ไหลผ่าน crucible ส่วนกากตัวอย่างนั้นให้ เหลือในบีกเกอร์ เติมสารละลายต่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.223 M ปริมาตร 150 ml ใน บีกเกอร์ เติม n-octanol

3 หยด เพื่อป้องกันการเกิดฟอง วางบีกเกอร์บนแท่นสำหรับวางในเครื่องสกัดและยกแท่นขึ้นให้ปิดฝาบีกเกอร์ ให้พอดี ทำการสกัด 30 นาที นำบีกเกอร์ออกจากเครื่องสกัด นำบีกเกอร์ออกจากเครื่องสกัดและนำมากรอง ผ่าน crucible โดยล้างด้วย acetone 3 ครั้งๆละ 25 ml นำ crucible ไปอบแห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง นำออกมาเก็บใน Desicator รอให้เย็นนำ crucible ไปชั่งน้ำหนัก (W1) นำ crucible ไปเผาในเตาอบที่ 525 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง นำ crucible ไปชั่งน้ำหนัก (W2) คำนวณหา ปริมาณ crude fiber

% Crude fiber

$$= \frac{(W1 - W2)}{W} \times 100$$



2. การประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสสารทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาสาม

การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาสาม โดยทดสอบความชอบในด้านลักษณะปรากฏของปลาสามที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุก และปลาสามที่ผ่านการปรุงสุกในด้านสี กลิ่น รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขม เนื้อสัมผัสและความชอบรวม โดยมีผู้ทดสอบจำนวน 5 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมทางประสาทสัมผัส โดยนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. การวิเคราะห์คุณสมบัติสารทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาสาม

### 3.1 วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี

3.1.1 การวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ด้วยวิธี AOAC, 2002 โดยใช้ pH meter

3.1.2 การวิเคราะห์หาปริมาณกรด (Acidity) ด้วยวิธีการไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 N โดยมีฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์

3.1.3 การวิเคราะห์หาปริมาณเกลือ ด้วยวิธี AOAC, 2000 โดยการไตเตรทกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทความเข้มข้น 0.1 M โดยมีโพแทสเซียมโครเมต 5% เป็นอินดิเคเตอร์

3.1.4 การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analysis) ด้วยเครื่อง Texture Analyzer TA-XT2 (Stable Micro System, UK)

3.1.5 การวิเคราะห์ค่าสี ด้วย Colorimeter: Hunter Color System รุ่น DP 9000 S/N 90905

3.1.6 การวิเคราะห์การหาปริมาณ weight loss ด้วยหลักการของ Nakao et al. (1991)

3.1.7 การวิเคราะห์ค่า water activity ด้วยเครื่องวิเคราะห์ค่า water activity ยี่ห้อ Novasina รุ่น AW-center 200 S/N 9604001

3.1.8 การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น ด้วยเครื่องวิเคราะห์ความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อ Sartorius รุ่น MA 40 S/N 51101392

3.1.9 การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาของ thiobarbituric acid (TBARS) ด้วยหลักการของ Buege and Aust (1978)

3.1.10 การหาปริมาณ Expressible water ด้วยหลักการของ Funami, Yada, and Nakao (1998)







3.1.11 การวิเคราะห์หาปริมาณ Peroxide value ด้วยวิธี AOAC, 2002





3.1.12 การวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหารด้วยวิธี Soxhlet Method ด้วยวิธี AOAC, 2002






3.1.13 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ด้วยวิธี Kjeldahl method โดยใช้เครื่องวิเคราะห์โปรตีนยี่ห้อ BUCHI รุ่น B 435 S/N 1276958






3.1.14 การวิเคราะห์ปริมาณ crude fiber ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือ (Instrumental method)

ปลาต้ม Treatment 1 NaCl 100 %









































ปลาต้ม Treatment 2 NaCl 75 : KCl 25 %
















































ปลาต้ม Treatment 3 NaCl 50 : KCl 50 %


















ปลาต้ม Treatment 4 NaCl 25 : KCl 75 %







ปาดำ Treatment4 ๗๗. ที่ 36




ปาดำ Treatment4 ๗๗. ที่ 36



ปาดำ Treatment4 ๗๗. ที่ 48







ปาดำ Treatment4 ๗๗. ที่ 48












ปาดำ Treatment4 ๗๗. ที่ 60




ปาดำ Treatment4 ๗๗. ที่ 60












ปลาหมึก Treatment4 ซม. ที่ 156



ปลาหมึก Treatment4 ซม. ที่ 156















ปลาหมึก Treatment4 ซม. ที่ 168









ปลาหมึก Treatment4 ซม. ที่ 168

ปลาต้ม Treatment 5 NaCl 0 : KCl 100 %












ปลาฉลาม Treatments ๖๗. ที่ 108




ปลาฉลาม Treatments ๖๗. ที่ 108




ปลาฉลาม Treatments ๖๗. ที่ 120









ปลาฉลาม Treatments ๖๗. ที่ 120






ปลาฉลาม Treatments ๖๗. ที่ 132




ปลาฉลาม Treatments ๖๗. ที่ 132




ปลาต้ม Treatment 6 NaCl 75 : CaCl<sub>2</sub> 25 %







ปลาฉลาม Treatment ๖๑๑. ที่ 36



ปลาฉลาม Treatment ๖๑๑. ที่ 36




ปลาฉลาม Treatment ๖๑๑. ที่ 48



ปลาฉลาม Treatment ๖๑๑. ที่ 48



ปลาฉลาม Treatment ๖๑๑. ที่ 60




ปลาฉลาม Treatment ๖๑๑. ที่ 60



ไม้เนื้อ Treatment ๖๓. ที่ ๗๒








ไม้เนื้อ Treatment ๖๓. ที่ ๗๓








ไม้เนื้อ Treatment ๖๓. ที่ ๘๒




ไม้เนื้อ Treatment ๖๓. ที่ ๘๓









ปลาหมึก Treatment 6 ชนิด ที่ 156



ปลาหมึก Treatment 6 ชนิด ที่ 156












ปลาหมึก Treatment 6 ชนิด ที่ 163















ปลาหมึก Treatment 6 ชนิด ที่ 168






ปลาต้ม Treatment 7 NaCl 50 : CaCl<sub>2</sub> 50 %































ปลาต้ม Treatment 8 NaCl 75 : CaCl<sub>2</sub> 25 %














ปลาอิน Treatment8 วน. ที่ 144




ปลาอิน Treatment8 วน. ที่ 144




ปลาอิน Treatment8 วน. ที่ 156



ปลาอิน Treatment8 วน. ที่ 156



ปลาอิน Treatment8 วน. ที่ 168



ปลาอิน Treatment8 วน. ที่ 168

