

กฤษณ์ชลิ เพียรทอง: ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
(SELECTED FACTORS RELATED TO HEALTH OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS
IN COMMUNITY) อ. ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์, 126 หน้า.
ISBN 974-17-6279-8

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได้ เครื่องช่วยช่วยเหลือทางสังคม การใช้แอลกอฮอล์ การใช้น้ำ การใช้น้ำดื่ม การรับรู้บริการสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายในตนด้านสุขภาพ ความเชื่ออำนาจผู้อื่นด้านสุขภาพ และความเชื่ออำนาจความบังเอิญด้านสุขภาพ กับสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยจิตเภทที่มาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลศิริวิญญา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 170 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ความเพียงพอของรายได้ แบบสัมภาษณ์เครื่องช่วยช่วยเหลือทางสังคม แบบสัมภาษณ์การใช้สารเสพติด แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับรู้บริการสุขภาพ แบบวัดความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพ และแบบวัดสุขภาพ ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้

1. ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนมีสุขภาพรายด้าน และโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี
2. ความเพียงพอของรายได้ เครื่องช่วยช่วยเหลือทางสังคม การรับรู้บริการสุขภาพ ความเชื่ออำนาจภายในตนด้านสุขภาพ และความเชื่ออำนาจผู้อื่นด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ($r = .31, .23, .20, .21, .26$ ตามลำดับ)
3. เพศ ระดับการศึกษา การใช้แอลกอฮอล์ การใช้น้ำดื่ม ความเชื่ออำนาจความบังเอิญด้านสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน

##4577557636 : MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEYWORD: HEALTH, SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN COMMUNIT

KULCHALEE PAINTHONG: SELECTED FACTORS RELATED TO HEALTH OF
SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN COMMUNITY. THESIS ADVISOR : ASSOC.
PROF. JINTANA YUNIBHAND, Ph.D., 126pp. ISBN 974-17-6279-8

The purposes of the study were to identify the level and health of schizophrenic patients in community, and to examine the relationships between gender, education level, adequacy of income, social network, use of alcohol - amphetamine and tobacco , perceived health service, internal health locus of control, influential others health locus of control, chance health locus of control of schizophrenic patients in community. Research subjects consisted of 170 of schizophrenic patients who were treated in out patient departments of mental health hospitals under the jurisdiction of Division of Mental Health, selected by multistage sampling technique. Research instruments were interviewing questionnaires, which were designed to measure adequacy of income, social network, use of addict substances, perceived health service, health belief scale, and health scale. These instruments were tested and trial for their content validity and reliability. Statistics which were used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson-product moment correlation and the multiple regression analysis.

The major findings were as follows:

1. The level of health of schizophrenic patients in community was at the good level.
2. Adequacy of income, social network, perceived health service , internal health locus of control, and influential others health locus of control were positively and significantly related to health of schizophrenic patients in community, at .05 level. ($r = .31, .23, .20, .21, .26$ respectively.)
3. Gender, education level, alcohol and tobacco used, and chance health locus of control were not significantly related to health of schizophrenic patients in community.