

เพ็ญพยอม เขยสมบัติ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS AND LONELINESS OF THE HOSPITALIZED CHRONICALLY ILL ELDERLY PATIENTS) อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาส์ตย์, 158 หน้า.

ISBN 974-17-6334-4.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ภาวะอารมณ์ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 140 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน แบบสอบถามการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากพยาบาล แบบสอบถามภาวะอารมณ์ แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และแบบวัดความว่าเหว ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หากความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .80, .93, .93, .87 และ .88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ในระดับต่ำ ($\bar{x} = 1.95$)
2. การได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากพยาบาล และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = -.250, -.321$ ตามลำดับ)
3. ภาวะอารมณ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = .625$) ภาวะอารมณ์ด้านความวิตกกังวลและความซึมเศร้า ด้านความโกรธ มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = .682, .680$ ตามลำดับ) ภาวะอารมณ์ด้านความกระปรี้กระเปร่า มีความสัมพันธ์เชิงลบ กับความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($r = -.196$)
4. เพศ อายุ รายได้ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์ กับความว่าเหวในผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

The purposes of this descriptive research were to study the loneliness of the hospitalized chronically ill elderly patients and the relationships between selected factors, such as sex, age, income, activity of daily living, professional support, length of stay, profile of mood states, self-esteem, and loneliness of the hospitalized chronically ill elderly patients. Subjects consisted of 140 hospitalized chronically ill elderly patients in inpatient department in Government Hospitals, Bangkok Metropolis, and were selected by using simple random sampling technique. Research instruments were demographic questionnaires, Barthel ADL Index, professional support, profile of mood states, self-esteem, and loneliness questionnaires which were tested for content validity and reliability. The reliability were .80, .93, .93, .87 and .88 respectively. Data were analysed by using statistic methods, including frequency, mean, standard deviation, Point Biserial's correlation and Pearson's correlation.

Major findings were as follows:

1. Loneliness of the hospitalized chronically ill elderly patients was at low level. ($\bar{X} = 1.95$)
2. Professional support and self-esteem were significantly negative correlated with loneliness of the hospitalized chronically ill elderly patients at level of .05 ($r = -.250, -.321$ respectively)
3. Profile of mood states was significantly positive correlated with loneliness of the hospitalized chronically ill elderly patients at level of .05 ($r = .625$): anxiety-depression and anger factors were significantly positive correlated with loneliness of the hospitalized chronically ill elderly patients at level of .05 ($r = .682, .680$ respectively), vigor factor was significantly negative correlated with loneliness of the hospitalized chronically ill elderly patients at level of .05 ($r = -.196$)
4. Sex, age, income, activity of daily living, and length of stay were not correlated with loneliness of the hospitalized chronically ill elderly patients at level of .05