

อุทุมพร สมพงษ์ 2549: การศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะปริมาณกราไฟติกในเมล็ดถั่วเขียว ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โครงการสาขาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์พิริยะศักดิ์ ศรีนิเวศน์, Ph.D. 84 หน้า

ISBN 974-16-2706-8

กรดไฟติกคือโมเลกุลของฟอสฟอรัสอินทรีย์ที่ฟืชใช้สะสมฟอสฟอรัส พบปริมาณมากในเมล็ดถั่วเขียวและพืชตระกูลถั่ว มีความสามารถสูงในการขับยั้งการดูดซึมน้ำตาหารในสัตว์กระเพาะเดี่ยว การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแปรปรวนของลักษณะปริมาณฟอสฟอรัสในเมล็ดเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียว ประเมินพันธุกรรมการถ่ายทอด และศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะปริมาณสารประกอบฟอสฟอรัสนิดต่าง ๆ ในเมล็ด กับลักษณะทางพืช ไร์บางลักษณะ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียว 250 พันธุ์อยู่ในช่วง 2.34 - 5.75 มก./ก. นำเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดมากและน้อยที่สุดอย่างละ 5 พันธุ์มามวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสอินทรีย์ไฟเต็มฟอสฟอรัส และกรดไฟติก พบร่วมกันในช่วง 0.34 - 0.59 มก./ก. 1.67 - 5.03 มก./ก. และ 5.94 - 17.87 มก./ก. ตามลำดับ ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะปริมาณกรดไฟติก ใช้ประชากรถูกรุนที่ 2 ที่เกิดจากคุณสมบัติ V1658BBR x V1141BG ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณกรดไฟติกในเมล็ดต่ำสุดและสูงสุด พบการกระจายตัวของปริมาณกรดไฟติกที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มน้อยที่มีปริมาณมากและน้อย ในอัตราส่วน 9:7 แสดงว่า ปริมาณกรดไฟติกในเมล็ดถั่วเขียวถูกควบคุมด้วยยีนหลัก 2 ถู่ ที่มีปฏิกิริยาระหว่างยีนแบบ duplicated recessive epistasis นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับปริมาณกรดไฟติก ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสอินทรีย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอาเซนิคเกิลิ่ว อัตราพันธุกรรมอย่างกว้างของลักษณะปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ฟอสฟอรัสอินทรีย์ไฟเต็มฟอสฟอรัส และกรดไฟติก เป็น 80.8, 78.6, 80.7 และ 80.7 ตามลำดับ

อุทุมพร สมพงษ์  
ลายมือชื่อนิติ  
๗๗

ลายมือชื่อประธานกรรมการ

10 / 10 / ๔๙