

T 156430

ัญชนก จิงา : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยในโรคจิตเภท ณ สถาบันจิตเวช-
ศาสตร์สมเด็จพระยา (KNOWLEDGE, ATTITUDE AND CIGARETTE SMOKING BEHAVIOR
AMONG IN-PATIENTS SCHIZOPHRENIC AT SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF
PSYCHIATRY) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุรณี กาญจนฉวีรักษ์, 174 หน้า.
ISBN 974-17-4894-9

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความชุกของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทำการศึกษาในกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ป่วยในโรคจิตเภท ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ แบบวัดระดับสารนิโคติน และแบบวัดความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ค่าสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย และเปอร์เซ็นต์ไทล์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดย One Way ANOVA , Unpair t-test และ Chi-square test วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ อายุ ระยะเวลาป่วยทางจิต ระดับการติดสารนิโคติน และความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ โดยใช้ Pearson's product moment correlation coefficient และใช้ Stepwise Multiple Regression และ Logistic Regression Analysis ในการหาปัจจัยทำนายความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

ผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ปี มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา พบว่า ความชุกของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยชายร้อยละ 70.63 และผู้ป่วยหญิงร้อยละ 18.18 กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในระดับดี มีทัศนคติทางลบเกี่ยวกับบุหรี่ และมีความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่มีระดับการติดสารนิโคตินอยู่ในระดับปานกลางและมีแนวโน้มพัฒนาไปเป็นการติดสารนิโคตินในระดับสูง

พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ อายุของผู้ป่วย และระยะเวลาป่วยทางจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความรู้มีความสัมพันธ์ทางลบกับ ทัศนคติ และความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ และระดับการติดสารนิโคตินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางลบกับ อายุของผู้ป่วยและระยะเวลาป่วยทางจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับ อายุของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

พบว่า ความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจกับ ระยะเวลาการป่วยทางจิตเป็นปัจจัยทำนายต่อความรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจกับ ระยะเวลาการใช้บุหรี่เป็นปัจจัยทำนายต่อ ทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระยะเวลาที่ใช้สารเสพติดอื่น, ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ และความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ เป็นปัจจัยทำนายต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

TE 156430

##4575358730 : MAJOR MENTAL HEALTH

KEY WORDS : KNOWLEDGE / ATTITUDE / CIGARETTE SMOKING BEHAVIOR / IN-PATIENT

SCHIZOPHRENIA / SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY

THUNCHANOK JI-NGA: KNOWLEDGE, ATTITUDE AND CIGARETTE

SMOKING BEHAVIOR AMONG IN-PATIENTS SCHIZOPHRENIC AT

SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY. THESIS

ADVISOR : ASST. PROF. BURANEE KANCHANATAWAN, M'D ; 174 pp.

ISBN 974-17-4894-9

The purposes of this descriptive cross-sectional study were to study knowledge, attitude, behavior toward cigarette smoking and related factors. The subject included 220 schizophrenic in-patient in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. They completed the questionnaires that consisted of demographic data, knowledge, attitude, Fagerstrom Test for Nicotine Dependence, Sensation Seeking Scale and behavior toward cigarette smoking. Data was analyzed using the SPSS for a personal computer package. Descriptive analysis consisted of mean, SD, range and percentile. Unpaired t-test, One Way ANOVA, Chi-square test and Pearson's product moment correlation coefficient were to analyze association among factor. Stepwise multiple regression, Logistic regression analysis was predicted knowledge, attitude and smoking behavior.

The result of the analysis can be summarized as followed : Most of subject were male, aged 20-29, had a low level of education. Prevalence rate of smoking behavior were 70.63 percent in male group and 18.18 percent in female group. Smokers and non smokers had a good level of knowledge, negative attitude toward smoking, a moderate level of sensation seeking. Smokers had a moderate level of nicotine dependence and trend to develop to high level of nicotine dependence.

Knowledge had statistically positive correlation with age of patients and duration of mental illness and had negative correlation with attitude and sensation seeking. Attitude had positive correlation with sensation seeking and level of nicotine and had negative correlation with age of patients and duration of mental illness. Sensation seeking had negative correlation with age of patients. Predictive factors of knowledge toward cigarette smoking were sensation seeking and duration of mental illness. Predictive factors of attitude toward smoking were sensation seeking and duration of cigarette use. Predictive factors of behavior toward cigarette smoking were duration of substance use, attitude and sensation seeking.