

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 การศึกษาผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อการฟื้นระยะพักตัวของว่านงูนาง

4.1.1 การฟื้นระยะพักตัว

การศึกษาผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อการฟื้นระยะพักตัวของว่านงูนาง โดยการให้ปัจจัยอุณหภูมิกลางวัน ปัจจัยความชื้น และปัจจัยระยะเวลาที่ว่านงูนางได้รับอุณหภูมิและความชื้นแตกต่างกัน พบว่าว่านงูนางในกรรมวิธีทดลองต่างๆ ฟื้นระยะพักตัวและแทงหน่อใหม่ฟื้นวัสดุปลูกตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553 (25 วัน หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (51 วัน หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมที่ 3 ที่ได้รับสภาพอุณหภูมิและความชื้นปกติตามธรรมชาติและไม่ได้ผ่านการบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตยังไม่แทงหน่อฟื้นวัสดุปลูก ณ วันที่เก็บข้อมูลครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

เมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นที่ให้แก่หัวว่านงูนางเป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต พบว่าปัจจัยอุณหภูมิที่หัวว่านงูนางเคยได้รับมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ตารางที่ 1) โดยหัวที่เคยได้รับอุณหภูมิกกลางวัน 15 องศาเซลเซียสแทงหน่อเร็วกว่าหัวที่เคยได้รับอุณหภูมิกกลางวัน 10 องศาเซลเซียส 6 วัน (ตารางที่ 2) ส่วนปัจจัยความชื้นที่หัวว่านงูนางเคยได้รับก่อนกระตุ้นการเจริญเติบโต ไม่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัยต่อระยะเวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ตารางที่ 1) ว่านงูนางในกรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกกลางวัน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำฟื้นระยะพักตัวและแทงหน่อก่อนกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกกลางวัน 10 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำเป็นเวลา 7 วัน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวว่านจูงนางที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้วบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------------------|-------------------------|----|-------------|----------|-------|
| Corrected Model | 163.35 | 3 | 54.45 | 5.08 | 0.012 |
| Intercept | 17,346.05 | 1 | 17,346.05 | 1,617.35 | 0.000 |
| temperature | 140.45 | 1 | 140.45 | 13.10 | 0.002 |
| moisture | 14.45 | 1 | 14.45 | 1.35 | 0.263 |
| temperature × moisture | 8.45 | 1 | 8.45 | 0.79 | 0.388 |
| Error | 171.60 | 16 | 10.73 | | |
| Total | 17,681.00 | 20 | | | |
| Corrected Total | 334.95 | 19 | | | |

ตารางที่ 2 ผลของอุณหภูมิและความชื้นที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับเป็นเวลา 3 เดือน ต่อจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อ ภายหลังจากการบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)

| อุณหภูมิกลางคืน (°C) | จำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อ | | |
|---|----------------------------|-------|--|
| | ความชื้น ^{1/} | | ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอุณหภูมิ ^{2/} |
| | ให้น้ำ | งดน้ำ | |
| 10 | 34 | 31 | 33 B |
| 15 | 27 | 27 | 27 A |
| ค่าเฉลี่ยของปัจจัยความชื้น ^{ns/} | 31 | 29 | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสครัมภ์และแถวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

^{2/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอุณหภูมิที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

^{ns/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยความชื้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

เมื่อวิเคราะห์ผลของปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นที่ให้แก่ว่านจูงนาง เป็นระยะเวลา 2 เดือนก่อนบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต พบว่าปัจจัยอุณหภูมิที่หัวว่านจูงนางเคย ได้รับมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ตารางที่ 3) โดยหัวที่เคยได้รับอุณหภูมิ กลางคืน 15 องศาเซลเซียสแทงหน่อเร็วกว่าหัวที่เคยได้รับอุณหภูมิกกลางคืน 10 องศาเซลเซียส 13 วัน (ตารางที่ 4) ส่วนปัจจัยความชื้นที่หัวพันธุ์เคยได้รับก่อนกระตุ้นการเจริญเติบโตไม่มีผลต่อ เวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวว่านจูงนาง และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัยต่อระยะเวลาที่ ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ตารางที่ 3) ว่านจูงนางในกรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำพื้นระยะพักตัวและแทงหน่อก่อนกรรมวิธีที่เคยได้รับ อุณหภูมิกกลางคืน 10 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำเป็นเวลา 12 ถึง 15 วัน (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวว่านจูงนาง ที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน แล้วบ่มกระตุ้น การเจริญเติบโต

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------------------|-------------------------|----|-------------|-------|-------|
| Corrected Model | 921.2 | 3 | 307.1 | 4.3 | 0.021 |
| Intercept | 39,072.8 | 1 | 39,072.8 | 544.6 | 0.000 |
| temperature | 897.8 | 1 | 897.8 | 12.5 | 0.003 |
| moisture | 7.2 | 1 | 7.2 | 0.1 | 0.756 |
| temperature * moisture | 16.2 | 1 | 16.2 | 0.2 | 0.641 |
| Error | 1,148.0 | 6 | 71.8 | | |
| Total | 41,142.0 | 20 | | | |
| Corrected Total | 2,069.2 | 19 | | | |

ตารางที่ 4 ผลของอุณหภูมิและความชื้นที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับเป็นเวลา 2 เดือน ต่อจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อ ภายหลังการบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)

| อุณหภูมิกลางคืน (°C) | จำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อ | | |
|---|----------------------------|-------|--|
| | ความชื้น ^{1/} | | ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอุณหภูมิ ^{2/} |
| | ให้น้ำ | งดน้ำ | |
| 10 | 51 | 51 | 51 B |
| 15 | 39 | 36 | 38 A |
| ค่าเฉลี่ยของปัจจัยความชื้น ^{ns/} | 45 | 44 | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์และแถวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

^{2/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอุณหภูมิที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

^{ns/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยความชื้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

เมื่อพิจารณาผลของปัจจัยอุณหภูมิ ปัจจัยความชื้น และปัจจัยระยะเวลาที่หัวว่านจูงนางได้รับ อุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยระยะเวลาที่หัวว่านจูงนางได้รับ อุณหภูมิมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ ในขณะที่ปัจจัยความชื้นที่ หัวว่านจูงนางเคยได้รับ ไม่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ตารางที่ 5) และ ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสามปัจจัยต่อระยะเวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ตารางที่ 5) แต่มีแนวโน้มของอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยระยะเวลาที่หัวว่านจูงนางได้รับ อุณหภูมิต่อระยะเวลาที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ตารางที่ 5)

กรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรืองดน้ำเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้หัวว่านจูงนางพันธุ์พะยะพักตัวและแทงหน่อก่อนกรรมวิธีที่เคยได้รับอุณหภูมิกกลางคืน 10 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 เดือน เป็นเวลา 24 วัน (ตารางที่ 6) หัวว่านจูงนางที่เก็บไว้ในสภาพ อุณหภูมิปกติควบคู่กับการรดน้ำเป็นเวลา 3 เดือนแทงหน่อก่อนกรรมวิธีอื่นแต่ไม่ต่างกับกรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกกลางคืน 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 เดือน

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวว่านงูนาง
ที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิ ปัจจัยความชื้น และปัจจัยระยะเวลาที่ว่านงูนางได้รับอุณหภูมิ
และความชื้น แล้วบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------|-------|
| Corrected Model | 3,260.18 | 7 | 465.74 | 11.29 | 0.000 |
| Intercept | 54,243.23 | 1 | 54,243.23 | 1,315.39 | 0.000 |
| time | 2,175.63 | 1 | 2175.63 | 52.76 | 0.000 |
| temperature | 874.23 | 1 | 874.23 | 21.20 | 0.000 |
| moisture | 21.03 | 1 | 21.03 | 0.51 | 0.480 |
| time × temperature | 164.03 | 1 | 164.03 | 3.98 | 0.055 |
| time × moisture | 0.63 | 1 | 0.63 | 0.02 | 0.903 |
| temperature × moisture | 0.63 | 1 | 0.63 | 0.02 | 0.903 |
| time × temperature × moisture | 24.03 | 1 | 24.03 | 0.58 | 0.451 |
| Error | 1,319.60 | 32 | 41.24 | | |
| Total | 58,823.00 | 40 | | | |
| Corrected Total | 4,579.80 | 39 | | | |



ตารางที่ 6 ผลของอุณหภูมิและความชื้นที่หัวว่านงูนางเคยได้รับเป็นเวลา 2 และ 3 เดือน ต่อจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวว่านงูนาง ภายหลังจากบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 (n = 5)

กรรมวิธีที่ให้แก่วัสดุ

| อุณหภูมิกลางคืน (°C) | ความชื้น | ระยะเวลา (เดือน) | จำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวว่านงูนาง ^{1/} | |
|--|----------|---------------------|---|--------------------|
| กรรมวิธีทดลอง (บ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) | | | วันที่ | |
| 10 | ให้น้ำ | 3 | 34 bc | (9 ก.พ. 53) |
| 10 | งดน้ำ | 3 | 31 ab | (6 ก.พ. 53) |
| 15 | ให้น้ำ | 3 | 27 a | (2 ก.พ. 53) |
| 15 | งดน้ำ | 3 | 27 a | (2 ก.พ. 53) |
| 10 | ให้น้ำ | 2 | 51 d | (26 ก.พ. 53) |
| 10 | งดน้ำ | 2 | 51 d | (26 ก.พ. 53) |
| 15 | ให้น้ำ | 2 | 39 c | (14 ก.พ. 53) |
| 15 | งดน้ำ | 2 | 36 bc | (11 ก.พ. 53) |
| กรรมวิธีควบคุม (บ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) | | | | |
| ปกติ | ให้น้ำ | 3 | 38 bc | (13 ก.พ. 53) |
| ปกติ | งดน้ำ | 3 | 25 a | (31 ม.ค. 53) |
| สภาพธรรมชาติ (ไม่บ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) | | | - | (ปลายเดือนพฤษภาคม) |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

- ไม่แทงหน่อจนกระทั่งปลายเดือนพฤษภาคม

4.1.2 ตำแหน่งปล้องที่เกิดหน่อ

หัวว่านงูนางในทุกกรรมวิธีแทงหน่อจากปล้องที่ 2 และ 3 (ตารางที่ 7) ซึ่งปัจจัยอุณหภูมิ ปัจจัยความชื้น และปัจจัยระยะเวลาที่หัวว่านงูนางได้รับอุณหภูมิและความชื้น ไม่มีผลต่อตำแหน่งปล้องที่เกิดหน่อ (ตารางที่ 7) และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสามปัจจัยต่อตำแหน่งปล้องที่เกิดหน่อ (ภาคผนวกที่ 1)

ตารางที่ 7 ตำแหน่งปล้องที่เกิดหน่อบนหัวว่านจูงนางที่เคยได้รับอุณหภูมิ ความชื้น และระยะเวลาที่ได้รับปัจจัยทั้งสองตามกรรมวิธีที่แตกต่างกัน แล้วบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (n = 5)

| กรรมวิธีที่ให้แก่หัวพันธุ์ | | | ตำแหน่งปล้องที่เกิดหน่อ ^{ns/} |
|---|----------|---------------------|--|
| อุณหภูมิมิดกลางคืน (°C) | ความชื้น | ระยะเวลา (เดือน) | |
| กรรมวิธีทดลอง (บ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) | | | |
| 10 | ให้น้ำ | 3 | 2.8 |
| 10 | งดน้ำ | 3 | 3.0 |
| 15 | ให้น้ำ | 3 | 3.0 |
| 15 | งดน้ำ | 3 | 2.8 |
| 10 | ให้น้ำ | 2 | 2.8 |
| 10 | งดน้ำ | 2 | 2.4 |
| 15 | ให้น้ำ | 2 | 2.8 |
| 15 | งดน้ำ | 2 | 2.6 |
| กรรมวิธีควบคุม (บ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) | | | |
| ปกติ | ให้น้ำ | 3 | 2.8 |
| ปกติ | งดน้ำ | 3 | 2.8 |


^{ns/} ค่าเฉลี่ยในสคมภ์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการวิเคราะห์ ANOVA

4.1.3 การเจริญเติบโต


4.1.3.1 ความสูงของต้น

ว่านจูงนางมีความสูงของต้นเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างคงที่ในทุกกรรมวิธีทดลองในช่วง 6 สัปดาห์แรกหลังการแทงหน่อ (ภาพที่ 7) โดยกรรมวิธีที่เคยได้รับอุณหภูมิมิดกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรืองดน้ำเป็นเวลา 3 เดือน และกรรมวิธีที่เคยได้รับอุณหภูมิปกติ ช่วงฤดูหนาวควบคู่กับการงดน้ำเป็นเวลา 3 เดือน สูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ต้นว่านจูงนางในกรรมวิธีที่เคยได้รับอุณหภูมิมิดกลางคืนทั้ง 10 และ 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 เดือนแทงหน่อช้ากว่าต้นว่านจูงนางในกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิทั้ง 10 และ 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 เดือน จึงมีความสูง

เฉลี่ยของต้นน้อยกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างชัดเจน ภายหลังการบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต 1 ถึง 2 เดือนแรก (ภาพที่ 7 และตารางที่ 8) เมื่อเทียบความสูงนับจากวันแทงหน่อของต้นว่านจูงนางในแต่ละกรรมวิธีจะเห็นว่า ว่านจูงนางในกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิ 10 และ 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 เดือนเพิ่มความสูงช้ากว่ากรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยที่ให้เป็นเวลา 3 เดือน (ภาพที่ 8) อย่างไรก็ตาม ความสูงของต้นในกรรมวิธีดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับต้นว่านจูงนางกรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อเจริญเติบโตได้ราว 70 วัน นับจากแทงหน่อ (ภาพที่ 8)



ภาพที่ 7 ความสูงของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)



ภาพที่ 8 ความสูงของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุทกภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง นับจากวันแทงหน่อ (n = 5)

ปัจจัยอุทกภูมิและปัจจัยระยะเวลาที่ว่านจูงนางเคยได้รับอุทกภูมิมีผลต่อความสูงของต้นเมื่อ 4 5 และ 6 สัปดาห์ หลังการบ่มกระตุนการเจริญเติบโต ทั้งนี้ปัจจัยความชื้นที่หัวว่านจูงนางได้รับ ไม่มีผลต่อความสูงของต้น และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสามปัจจัยต่อความสูงของต้น (ภาคผนวกที่ 2) เนื่องจากกรรมวิธีที่ให้อุทกภูมิกกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำเป็นเวลา 3 เดือน และกรรมวิธีที่ได้รับอุทกภูมิปกติช่วงฤดูหนาวควบคู่กับการรดน้ำเป็นเวลา 3 เดือนแทงหน่อพื้นวัสดุปลูกได้เร็วกว่ากรรมวิธีอื่นๆ เมื่อ 4 สัปดาห์หลังการบ่มกระตุนการเจริญเติบโต กรรมวิธีดังกล่าวจึงมีความสูงของต้นมากกว่าทุกกรรมวิธีทดลอง ในขณะที่กรรมวิธีที่ให้อุทกภูมิกกลางคืน 10 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำเป็นเวลา 2 เดือน และกรรมวิธีที่ให้อุทกภูมิกกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำเป็นเวลา 2 เดือนยังไม่แทงหน่อพื้นวัสดุปลูกจึงไม่มีความสูงของต้น (ตารางที่ 8)

เมื่อ 6 สัปดาห์หลังการแทงหน่อ พบว่าปัจจัยระยะเวลาที่ว่านจูงนางได้รับอุทกภูมิและความชื้น และปัจจัยอุทกภูมิกกลางคืนที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับมีผลต่อความสูงของต้น โดยกรรมวิธีที่ให้อุทกภูมิกกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำเป็นเวลา

3 เดือน ทำให้ว่านจูงนางมีความสูงของต้นมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ตามเวลาในการแทงหน่อ (ภาพที่ 7 และตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 ความสูงของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)


| กรรมวิธีที่ให้แก่หัวพันธุ์ | | | ความสูงของต้น (เซนติเมตร) ^{1/} | | |
|---|----------|---------------------|--|---------|----------|
| | | | เวลาหลังบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต (สัปดาห์) | | |
| อุณหภูมิกลางคืน (°C) | ความชื้น | ระยะเวลา (เดือน) | 4 | 5 | 6 |
| กรรมวิธีทดลอง (บ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต) | | | | | |
| 10 | ให้น้ำ | 3 | 0.16 b | 1.60 cd | 4.54 bcd |
| 10 | งดน้ำ | 3 | 0.27 b | 3.00 bc | 5.83 abc |
| 15 | ให้น้ำ | 3 | 1.77 a | 4.63 ab | 7.57 a |
| 15 | งดน้ำ | 3 | 1.70 a | 4.85 ab | 7.53 a |
| 10 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 b | 0.00 d | 1.05 ef |
| 10 | งดน้ำ | 2 | 0.00 b | 0.18 d | 0.54 f |
| 15 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 b | 0.15 d | 2.44 def |
| 15 | งดน้ำ | 2 | 0.27 b | 1.19 d | 3.82 cd |
| กรรมวิธีควบคุม (บ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต) | | | | | |
| ปกติ | ให้น้ำ | 3 | 0.00 b | 0.51 d | 3.52 cde |
| ปกติ | งดน้ำ | 3 | 1.65 a | 5.31 a | 7.19 ab |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference


4.1.3.2 เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น

หลังว่านจูงนางแทงหน่อ พบว่าว่านจูงนางมีแนวโน้มขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเพิ่มขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอในทุกกรรมวิธีช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังเริ่มแทงหน่อและเริ่มคงที่หลังจากนั้น เนื่องจากกรรมวิธีที่ให้หัวพันธุ์ได้รับอุณหภูมิกกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรืองดน้ำเป็นเวลา 3 เดือนแทงหน่อพันวัสดุปลูกได้เร็วกว่ากรรมวิธีอื่นโดยรวม จึงมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่กว่ากรรมวิธีอื่น กรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน 10 องศาเซลเซียส ควบคุมกับการให้น้ำหรือรดน้ำเป็นเวลา 2 เดือนทางเหนือพื้นวัสดุปลูกสูงกว่ากรรมวิธีอื่นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นน้อยกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างชัดเจน ภายหลังจากบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต 1 ถึง 2 เดือนแรก (ภาพที่ 9) เมื่อเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นนับจากวันทางเหนือจะเห็นได้จากภาพที่ 10 ว่าต้นว่านจูงนางในกรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นเป็นเวลา 2 เดือน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นน้อยกว่ากรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยเป็นเวลา 3 เดือน



ภาพที่ 9 เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)



ภาพที่ 10 เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของว่านจุงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง นับจากวันแทงหน่อ (n = 5)

ปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยระยะเวลาที่ว่านจุงนางเคยได้รับอุณหภูมิมีผลต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ในสัปดาห์ที่ 4 5 และ 6 หลังการบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสามปัจจัยต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น (ภาคผนวกที่ 3) โดยกรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำ และกรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกลางคืน 10 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำเป็นเวลา 3 เดือน ทำที่ว่านจุงนางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นมากกว่ากรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นต่างๆ เป็นเวลา 2 เดือน (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)


| กรรมวิธีที่ให้แก่หัวพันธุ์ | | | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น (มิลลิเมตร) ^{1/} | | |
|---|----------|---------------------|---|---------|-------|
| | | | เวลาหลังบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต (สัปดาห์) | | |
| อุณหภูมิกลางคืน (°C) | ความชื้น | ระยะเวลา (เดือน) | 4 | 5 | 6 |
| กรรมวิธีทดลอง (บ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต) | | | | | |
| 10 | ให้น้ำ | 3 | 0.9 c | 2.7 bcd | 5.6 a |
| 10 | งดน้ำ | 3 | 1.5 bc | 3.8 abc | 5.7 a |
| 15 | ให้น้ำ | 3 | 3.2 ab | 5.8 a | 6.3 a |
| 15 | งดน้ำ | 3 | 3.8 a | 5.8 a | 6.7 a |
| 10 | ให้น้ำ | 2 | 0.0 c | 0.0 e | 1.8 b |
| 10 | งดน้ำ | 2 | 0.0 c | 0.8 de | 1.8 b |
| 15 | ให้น้ำ | 2 | 0.0 c | 0.8 de | 3.0 b |
| 15 | งดน้ำ | 2 | 0.9 c | 1.7 cde | 4.9 a |
| กรรมวิธีควบคุม (บ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต) | | | | | |
| ปกติ | ให้น้ำ | 3 | 0.0 c | 1.9 cde | 5.4 a |
| ปกติ | งดน้ำ | 3 | 4.5 a | 4.9 ab | 5.7 a |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference


4.1.3.3 ความกว้างทรงพุ่มหรือทรงต้น

ว่านจูงนางมีความกว้างทรงพุ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากแทงหน่อในกรรมวิธีทดลองที่ได้รับปัจจัยเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนว่านจูงนางในกรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยเป็นเวลา 2 เดือนมีการเพิ่มความกว้างทรงพุ่มช้ากว่า (ภาพที่ 11) เนื่องจากกรรมวิธีที่เคยได้รับอุณหภูมิกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรืองดน้ำเป็นเวลา 3 เดือนแทงหน่อพันธุ์ปลูกได้เร็วกว่ากรรมวิธีอื่น จึงมีความกว้างของทรงพุ่มสูงกว่ากรรมวิธีอื่นในช่วง 2 เดือนภายหลังการบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต ส่วนกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน 10 องศาเซลเซียสควบคู่กับการงดน้ำเป็นเวลา 2 เดือนแทงหน่อพันธุ์ปลูกช้ากว่ากรรมวิธีอื่น จึงมีความกว้างทรงพุ่มน้อยกว่ากรรมวิธี

อื่นอย่างชัดเจนในช่วง 3 เดือนแรกภายหลังการบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (ภาพที่ 11 และตารางที่ 10) อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบความกว้างทรงพุ่ม โดยนับจากวันแทงหน่อของแต่ละกรรมวิธีจะเห็นว่าความกว้างทรงพุ่มของว่านจูงนางในกรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยเป็นเวลา 2 เดือนมีความกว้างทรงพุ่มใกล้เคียงกับต้นที่ได้รับปัจจัยเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อแทงหน่อแล้วประมาณ 70 วัน (ภาพที่ 12)



ภาพที่ 11 ความกว้างทรงพุ่มของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)



ภาพที่ 12 ความกว้างทรงพุ่มของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง นับจากวันแทงหน่อ (n = 5)

ปัจจัยอุณหภูมิ ปัจจัยความชื้น และปัจจัยระยะเวลาที่ว่านจูงนางได้รับอุณหภูมิและความชื้น มีผลต่อความกว้างทรงพุ่มแตกต่างกันออกไปในแต่ละสัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (ภาคผนวกที่ 4) โดยทั่วไปกรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกกลางคืน 15 องศาเซลเซียสทั้งที่ให้น้ำและงดน้ำเป็นเวลา 3 เดือน และกรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกกลางคืน 10 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรืองดน้ำเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ว่านจูงนางมีความกว้างทรงพุ่มมากกว่ากรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นต่างๆ เป็นเวลา 2 เดือน (ตารางที่ 10)


ตารางที่ 10 ความกว้างทรงพุ่มของต้นว่านงูนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุนการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)

| กรรมวิธีที่ให้แก่หัวพันธุ์ | | | ความกว้างทรงพุ่ม (เซนติเมตร) ^{1/} | | |
|---|----------|---------------------|--|---------|----------|
| | | | เวลาหลังบ่มกระตุนการเจริญเติบโต (สัปดาห์) | | |
| อุณหภูมิกลางคืน (°C) | ความชื้น | ระยะเวลา (เดือน) | 4 | 5 | 6 |
| | | | กรรมวิธีทดลอง (บ่มกระตุนการเจริญเติบโต) | | |
| 10 | ให้น้ำ | 3 | 0.15 c | 1.65 cd | 6.75 bcd |
| 10 | งดน้ำ | 3 | 0.40 bc | 4.68 ab | 10.05 ab |
| 15 | ให้น้ำ | 3 | 0.72 abc | 3.02 bc | 8.29 bc |
| 15 | งดน้ำ | 3 | 1.31 a | 6.72 a | 13.36 a |
| 10 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 c | 0.00 d | 1.49 e |
| 10 | งดน้ำ | 2 | 0.00 c | 0.11 d | 0.30 e |
| 15 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 c | 0.12 d | 1.59 e |
| 15 | งดน้ำ | 2 | 0.42 bc | 1.68 cd | 4.45 ed |
| กรรมวิธีควบคุม (บ่มกระตุนการเจริญเติบโต) | | | | | |
| ปกติ | ให้น้ำ | 3 | 0.00 c | 0.59 cd | 3.74 de |
| ปกติ | งดน้ำ | 3 | 0.99 ab | 3.21 bc | 8.20 bc |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference


4.1.3.4 จำนวนใบต่อต้น

ว่านงูนางมีจำนวนใบต่อต้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนว่านงูนางในกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกกลางคืน 10 องศาเซลเซียสทั้งที่งดน้ำและให้น้ำเป็นเวลา 2 เดือนที่แทงหน่อพันธุ์ปลูกช้ากว่ากรรมวิธีอื่นและมีการเพิ่มจำนวนใบต่อต้นช้ากว่ากรรมวิธีอื่นอย่างชัดเจนในช่วง 2 เดือนแรกภายหลังการบ่มกระตุนการเจริญเติบโต (ภาพที่ 13 และตารางที่ 11) เมื่อจำนวนใบคงที่แล้ว ว่านงูนางในกรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยต่างๆ เป็นเวลา 2 เดือนมีจำนวนใบโดยรวมน้อยกว่าต้นว่านงูนางกรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นเป็นเวลา 3 เดือนประมาณ 1 ใบ (ภาพที่ 14)



ภาพที่ 13 จำนวนใบต่อต้นของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)





ภาพที่ 14 จำนวนใบต่อต้นของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง นับจากวันแทงหน่อ (n = 5)

ปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยระยะเวลาที่ว่านจูงนางได้รับอุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อจำนวนใบต่อต้น ในสัปดาห์ที่ 4 ถึง 6 หลังจากกระตุ้นการเจริญเติบโต (ภาคผนวกที่ 5) กรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกว้าง 15 องศาเซลเซียสทั้งที่ให้น้ำและงดน้ำเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ว่านจูงนางมีจำนวนใบต่อต้นเฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นต่างๆ เป็นเวลา 2 เดือน (ตารางที่ 11) แต่ปัจจัยความชื้นที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับไม่มีผลต่อจำนวนใบต่อต้น (ภาคผนวกที่ 5) และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสามปัจจัยต่อจำนวนใบต่อต้น (ภาคผนวกที่ 5)


ตารางที่ 11 จำนวนใบต่อต้นของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุนการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)

| กรรมวิธีที่ให้แกหัวพันธุ์ | | | จำนวนใบต่อต้น ^{1/} | | |
|--|----------|---------------------|---|----------|---------|
| | | | เวลาหลังบ่มกระตุนการเจริญเติบโต (สัปดาห์) | | |
| อุณหภูมิกลางคืน (°C) | ความชื้น | ระยะเวลา (เดือน) | 4 | 5 | 6 |
| กรรมวิธีทดลอง (บ่มกระตุนการเจริญเติบโต) | | | | | |
| 10 | ให้น้ำ | 3 | 0.60 c | 2.00 bc | 4.2 abc |
| 10 | งดน้ำ | 3 | 0.80 bc | 3.00 b | 4.0 abc |
| 15 | ให้น้ำ | 3 | 2.20 ab | 4.08 a | 5.4 a |
| 15 | งดน้ำ | 3 | 2.80 a | 4.60 a | 5.0 ab |
| 10 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 c | 0.00 d | 1.4 d |
| 10 | งดน้ำ | 2 | 0.00 c | 0.60 cd | 0.8 d |
| 15 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 c | 0.60 cd | 3.8 bc |
| 15 | งดน้ำ | 2 | 0.06 c | 1.40 bcd | 3.2 c |
| กรรมวิธีควบคุม (บ่มกระตุนการเจริญเติบโต) | | | | | |
| ปกติ | ให้น้ำ | 3 | 0.00 c | 1.60 bcd | 3.4 bc |
| ปกติ | งดน้ำ | 3 | 2.60 a | 4.20 a | 4.6 abc |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสมรภักเดียวกันที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

4.1.3.5 ความกว้างใบของใบที่กว้างที่สุด

ว่านจูงนางมีความกว้างใบเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างคงที่ในทุกกรรมวิธีทดลอง ในช่วงประมาณ 6 สัปดาห์แรกหลังการแทงหน่อ (ภาพที่ 15) โดยกรรมวิธีที่เคยได้รับอุณหภูมิกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรืองดน้ำเป็นเวลา 3 เดือนแทงหน่อพ้นวัสดุปลูกได้เร็วกว่ากรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน 10 องศาเซลเซียสควบคู่กับการงดน้ำหรือให้น้ำเป็นเวลา 2 เดือน จึงมีความกว้างใบมากกว่ากรรมวิธีทั้งสองดังกล่าวอย่างชัดเจนในช่วง 10 สัปดาห์ภายหลังการบ่มกระตุนการเจริญเติบโต (ภาพที่ 15) เมื่อเทียบความกว้างใบนับจากวันแทงหน่อของต้นว่านจูงนางในแต่ละกรรมวิธีจะเห็นว่าว่านจูงนางในกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิ 10 และ 15 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 16 ความกว้างใบของใบที่กว้างที่สุดของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับ อุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง นับจากวันแทงหน่อ (n = 5)

ในช่วง 4 ถึง 6 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต พบว่าปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยระยะเวลาที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับอุณหภูมิมิมีผลต่อความกว้างใบ ในขณะที่ปัจจัยความชื้นที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับโดยทั่วไปไม่มีผลต่อความกว้างใบ (ภาคผนวกที่ 6) ดังนั้นกรรมวิธีที่ให้ อุณหภูมิกลางคืน 15 องศาเซลเซียสควบคู่กับการให้น้ำหรือรดน้ำเป็นเวลา 3 เดือนทำให้ว่านจูงนางมีความกว้างใบมากกว่ากรรมวิธีที่ได้รับปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยความชื้นต่างๆ เป็นเวลา 2 เดือน (ตารางที่ 12)


ตารางที่ 12 ความกว้างใบของใบที่กว้างที่สุดของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับ
อุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุนการเจริญเติบโตตั้งแต่
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)

| กรรมวิธีที่ให้แก่วัสดุ | | | ความกว้างใบ (เซนติเมตร) ^{1/} | | |
|--|----------|---------------------|---|---------|----------|
| | | | เวลาหลังบ่มกระตุนการเจริญเติบโต (สัปดาห์) | | |
| อุณหภูมิกลางคืน (°C) | ความชื้น | ระยะเวลา (เดือน) | 4 | 5 | 6 |
| กรรมวิธีทดลอง (บ่มกระตุนการเจริญเติบโต) | | | | | |
| 10 | ให้น้ำ | 3 | 0.09 bc | 0.37 cd | 1.22 abc |
| 10 | งดน้ำ | 3 | 0.18 bc | 0.70 bc | 1.40 abc |
| 15 | ให้น้ำ | 3 | 0.37 ab | 0.96 ab | 1.66 a |
| 15 | งดน้ำ | 3 | 0.55 a | 1.22 a | 1.86 a |
| 10 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 c | 0.00 d | 0.25 e |
| 10 | งดน้ำ | 2 | 0.00 c | 0.11 d | 0.21 e |
| 15 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 c | 0.08 d | 0.52 de |
| 15 | งดน้ำ | 2 | 0.12 bc | 0.34 cd | 0.90 cd |
| กรรมวิธีควบคุม (บ่มกระตุนการเจริญเติบโต) | | | | | |
| ปกติ | ให้น้ำ | 3 | 0.00 c | 0.32 cd | 1.01 cd |
| ปกติ | งดน้ำ | 3 | 0.54 a | 0.99 ab | 1.60 ab |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

4.1.3.6 ความยาวใบของใบที่ยาวที่สุด

ต้นว่านจูงนางที่เจริญออกมาจากหัวพันธุ์มีความยาวใบของใบที่ยาวที่สุดเพิ่มขึ้นอย่าง
ค่อนข้างคงที่ในทุกกรรมวิธีทดลองในช่วงแรกหลังการแทงหน่อ แล้วเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ดังที่
เห็นได้จากความชันของเส้นแผนภูมิในภาพที่ 17 กรรมวิธีที่เคยได้รับอุณหภูมิกลางคืน 15
องศาเซลเซียสควบคู่กับการรดน้ำหรือให้น้ำเป็นเวลา 3 เดือนที่แทงหน่อพันธุ์วัสดุปลูกได้เร็วกว่า
กรรมวิธีอื่นๆ มีความยาวใบมากกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างชัดเจนในช่วง 12 สัปดาห์หลังการบ่มกระตุน



ภาพที่ 18 ความยาวใบของใบที่ยาวที่สุดของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับอุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง นับจากวันแทงหน่อ (n = 5)

ปัจจัยอุณหภูมิและปัจจัยระยะเวลาที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับอุณหภูมิมิผลต่อความยาวใบของต้นว่านจูงนางในสัปดาห์ที่ 4 ถึง 6 หลังการบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (ภาคผนวกที่ 7) ในขณะที่ปัจจัยความชื้นที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับ ไม่มีผลต่อความยาวใบ และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสามปัจจัยต่อความยาวใบ (ภาคผนวกที่ 7) ในสัปดาห์ที่ 4 ถึง 6 หลังการบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต กรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิมิผลต่อความยาวใบมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ตามเวลาในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ตารางที่ 13)

ตารางที่ 13 ความยาวใบของใบที่ยาวที่สุดของต้นว่านจูงนางที่เจริญจากหัวพันธุ์ที่เคยได้รับ อุณหภูมิและความชื้นตามกรรมวิธีทดลอง หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 (n = 5)

| กรรมวิธีที่ให้แก่วัสดุ | | | ความยาวของใบ (เซนติเมตร) ^{1/} | | |
|--|----------|---------------------|--|---------|----------|
| | | | เวลาหลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (สัปดาห์) | | |
| อุณหภูมิกลางวัน (°C) | ความชื้น | ระยะเวลา (เดือน) | 4 | 5 | 6 |
| กรรมวิธีทดลอง (บ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) | | | | | |
| 10 | ให้น้ำ | 3 | 0.12 b | 1.19 bc | 3.58 bc |
| 10 | งดน้ำ | 3 | 0.17 b | 1.79 b | 4.23 bc |
| 15 | ให้น้ำ | 3 | 1.32 a | 3.40 a | 6.31 a |
| 15 | งดน้ำ | 3 | 0.93 a | 3.25 a | 5.84 a |
| 10 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 b | 0.00 c | 0.69 ef |
| 10 | งดน้ำ | 2 | 0.00 b | 0.12 c | 0.35 f |
| 15 | ให้น้ำ | 2 | 0.00 b | 0.10 c | 1.50 def |
| 15 | งดน้ำ | 2 | 0.15 b | 0.68 bc | 2.65 cde |
| กรรมวิธีควบคุม (บ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) | | | | | |
| ปกติ | ให้น้ำ | 3 | 0.00 b | 0.39 c | 2.85 cde |
| ปกติ | งดน้ำ | 3 | 0.96 a | 3.11 a | 5.19 ab |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

4.1.4 การคำนวณอุณหภูมิสะสม (Heat cumulation)

จากข้อมูลการผันระยะพักตัว เมื่อนำมาทำแผนภูมิเส้น พบว่าค่า Heat Unit ที่สะสมต่อวันในแต่ละอุณหภูมิของอากาศน่ามีความสัมพันธ์แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล จึงกำหนดค่า Unit (U) จากอุณหภูมิอากาศ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 U \text{ เมื่ออุณหภูมิเท่ากับ } 10^{\circ}\text{C} &= U_{10^{\circ}\text{C}} = 0 \text{ หน่วยต่อวัน} \\
 U \text{ เมื่ออุณหภูมิเท่ากับ } 15^{\circ}\text{C} &= U_{15^{\circ}\text{C}} = 0.5 \text{ หน่วยต่อวัน} \\
 U \text{ เมื่ออุณหภูมิเท่ากับ } 25^{\circ}\text{C} &= U_{25^{\circ}\text{C}} = 2 \text{ หน่วยต่อวัน}
 \end{aligned}$$

$$U \text{ เมื่ออุณหภูมิเท่ากับ } 30^{\circ}\text{C} = U_{30^{\circ}\text{C}} = 4 \text{ หน่วยต่อวัน}$$

$$U \text{ เมื่ออุณหภูมิเท่ากับ } 35^{\circ}\text{C} = U_{35^{\circ}\text{C}} = 8 \text{ หน่วยต่อวัน}$$

จากค่า HU ของแต่ละอุณหภูมิดังกล่าวและเนื่องจากแต่ละวันห้ว่านจุงนางได้รับอุณหภูมิ สลับอย่างละ 12 ชั่วโมง จึงคำนวณได้ว่าความร้อนสะสมของห้ว่านจุงนางในกรรมวิธีที่ได้รับ สภาพอุณหภูมิกกลางคืน 10 หรือ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางวัน 25 องศาเซลเซียส แล้วบ่ม กระตุ้นการเจริญเติบโตมีค่าดังสมการที่ 3 และสมการที่ 4 ตามลำดับ

$$HU = (U_{10^{\circ}\text{C}} \times (X/2)) + (U_{25^{\circ}\text{C}} \times (X/2)) + (U_{30^{\circ}\text{C}} \times (D_E/2)) + (U_{35^{\circ}\text{C}} \times (D_E/2)) \dots (\text{สมการที่ } 3)$$

$$HU = (U_{15^{\circ}\text{C}} \times (X/2)) + (U_{25^{\circ}\text{C}} \times (X/2)) + (U_{30^{\circ}\text{C}} \times (D_E/2)) + (U_{35^{\circ}\text{C}} \times (D_E/2)) \dots (\text{สมการที่ } 4)$$

เมื่อกำหนดให้

$U_{10^{\circ}\text{C}}, U_{15^{\circ}\text{C}}, U_{25^{\circ}\text{C}}, U_{30^{\circ}\text{C}}, U_{35^{\circ}\text{C}}$ คือ ความร้อนสะสมต่อวันที่อุณหภูมิ 10, 15, 25, 30 และ 35 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

X คือ จำนวนวันที่ได้รับอุณหภูมิที่ 10 หรือ 15 องศาเซลเซียส สลับกับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อย่างละครึ่งวัน ซึ่งเท่ากับ 94 วัน

D_E (number of days to emergence) คือ จำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อ นับตั้งแต่วันที่บ่ม กระตุ้นการเจริญเติบโต

กรณีที่ห้ว่านจุงนางในกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกกลางคืน 10°C อุณหภูมิกลางวัน 25°C เป็นเวลา 94 วัน และใช้เวลา 27 วัน นับจากวันบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตจนถึงวันแทงหน่อ แทนค่าในสมการที่ 3 ได้ดังนี้

$$HU = (0 \times (94/2)) + (2 \times (94/2)) + (4 \times (27/2)) + (8 \times (27/2))$$

$$HU = (0 \times 47) + (2 \times 47) + (4 \times 13.5) + (8 \times 13.5)$$

$$HU = 256 \text{ unit}$$


เนื่องจากกรณีของห้ว่านจุงนางในกรรมวิธีที่ให้อุณหภูมิกกลางคืน/กลางวัน 15/25 องศาเซลเซียส เกิดขัดข้องเนื่องจากไฟฟ้าดับในขณะที่ดำเนินการทดลอง 1 วัน จึงย้ายห้ว่านจุงนางไป อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิกกลางคืน/กลางวัน 10/25 องศาเซลเซียส จึงได้ใช้ค่าของอุณหภูมิ

กลางคืน 10 องศาเซลเซียส เข้ามาแทนที่ในการคำนวณของกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 วัน


จากผลการคำนวณ พบว่าความร้อนสะสมที่ทำให้ว่านงูนางพันระยะพักตัวในกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน/กลางวัน 10/25 องศาเซลเซียสที่งูค้ำและให้น้ำ มีค่าเฉลี่ย 278 และ 296 unit ตามลำดับ ส่วนความร้อนสะสมของกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน/กลางวัน 15/25 องศาเซลเซียสที่งูค้ำและให้น้ำมีค่าเฉลี่ย 277 และ 279 unit ตามลำดับ (ตารางที่ 14)

การคำนวณจากสมการและ HU ที่กำหนดข้างต้นเป็นการนำอุณหภูมิอากาศตามกรรมวิธีมาใช้แทนค่าโดยไม่ได้แยกอุณหภูมิออกเป็นของวัสดุปลูกที่แห้งและวัสดุปลูกที่ชื้น ซึ่งในความเป็นจริงหัวว่านงูนางพันสัมผัสโดยตรงกับวัสดุปลูก ทำให้หัวว่านงูนางพันได้รับอุณหภูมิไม่เท่ากัน แม้ว่าอุณหภูมิอากาศเท่ากัน (ภาพที่ 19) อุณหภูมิในเวลากลางวันของวัสดุปลูกที่แห้งใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศ แต่อุณหภูมิของวัสดุปลูกที่ชื้นต่ำกว่าวัสดุปลูกที่แห้งประมาณ 3 องศาเซลเซียส ส่วนเวลากลางคืนอุณหภูมิของวัสดุปลูกที่ชื้นต่ำกว่าวัสดุปลูกที่แห้งประมาณ 2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้หัวในกรรมวิธีที่งูค้ำได้รับอุณหภูมิสูงกว่ากรรมวิธีที่ให้น้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้หัวมีการสะสม HU ไม่เท่ากัน HU ของกรรมวิธีที่เคยได้รับอุณหภูมิกลางคืน 10 องศาเซลเซียส แต่เคยอยู่ในวัสดุปลูกที่ชื้นและแห้งมีความแตกต่างกัน (296 และ 278 Unit ตามลำดับ) ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงสมการ โดยใช้อุณหภูมิของวัสดุปลูกที่แห้งและอุณหภูมิของวัสดุปลูกที่ชื้นทั้งในกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน/กลางวัน 10/ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิกลางคืน/กลางวัน 15/25 องศาเซลเซียส โดยนำข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึกอุณหภูมิที่บันทึกข้อมูลทุกนาที พบว่าอุณหภูมิอากาศภายในตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิ 10°C หรือ 15°C เป็น 25°C อย่างรวดเร็ว แต่อุณหภูมิของวัสดุปลูกนั้นมีช่วงเพิ่มหรือลดอุณหภูมินานกว่าอุณหภูมิอากาศประมาณ 6 ชั่วโมง ดังแสดงในภาพที่ 19 (ก) และ (ข) สมการคำนวณ HU จึงใช้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิของวัสดุปลูกในแต่ละชั่วโมงของช่วง 6 ชั่วโมงแรกที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง (ภาพที่ 20) เพื่อให้มีความละเอียดของการคำนวณมากกว่าจากสมการเดิมที่ใช้อุณหภูมิอากาศ ดังสมการที่ 5

(ก) กรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน 10°C สลับอุณหภูมิกลางวัน 25°C



(ข) กรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน 15°C สลับอุณหภูมิกลางวัน 25°C



ภาพที่ 19 อุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของวัสดุปลูกในสภาวะขึ้นและแห้งในผู้ควบคุมสภาพแวดล้อมตามกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิกลางคืน/กลางวัน $10/25^{\circ}\text{C}$ (ก) และ $15/25^{\circ}\text{C}$ (ข)

(ก) ในช่วงให้กรรมวิธี

| กลางคืน (อุณหภูมิอากาศ 10°C หรือ 15°C) | | | | | | กลางวัน (อุณหภูมิอากาศ 25°C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Td1 | Td2 | Td3 | Td4 | Td5 | Td6 | Tn | Tn | Tn | Tn | Tn | Tn | Te1 | Te2 | Te3 | Te4 | Te5 | Te6 | Tday | Tday | Tday | Tday | Tday | Tday |
| 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 6hr | | | | | | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 1hr | 6hr | | | | | |

(ข) ในช่วงบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต

| กลางคืน (อุณหภูมิอากาศ 30°C) | | กลางวัน (อุณหภูมิอากาศ 35°C) | |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| 29.8°C | 6hr | 27.2°C | 6hr |
| 6hr | | 29.8°C | 6hr |
| 6hr | | 32.4°C | 6hr |

ภาพที่ 20 แผนผังแสดงอุณหภูมิของวัสดุปลูก ใน 1 วัน ที่ห้วงานสูงนางได้รับในช่วงให้กรรมวิธีทดลอง (ก) และในช่วงบ่มกระตุ่นการเจริญเติบโต (ข)

Td (decreasing temperature) คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิของวัสดุปลูกที่ลดลง ชั่วโมงที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ

Tn คือ ค่าอุณหภูมิของวัสดุปลูกที่เข้าสู่ช่วงคงที่ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ในเวลากลางคืน

Te (elevating temperature) คือ ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของวัสดุปลูก ในช่วงที่เพิ่มขึ้น ชั่วโมงที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ

Tday คือ ค่าอุณหภูมิของวัสดุปลูกที่เข้าสู่ช่วงคงที่ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ในเวลากลางวัน

การกำหนด Unit ของแต่ละอุณหภูมิวัสดุปลูก ทำโดยกำหนดช่วงอุณหภูมิ แต่มีความสัมพันธ์แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเช่นเดียวกับการกำหนด HU กรณีแรก ดังนี้

| | | |
|--|---------|-------------|
| U เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับ 8 °C | = - 0.5 | หน่วยต่อวัน |
| U เมื่ออุณหภูมิตั้งอยู่ในช่วง 8.1-10 °C | = 0 | หน่วยต่อวัน |
| U เมื่ออุณหภูมิตั้งอยู่ในช่วง 10.1-15 °C | = 1 | หน่วยต่อวัน |
| U เมื่ออุณหภูมิตั้งอยู่ในช่วง 15.1-20 °C | = 2 | หน่วยต่อวัน |
| U เมื่ออุณหภูมิตั้งอยู่ในช่วง 20.1-25 °C | = 4 | หน่วยต่อวัน |
| U เมื่ออุณหภูมิตั้งอยู่ในช่วง 25.1-30 °C | = 8 | หน่วยต่อวัน |
| U เมื่ออุณหภูมิตั้งอยู่ในช่วง 30.1-35 °C | = 16 | หน่วยต่อวัน |

สมการ HU เมื่อคำนวณจากอุณหภูมิของวัสดุปลูก แสดงในสมการที่ 5 ดังนี้

$$\begin{aligned}
 HU = & (U_{T_n} \times (6/24) \times X) + (U_{T_{day}} \times (6/24) \times X) + [(U_{T_{d1}} + U_{T_{d2}} + U_{T_{d3}} + U_{T_{d4}} + U_{T_{d5}} + U_{T_{d6}}) \\
 & \times (1/24) \times X] + [(U_{T_{e1}} + U_{T_{e2}} + U_{T_{e3}} + U_{T_{e4}} + U_{T_{e5}} + U_{T_{e6}}) \times (1/24) \times X] + (U_{27.2^{\circ}C} \times \\
 & (6/24) \times D_E) + (U_{32.4^{\circ}C} \times (6/24) \times D_E) + (U_{29.8^{\circ}C} \times 0.5 \times D_E) \dots \dots \dots (\text{สมการที่ 5})
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างการคำนวณ HU ในกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิมากลางคืน 10 องศาเซลเซียส และงค่น้ำ

แทนค่าในสมการที่ 5

$$\begin{aligned}
 HU = & (0 \times 0.25 \times 94) + (4 \times 0.25 \times 94) + [(4+2+1+1+1+0) \times (1/24) \times 94] + [(0+1+2+4+4+4) \\
 & \times (1/24) \times 94] + (8 \times 0.25 \times 27) + (16 \times 0.25 \times 27) + (8 \times 0.5 \times 27) \\
 = & 458 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

จากผลการคำนวณ พบว่าอุณหภูมิตะสมที่ทำให้ว่านงูนางพันระยะพักตัวพร้อมกับทางหน่อพันวัสดุปลูกของกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิมากลางคืน/กลางวัน 10/25 องศาเซลเซียสทั้งค่น้ำและให้น้ำ มีค่าเฉลี่ย คือ 494 และ 506 Unit ตามลำดับ ส่วนอุณหภูมิตะสมของกรรมวิธีที่ได้รับอุณหภูมิมากลางคืน/กลางวัน 15/25 องศาเซลเซียสทั้งค่น้ำหรือให้น้ำมีค่าเฉลี่ย Heat Unit 512 และ 473 Unit ตามลำดับ (ตารางที่ 14)

ตารางที่ 14 ค่าความร้อนสะสมที่วุ้นนางสะสมตั้งแต่เริ่มพักตัวจนถึงพ้นระยะพักตัวพร้อมกับ
แทงหน่อพื้นวัสดุปลูกตามวิธีคำนวณจากอุณหภูมิอากาศ และวิธีคำนวณจากอุณหภูมิ
วัสดุปลูก (n = 5)

| กรรมวิธี | ความร้อนสะสม | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | กรณีที่ใช้อุณหภูมิอากาศ | กรณีที่ใช้อุณหภูมิวัสดุปลูก |
| อุณหภูมิกลางคืน 10°C งดน้ำ | 278 | 494 |
| อุณหภูมิกลางคืน 10°C ให้น้ำ | 296 | 506 |
| อุณหภูมิกลางคืน 15°C งดน้ำ | 277 | 512 |
| อุณหภูมิกลางคืน 15°C ให้น้ำ | 279 | 473 |
| % CV | 3.19 % | 3.47 % |

4.2 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดต่อการพ้นระยะพักตัวของวุ้นนาง

4.2.1 จำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อ

การให้สารควบคุมการเจริญเติบโตแก่หัววุ้นนางที่มีอายุของหัวที่แตกต่างกันในระยะพักตัวแล้วบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตในถาดแกลบซึ่งที่อุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน 35/30°C พบว่าวุ้นนางพ้นระยะพักตัวและแทงหน่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 (17 วัน หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) จนถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 (27 วัน หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต) ในขณะที่กรรมวิธีที่คู้หัวเก่าแช่ด้วยน้ำไม่แทงหน่อพื้นวัสดุปลูก ณ วันสุดท้ายของการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

เมื่อพิจารณาผลของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตและปัจจัยอายุของหัวต่อจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ พบว่าปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตไม่มีผลต่อจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ แต่ปัจจัยอายุของหัวมีผลต่อจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อ โดยคู้หัวใหม่แทงหน่อเร็วกว่าคู้หัวเก่าเป็นเวลา 7 วัน และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสองปัจจัยต่อจำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวพันธุ์ (ภาคผนวกที่ 8) หัววุ้นนางคู้ใหม่ที่ผ่านการแช่ด้วย GA₃ ความเข้มข้น 50 ส่วนต่อล้านแทงหน่อก่อนหัวคู้เก่าที่ผ่านการแช่ด้วย BA ความเข้มข้น 100

ส่วนต่อล้น และ GA₃ ความเข้มข้น 50 ส่วนต่อล้น เป็นเวลา 10 วัน และแทงหน่อก่อนหว่านหัวใหม่ที่ผ่านการแช่ด้วยน้ำเป็นเวลา 6 วัน

ตารางที่ 15 จำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อของหัวว่านงูนางงาที่เคยได้รับสารควบคุมการเจริญเติบโตและมีอายุหัวต่างกัน หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 (n = 5)

| สารควบคุมการเจริญเติบโต | จำนวนวันที่ใช้ในการแทงหน่อ | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------|---|
| | อายุหัว | | เฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต ^{ns/} |
| | หัวใหม่ | หัวเก่า | |
| น้ำ | 23 | - | - |
| BA 100 ส่วนต่อล้น | 21 | 27 | 24 |
| GA ₃ 50 ส่วนต่อล้น | 17 | 27 | 22 |
| เฉลี่ยปัจจัยอายุของหัว ^{1/} | 20 A | 27 B | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอายุของหัวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

^{ns/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

- ไม่มีข้อมูล เนื่องจากหัวเก่าไม่แทงหน่อพันธุ์ศุภปลุก

4.2.2 จำนวนตาที่แตกทั้งหมด เมื่อ 4 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต

หัวว่านงูนางงาที่ได้รับสารควบคุมการเจริญเติบโตตามกรรมวิธีทดลองต่างๆ แล้วบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์มีการแตกตาทุกหัว โดยพบว่าหัวเริ่มแตกตาเมื่อ 7 วัน หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต

ปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตที่หัวว่านงูนางงาเคยได้รับมีผลต่อจำนวนตาที่แตกทั้งหมด (ภาคผนวกที่ 9) โดยหัวที่เคยได้รับ BA 100 ส่วนต่อล้น มีจำนวนตาที่แตกมากกว่าหัวในกรรมวิธีควบคุมที่ได้รับเฉพาะน้ำและหัวที่เคยได้รับ GA₃ 50 ส่วนต่อล้น ประมาณ 2 เท่าตัว (ตารางที่ 16) ปัจจัยอายุของหัวมีผลต่อจำนวนตาที่แตกทั้งหมดเช่นกัน (ภาคผนวกที่ 9) โดยหัวใหม่มีจำนวนตาที่แตกทั้งหมดมากกว่าหัวเก่าเกือบ 2 เท่า (2.6 และ 1.4 ตา ตามลำดับ) (ตารางที่ 16)

ทั้งนี้ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัยต่อจำนวนตาที่แตกทั้งหมด (ภาคผนวกที่ 9) ดังนั้นคู่หัวใหม่ที่แช่ด้วย BA 100 ส่วนต่อล้าน จึงมีจำนวนตาที่แตกทั้งหมดมากที่สุด คือ 3.8 ตา (ตารางที่ 16)

ตารางที่ 16 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและอายุของหัวพันธุ์ว่านงูนางต่อจำนวนตาที่แตกทั้งหมดเมื่อ 4 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต ($n = 5$)

| สารควบคุมการเจริญเติบโต | จำนวนตาที่แตกทั้งหมด | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------|--|
| | อายุหัว | | เฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต ^{1/} |
| | คู่หัวใหม่ | คู่หัวเก่า | |
| น้ำ | 2.2 | 1.0 | 1.6 B |
| BA 100 ส่วนต่อล้าน | 3.8 | 2.0 | 3.0 A |
| GA ₃ 50 ส่วนต่อล้าน | 1.8 | 1.3 | 1.6 B |
| เฉลี่ยปัจจัยอายุของหัว ^{2/} | 2.6 A | 1.4 B | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

^{2/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอายุของหัวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

4.2.3 จำนวนหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูก เมื่อ 4 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต

แม้หัวว่านงูนางจะมีการแตกตาจำนวนมาก แต่ทุกตาที่แตกไม่ได้เจริญต่อจนพันธุ์วัสดุปลูก ปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตที่หัวว่านงูนางเคยได้รับมีผลต่อจำนวนหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูก (ภาคผนวกที่ 10) โดยคู่หัวที่เคยได้รับ BA 100 ส่วนต่อล้าน มีจำนวนต้นที่แทงพันธุ์วัสดุปลูกมากกว่าคู่หัวในกรรมวิธีควบคุม และคู่หัวที่เคยได้รับ GA₃ 50 ส่วนต่อล้าน ประมาณ 2 ถึง 4 เท้าตัว (ตารางที่ 17) ปัจจัยอายุของหัวมีผลต่อจำนวนหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูกเช่นกัน (ภาคผนวกที่ 10) โดยคู่หัวใหม่มีจำนวนหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูกมากกว่าคู่หัวเก่าเกือบ 2 เท้า (1.5 และ 0.7 หน่อตามลำดับ) (ตารางที่ 17) ทั้งนี้ไม่มีอิทธิพลร่วมของสองปัจจัยต่อจำนวนหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูก (ภาคผนวกที่ 10) หัวว่านงูนางคู่ใหม่ที่เคยได้รับ BA 100 ส่วนต่อล้าน มีจำนวนหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูกมากที่สุด คือ 2.4 หน่อ ซึ่งสูงกว่าจำนวนหน่อในกรรมวิธีอื่นๆ อย่างน้อย 2 เท้า (ตารางที่ 17)

ตารางที่ 17 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและอายุของหัวพันธุ์ว่านจูงนางต่อจำนวนหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูกเมื่อ 4 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (n = 5)

| สารควบคุมการเจริญเติบโต | จำนวนหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูก | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| | อายุหัว | | เฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต ^{1/} |
| | คู่หัวใหม่ | คู่หัวเก่า | |
| น้ำ | 1.0 | 0.0 | 0.5 B |
| BA 100 ส่วนต่อล้าน | 2.4 | 1.2 | 1.8 A |
| GA ₃ 50 ส่วนต่อล้าน | 1.0 | 1.0 | 1.0 B |
| เฉลี่ยปัจจัยอายุของหัว ^{2/} | 1.5 A | 0.7 B | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ตามด้วยอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

^{2/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอายุของหัวที่ตามด้วยอักษรต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

4.2.4 การเติบโตของหน่อ

ปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับไม่มีผลต่อความสูงของหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูก แต่ปัจจัยอายุของหัวมีผลต่อความสูงของหน่อ เมื่อสัปดาห์ที่ 2 หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (ภาคผนวกที่ 11) ทั้งนี้ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัยต่อความสูงของหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูก (ภาคผนวกที่ 11) เมื่อเริ่มการทดลองได้ 2 สัปดาห์ คู่หัวเก่ายังไม่แทงหน่อพันธุ์วัสดุปลูก ในขณะที่คู่หัวใหม่มีความสูงของหน่อ 3.87 เซนติเมตร (ตารางที่ 18) หน่อว่านจูงนางที่เจริญจากคู่หัวใหม่ที่เคยได้รับ GA₃ 50 ส่วนต่อล้าน มีความสูงของหน่อที่เจริญพันธุ์วัสดุปลูกมากที่สุด คือ 6.47 เซนติเมตร ในขณะที่คู่หัวใหม่ที่เคยได้รับ BA 100 ส่วนต่อล้าน มีความสูงเพียง 1.97 เซนติเมตร (ตารางที่ 18)

ปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตที่หัวว่านจูงนางเคยได้รับไม่มีผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของต้นว่านจูงนาง เมื่อ 2 สัปดาห์ หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (ภาคผนวกที่ 12) แต่ปัจจัยอายุของหัวมีผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของต้นว่านจูงนาง เมื่อ 2 สัปดาห์ หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต คู่หัวใหม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.36 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าคู่หัวเก่าที่เป็น 0 เซนติเมตร เพราะหน่อของคู่หัวเก่ายังไม่เจริญพันธุ์วัสดุปลูก (ตารางที่ 19) ทั้งนี้ไม่มีอิทธิพลร่วม

ระหว่างสองปัจจัยต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น (ภาคผนวกที่ 12) หน่อว่านงูนางที่เจริญจากคู่วัวใหม่ที่เคยได้รับ GA₃ คู่วัวใหม่ในกรรมวิธีควบคุมและคู่วัวใหม่ที่เคยได้รับ BA มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.47 0.33 และ 0.29 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 19)

เมื่อ 4 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต หัวว่านงูนางคู่เก่าแทงหน่อพื้นวัสดุปลูก ยกเว้นคู่วัวเก่าที่เคยได้รับน้ำ ทำให้เห็นความแตกต่างของความสูงของต้นที่เจริญจากคู่วัวที่เคยได้รับสารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกัน ปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต มีผลต่อความสูงของต้นที่เจริญพื้นวัสดุปลูก เช่นเดียวกับปัจจัยอายุหัว (ภาคผนวกที่ 13) โดยคู่วัวที่เคยได้รับ GA₃ 50 ส่วนต่อล้าน มีความสูงของต้นที่เจริญพื้นวัสดุปลูกมากกว่าคู่วัวในกรรมวิธีควบคุม และคู่วัวที่เคยได้รับ BA 100 ส่วนต่อล้าน ประมาณ 2 – 3 เท่าตัว (ตารางที่ 20) และคู่วัวใหม่มีความสูงของต้นที่เจริญพื้นวัสดุปลูก 6.60 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าคู่วัวเก่าที่มีความสูงของต้นที่เจริญพื้นวัสดุปลูกเพียง 0.36 เซนติเมตร (ตารางที่ 20) เนื่องจากมีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัยต่อความสูงของต้น (ภาคผนวกที่ 13) ดังนั้นต้นว่านงูนางที่เจริญจากคู่วัวใหม่ที่เคยได้รับ GA₃ จึงมีความสูงของต้นมากที่สุด คือ 11.15 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าความสูงของต้นในกรรมวิธีอื่นๆ อย่างชัดเจน (ตารางที่ 20)

เมื่อ 4 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต ปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตที่หัวว่านงูนางเคยได้รับ ไม่มีผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของว่านงูนาง (ภาคผนวกที่ 14) แต่ปัจจัยอายุของหัวมีผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างทั้งสองปัจจัยต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น (ภาคผนวกที่ 14) โดยพบว่าต้นว่านงูนางที่เจริญจากคู่วัวใหม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่กว่าคู่วัวเก่าคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.42 และ 0.07 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 21) ซึ่งคู่วัวใหม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นมากกว่าคู่วัวเก่าถึง 6 เท่า

ตารางที่ 18 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและอายุของหัวพันธุ์ว่านจูงนางต่อความสูงของหน่อ เมื่อ 2 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (n = 5)

| สารควบคุมการเจริญเติบโต | ความสูงของหน่อ (เซนติเมตร) ^{1/} | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---|
| | อายุหัว | | เฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต ^{ns/} |
| | คู่หัวใหม่ | คู่หัวเก่า | |
| น้ำ | 3.18 | 0.00 | 1.59 |
| BA 100 ส่วนต่อล้าน | 1.97 | 0.00 | 0.98 |
| GA ₃ 50 ส่วนต่อล้าน | 6.47 | 0.00 | 3.23 |
| เฉลี่ยปัจจัยอายุของหัว ^{2/} | 3.87 <i>A</i> | 0.00 <i>B</i> | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสมมติและแถวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

^{2/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอายุของหัวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

^{ns/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 19 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของต้นว่านจูงนาง เมื่อ 2 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (n = 5)

| สารควบคุมการเจริญเติบโต | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น (เซนติเมตร) ^{1/} | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|
| | อายุหัว | | เฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต ^{ns/} |
| | คู่หัวใหม่ | คู่หัวเก่า | |
| น้ำ | 0.33 | 0.00 | 0.16 |
| BA 100 ส่วนต่อล้าน | 0.29 | 0.00 | 0.14 |
| GA ₃ 50 ส่วนต่อล้าน | 0.47 | 0.00 | 0.23 |
| เฉลี่ยปัจจัยอายุของหัว ^{2/} | 0.36 <i>A</i> | 0.00 <i>B</i> | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสมมติและแถวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

^{2/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอายุของหัวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

^{ns/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%



ตารางที่ 20 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและอายุของหัวพันธุ์ว่านจูงนางต่อความสูงของหน่อ เมื่อ 4 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (n = 5)

| สารควบคุมการเจริญเติบโต | ความสูงของหน่อ (เซนติเมตร) ^{1/} | | |
|--------------------------------------|--|---------|--|
| | อายุหัว | | เฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต ^{2/} |
| | หัวใหม่ | หัวเก่า | |
| น้ำ | 5.99 b | 0.00 c | 2.99 B |
| BA 100 ส่วนต่อล้าน | 2.66 bc | 0.77 c | 1.71 B |
| GA ₃ 50 ส่วนต่อล้าน | 11.15 a | 0.32 c | 5.73 A |
| เฉลี่ยปัจจัยอายุของหัว ^{3/} | 6.60 A | 0.36 B | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์และแถวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

^{2/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโตของหัวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

^{3/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอายุของหัวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ตารางที่ 21 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของต้นว่านจูงนาง เมื่อ 4 สัปดาห์หลังบ่มกระตุ้นการเจริญเติบโต (n = 5)

| สารควบคุมการเจริญเติบโต | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น (เซนติเมตร) ^{1/} | | |
|--------------------------------------|---|---------|---|
| | อายุหัว | | เฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต ^{ns/} |
| | หัวใหม่ | หัวเก่า | |
| น้ำ | 0.34 | 0.00 | 0.17 |
| BA 100 ส่วนต่อล้าน | 0.50 | 0.15 | 0.33 |
| GA ₃ 50 ส่วนต่อล้าน | 0.41 | 0.05 | 0.23 |
| เฉลี่ยปัจจัยอายุของหัว ^{2/} | 0.42 A | 0.07 B | |

^{1/} ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์และแถวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference

^{2/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยอายุของหัวที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

^{ns/} ค่าเฉลี่ยของปัจจัยสารควบคุมการเจริญเติบโต ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %