

ปริยพันธ์ สละสวัสดิ์ : ความชุกของภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยนอก
โรคจิตเภทเรื้อรัง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

(PREVALENCE OF DEPRESSION RELATED FACTORS AMONG OUT-PATIENTS
CHRONIC SCHIZOPHRENIC OF SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงสร้อย วรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม) :

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา ทวิชาชาติ, หน้า ISBN : 974-17-4394-7

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทเรื้อรัง สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินอาการทางจิต (Brief Psychiatric Rating Scale)
แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม (Social Support Scale) แบบประเมินเหตุการณ์ความเครียด
ในชีวิต (Life Stress Events Scale) และแบบสอบถามประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตนเองของ Zung
(The Zung Self-Rating Depression Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
Chi-square test, t-test, One-way ANOVA, Pearson's product moment correlation coefficient
และการพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรังมีความชุกของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 36.0 อายุ
และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $P < .05$
และ $.001$ ตามลำดับ เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ $P < .05$ การสนับสนุนทางสังคมน้อย อายุน้อย และมีอาการข้างเคียงของยา
รักษาโรคจิต เป็นปัจจัยที่สามารถทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $P < .001$,
.05, .05 ตามลำดับ

The purpose of this cross-sectional descriptive study was to examine the
prevalence of depression and associated factors of 150 Chronic ambulatory Schizophrenic
patients of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. The interview was used for demographic
data, Brief Psychiatric Rating Scale, Social Support Rating Scale, Life Stress Event Scale
while self reported questionnaires was used for The Zung Self-Rating Depression Scale.
The SPSS for Windows was used for descriptive and inferential Statistical analysis. Descriptive
statistics were presented as percentage, mean, standard deviation, while Inferential Statistics
were done for Chi-square test, t-test, One-way ANOVA, Pearson's product moment correlation
coefficient. Stepwise multiple regression analysis was performed to determine for significant
predictive factors.

The result of this study was found that prevalence of depression was 36%.
Age and social support were negatively correlated to depression ($p < .05$ and $p < .001$ respectively).
On the other hands, life stress events was positively correlated to depression ($p < .05$).
In conclusion, lack of social support, young age and extrapyramidal side effects are significantly
factors in prediction of depression for these studied sample.