

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ความสูงของลำต้น (เซนติเมตร), น้ำหนักลำต้นสด และน้ำหนักลำต้นแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน	15
2	น้ำหนักใบสด และน้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อต้น), พื้นที่ใบ (ตารางเซนติเมตร) และปริมาณคลอโรฟิลล์ภายในใบ (SPAD unit) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน	17
3	น้ำหนักดอกสด และน้ำหนักดอกแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน	19
4	น้ำหนักฝักสด และน้ำหนักฝักแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน	21
5	น้ำหนักรากสด และน้ำหนักรากแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน	22
6	น้ำหนักแห้งรวม และผลผลิตน้ำหนักแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน	24
7	Total Lactone และปริมาณ Andrographolide (เปอร์เซ็นต์) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน	25

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
8	ความสูงของลำต้น (เซนติเมตร), น้ำหนักลำต้นสด และน้ำหนักลำต้นแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการพรางแสงที่แตกต่างกัน	28
9	น้ำหนักใบสด และน้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อต้น), พื้นที่ใบ (ตารางเซนติเมตร) และปริมาณคลอโรฟิลล์ภายในใบ (SPAD unit) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการพรางแสงที่แตกต่างกัน	30
10	น้ำหนักดอกสด และน้ำหนักดอกแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการพรางแสงที่แตกต่างกัน	33
11	น้ำหนักฝักสด และน้ำหนักฝักแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการพรางแสงที่แตกต่างกัน	34
12	น้ำหนักรากสด และน้ำหนักรากแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการพรางแสงที่แตกต่างกัน	36
13	น้ำหนักแห้งรวม และผลผลิตน้ำหนักแห้ง (กรัมต่อต้น) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการพรางแสงที่แตกต่างกัน	38
14	Total Lactone และปริมาณ Andrographolide (เปอร์เซ็นต์) ที่อายุ 120 วันหลังปลูก ของฟ้าทะลายโจรจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, พันธุ์ปราจีนบุรี, พันธุ์ราชบุรี และพันธุ์พิจิตร 4-4 เมื่อได้รับการพรางแสงที่แตกต่างกัน	39

