

224446

ศึกษาการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพจากแหล่งต่าง ๆ คือ จากมูลสัตว์ มูลค่างคว นมสด พืช โบกาจิ และดินระเบิด นำมาใช้แทนสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์จาก Stock A วางแผนการทดลอง คือ 1. ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพแต่ละชนิดเปรียบเทียบกับการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ 2. ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพหลายชนิดเปรียบเทียบกับการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ 3. ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพร่วมกับสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ เปรียบเทียบกับการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์เพียงอย่างเดียว ผลจากการทดลองพบว่าการใช้น้ำสกัดชีวภาพจากสารอินทรีย์แต่ละชนิดไม่สามารถเพิ่มผลผลิต และการเจริญเติบโตที่ดีเทียบกับการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ได้ แต่การผสมน้ำสกัดชีวภาพหลายชนิดเข้าด้วยกันมีแนวโน้มว่าสามารถเพิ่มผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชได้ และการศึกษาการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีเห็นผลชัดเจนเมื่อใช้น้ำสกัดชีวภาพร่วมกับสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์จาก Stock A ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำสกัดชีวภาพจากนมสด พืช โบกาจิ และมูลค่างคว นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้น้ำสกัดชีวภาพทำให้ Total N ที่สะสมในต้นพืชมีค่าต่ำ รวมทั้งต้นทุนค่าปุ๋ยจากการใช้น้ำสกัดชีวภาพต่ำกว่าการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์

224446

The aim of research was to compare the growth of vegetable in a nutrient film technique (NFT) hydroponics system using either organic solution or a conventional inorganic fertilizer solution. The experiment was conducted at Soilles culture division , Department of plant science, Faculty of agricultural technology, Rajamangala university of technology during October 2008 to September 2009. This study consisted of 3 experiments. The first experiment was to compare conventional solution in stock A with each bioextracts (manure, drop of bat, milk,vegetable, bokashi and soil bomb). The second experiment was to compare conventional solution with the mix of bioextracts by method of emission trial and the third experiment was to compare a full volume of conventional solution in stock A with the mixture of conventional solution in stock A and each bioextracts in the ratio 1:1 (V/V). The results were as follows : The first and second experiments showed that the conventional vegetable grew at significantly higher rate than the organic ones but the third experiment showed that conventional solution and the mixtures of conventional and bioextract solution gave insignificantly difference in growth and yield of vegetable. Moreover the treatment of the nutrient solution mixed with conventional solution and bioextract had a trend to give the highest fresh weight of vegetables and resulted in decreasing total N and the production cost. In conclusion, it is evident that organics hydroponic production is possible.