

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมต่อต้านสังคม และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมุกดา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี ผู้วิจัยนำเสนอตามลำดับหัวข้อ ต่อไปนี้

1. ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความสะดวกในการสื่อความหมาย ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

e	แทน	ความถี่คาดหวัง
χ^2	แทน	ค่าไคสแควร์
p	แทน	ความน่าจะเป็น
\bar{X}	แทน	ค่าเฉลี่ย
SD	แทน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n	แทน	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
df	แทน	ค่าของชั้นแห่งความเป็นอิสระ

ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามตัวแปรที่ศึกษา

ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะส่วนบุคคล และการเสพยาบ้าของวัยรุ่นวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมุกดา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายพฤติกรรมต่อต้านสังคม รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นในศูนย์ฝึก-
และอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นในศูนย์ฝึก-
และอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

ตาราง 2

ลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา
บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี (n = 263)

ลักษณะส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	240	91.3
หญิง	23	8.7
อายุ		
16-17 ปี	115	43.7
18-25 ปี	148	56.3
การศึกษาสูงสุด		
ไม่ได้เรียน	13	4.9
ประถมศึกษา	92	35.0
มัธยมศึกษาตอนต้น	122	46.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	36	13.7
อาชีพ		
รับจ้างทั่วไป	83	31.6
ค้าขาย	22	8.4
นักเรียน/นักศึกษา	63	24.0
ว่างงาน	95	36.1

ตาราง 2 (ต่อ)

ลักษณะส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สถานภาพสมรส		
โสด	206	78.3
สมรส	57	21.7
รายได้ครอบครัว		
0-5,000 บาท	99	37.6
5,001-10,000 บาท	83	31.6
10,001-15,000 บาท	45	17.1
15,001 บาทขึ้นไป	36	13.7

จากตาราง 2 พบว่า วัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี เป็นเพศชายจำนวน 240 คน เพศหญิง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3 และ 8.7 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-25 ปี จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 และอายุ 16-17 ปี จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมา คือ อยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 อาชีพส่วนใหญ่ว่างงาน จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็น โสด จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาเป็นสมรส จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และมีรายได้ครอบครัว 0-5,000 บาทมากที่สุด จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมา คือ 5,001-10,000 บาท จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6

ผลการวิเคราะห์จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพฤติกรรม
ต่อต้านสังคมของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา
บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

ตาราง 3

จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพฤติกรรมต่อต้านสังคม
ของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และ
บ้านปราณี (n = 263)

พฤติกรรมต่อต้านสังคม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในระดับสูง	40	15.2
มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในระดับปานกลาง	173	65.8
มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในระดับต่ำ	50	9.0
$\bar{X} = 2.64$ $SD = .59$		

จากตาราง 3 พบว่า วัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา
บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีส่วนใหญ่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในระดับปานกลาง จำนวน
173 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในระดับต่ำ จำนวน
50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา
บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีทั้งหมดมีคะแนนพฤติกรรมต่อต้านสังคมเฉลี่ย
เท่ากับ 2.64 แสดงว่ามีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในระดับปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

ตาราง 4

จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี (n = 263)

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสันทันสนุน		
ต่ำ	18	6.8
สูง	245	93.2
$\bar{X} = 3.78 \quad SD = .55$		
การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์		
ต่ำ	38	14.5
สูง	225	85.5
$\bar{X} = 3.55 \quad SD = .47$		
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม		
ต่ำ	188	71.5
สูง	75	28.5
$\bar{X} = 2.81 \quad SD = .41$		
การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกาย		
ต่ำ	67	25.5
สูง	196	74.5
$\bar{X} = 3.33 \quad SD = .47$		

ตาราง 4 (ต่อ)

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งพาตนเอง		
ต่ำ	209	79.5
สูง	54	20.5
$\bar{X} = 3.53$ $SD = 1.65$		

จากตาราง 4 พบว่า วัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานีส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนในระดับสูง จำนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในระดับสูง จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมในระดับต่ำ จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกายในระดับสูง จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งพาตนเองในระดับต่ำ จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 และวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานีทั้งหมด มีคะแนนการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกาย และการอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งพาตนเอง เท่ากับ 3.78, 3.55, 2.81, 3.33 และ 3.53 ตามลำดับ แสดงว่า วัยรุ่นในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนในระดับสูง การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในระดับสูง การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมในระดับต่ำ การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกายในระดับสูง และการอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งพาตนเองในระดับต่ำ

ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของข้อมูลการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรม-
เด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

ตาราง 5

จำนวนและร้อยละของข้อมูลการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านกรูณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี (n = 263)

การเสพยาบ้า	จำนวน (คน)	ร้อยละ
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า		
กิน/ฉีดเข้าเส้น	39	14.8
สูบ/สูดควันระเหย	224	85.2
ปริมาณที่เสพ		
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เม็ดต่อวัน	92	35.0
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	171	65.0
ความถี่ในการเสพ		
ทุกวัน	144	54.8
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	70	26.6
แล้วแต่โอกาส	49	18.6
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ		
เพื่อน/คนรักชวน	84	31.9
อยากลอง	179	68.1

จากตาราง 5 พบว่า วัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมุกิตา
บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีส่วนใหญ่เสพยาบ้าโดยใช้วิธีการสูบ/สูดควันระเหย จำนวน
224 คน คิดเป็นร้อยละ 85.2 รองลงมาเป็นวิธีกิน/ฉีดเข้าเส้น จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
14.8 ปริมาณที่เสพส่วนใหญ่เสพมากกว่า 1 เม็ดต่อวัน จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0
รองลงมาเป็นเสพน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เม็ดต่อวัน จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0
ความถี่ในการเสพ ส่วนใหญ่เสพทุกวัน จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาเป็น

2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ ส่วนใหญ่ เป็นเพราะอยากลอง จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 รองลงมา คือ เพื่อน/คนรักชวน จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมต่อต้านสังคม และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี โดยคำนวณ Chi-square ค้างข้อมูลที่ปรากฏ (ดูตาราง 6-17)

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี

ตาราง 6

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับเพศของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี (n = 263)

การเสพยาบ้า	เพศ				χ^2	df	p
	เพศชาย		เพศหญิง				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
วิธีที่ใช้เสพ							
กิน/ฉีดเข้าเส้น	34	35.6	5	3.4	.953	1	.33
สูบ/สูดควันระเหย	206	204.4	18	19.6			
ปริมาณที่เสพ							
น้อยกว่าหรือเท่ากับ							
1 เม็ดต่อวัน	85	84.0	7	8.0	.229	1	.63
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	155	156.0	16	15.0			

ตาราง 6 (ต่อ)

การเสพยาบ้า	เพศ				χ^2	df	p
	เพศชาย		เพศหญิง				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
ความถี่ในการเสพ							
ทุกวัน	132	131.4	12	12.6	1.008	2	.60
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	65	63.9	5	6.1			
แล้วแต่โอกาส	43	44.7	6	4.3			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ							
เพื่อน/คนรักชวน	70	76.7	14	7.3	9.704	1	.00*
อยากลอง	170	163.3	9	15.7			

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 6 พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับเหตุสำคัญที่ทำให้เสพอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ และความถี่ในการเสพกับเพศของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 7

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับอายุของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี (n = 263)

การเสพยาบ้า	อายุ				χ^2	df	p
	16-17 ปี		18-25 ปี				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า							
กิน/ฉีดเข้าเส้น	17	17.1	22	21.9	.000	1	.99
สูบ/สูดควันระเหย	98	97.9	126	126.1			
ปริมาณที่เสพ							
น้อยกว่าหรือเท่ากับ							
1 เม็ดต่อวัน	52	40.2	40	51.8	9.415	1	.07
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	63	74.8	108	96.2			
ความถี่ในการเสพ							
ทุกวัน	49	63.0	95	81.0	14.625	2	.10
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	43	30.6	27	39.4			
แล้วแต่โอกาส	23	21.4	26	27.6			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ							
เพื่อน/คนรักชวน	37	36.7	78	78.3	.005	1	.52
อยากลอง	47	47.3	101	100.7			

จากตาราง 7 พบว่า วิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ ความถี่ในการเสพ และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับอายุของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 8

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับการศึกษาสูงสุดของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี (n = 263)

การเสพยาบ้า	การศึกษาสูงสุด						χ^2	df	p		
	ไม่ได้เรียน		ประถมศึกษา		มัธยมศึกษาตอนต้น						
	ความถี่	e	ความถี่	e	ความถี่	e					
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า											
กิน/ฉีดเข้าเส้น	1	1.9	12	11.1	20	18.1	6	5.3	1.089	3	.78
สูบ/สูดควันระเหย	12	11.1	80	78.4	102	103.9	30	30.7			
ปริมาณที่เสพยา											
น้อยกว่าหรือเท่ากับ											
1 เม็ดต่อวัน	8	4.5	36	32.2	36	42.7	12	12.6	6.377	3	.10
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	5	8.5	56	59.8	86	79.3	24	23.4			



ตาราง 8 (ต่อ)

การศัลยาศาสตร์	การศัลยาศาสตร์						χ^2	df	p		
	ไม่ได้เรียน	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.							
	ความถี่ e	ความถี่ e	ความถี่ e	ความถี่ e	ความถี่ e	ความถี่ e					
ความถี่ในการศัลย											
ทุกวัน	8	7.1	43	50.4	71	66.8	22	19.7	11.624	6	.70
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	2	3.5	34	24.5	30	32.5	4	9.6			
แล้วแต่โอกาส	3	2.4	15	17.1	21	22.7	10	6.7			
เหตุสำคัญที่ทำให้ศัลย											
เพื่อน/คนรักชวน	5	4.2	26	29.4	38	39.0	15	11.5	2.429	3	.49
อยากลอง	8	8.8	66	62.6	84	83.0	21	24.5			

จากตาราง 8 พบว่า วิธีที่ใช้ศัลย ปริมาณที่ศัลย ความถี่ในการศัลย และเหตุสำคัญที่ทำให้ศัลยกับการศัลยสูงสุดของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 9

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับอาชีพของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

(n = 263)

การเสพยาบ้า	อาชีพ						χ^2	df	p		
	รับจ้างทั่วไป		ค้าขาย		นักเรียน/นักศึกษา					ว่างงาน	
	ความถี่ e	ความถี่ e	ความถี่ e	ความถี่ e	ความถี่ e	ความถี่ e					
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า											
กิน/ฉีดเข้าเส้น	10	12.3	1	3.3	13	9.3	15	14.1	4.101	3	.25
สูบ/สูดควันระเหย	73	70.7	21	18.7	50	53.7	80	80.9			
ปริมาณที่เสพ											
น้อยกว่าหรือเท่ากับ											
1 เม็ดต่อวัน	36	29.0	6	7.7	21	22.0	29	33.2	4.049	3	.26
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	47	54.0	16	14.3	42	41.0	66	61.8			

ตาราง 9 (ต่อ)

การเสพยาบ้า	อาชีพ						χ^2	df	p		
	รับจ้างทั่วไป		ค้าขาย		นักเรียน/นักศึกษา					ว่างงาน	
	ความถี่	e	ความถี่	e	ความถี่	e				ความถี่	e
ความถี่ในการเสพ											
ทุกวัน	38	45.4	15	12.0	37	34.5	54	52.0	10.275	6	.01*
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	23	22.1	3	5.9	14	16.8	30	25.3			
แล้วแต่โอกาส	22	15.5	4	4.1	12	11.7	11	11.7			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ											
เพื่อน/คนรักชวน	20	26.5	6	7.0	26	20.1	32	30.3	5.225	3	.16
อยากลอง	63	56.5	16	15.0	37	42.9	63	64.7			

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 9 พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับอาชีพวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 10

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับสถานภาพสมรสของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี (n = 263)

การเสพยาบ้า	สถานภาพสมรส				χ^2	df	p
	โสด		สมรส				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า							
กิน/ฉีดเข้าเส้น	28	30.5	11	8.5	1.151	1	.28
สูบ/สูดควันระเหย	178	175.5	46	48.5			
ปริมาณที่เสพ							
น้อยกว่าหรือเท่ากับ							
1 เม็ดต่อวัน	71	72.1	21	19.9	.111	1	.74
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	135	133.9	36	37.1			
ความถี่ในการเสพ							
ทุกวัน	119	112.8	25	31.2	3.624	2	.16
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	52	54.8	18	15.2			
แล้วแต่โอกาส	35	38.4	14	10.6			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ							
เพื่อน/คนรักชวน	69	65.8	15	18.2	1.059	1	.30
อยากลอง	137	140.2	42	38.8			

จากตาราง 10 พบว่า วิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ ความถี่ในการเสพ และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับสถานภาพสมรสของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 11

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับรายได้ครอบครัวของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมูทิตา บ้านอุเบกษา และบ้านปรานี (n = 263)

	รายได้ครอบครัว						χ^2	df	p
	0-5,000 บาท	5,001-10,000 บาท	10,001-15,000 บาท	15,001 บาทขึ้นไป	e	e			
การเสพยาบ้า	ความถี่	e	ความถี่	e	ความถี่	e			
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า									
กิน/ฉีดเข้าเส้น	16	14.7	13	12.3	5	6.7	5	5.3	.87
สูบ/สูดควันระเหย	83	84.3	70	70.7	40	38.3	31	30.7	
ปริมาณที่เสพ									
น้อยกว่าหรือเท่ากับ									
1 เม็ดต่อวัน	41	34.6	23	29.0	15	15.7	13	12.6	.28
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	58	64.4	60	54.0	30	29.3	23	23.4	

ตาราง 11 (ต่อ)

การเสียหาย	รายได้ครอบครัว						χ^2	df	p		
	0-5,000 บาท		5,001-10,000 บาท		10,001-15,000 บาท					15,001 บาทขึ้นไป	
	ความถี่	e	ความถี่	e	ความถี่	e				ความถี่	e
ความถี่ในการเสพ											
ทุกวัน	49	54.2	48	45.4	25	24.6	22	19.7	3.049	6	.80
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	32	26.3	19	22.1	11	12.0	8	9.6			
แฉ้วแต่โอกาส	18	18.4	16	15.5	9	8.4	6	6.7			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ											
เพื่อน/คนรักชวณ	27	31.6	31	26.5	15	14.4	11	11.5	2.181	3	.54
อยากลอง	72	67.4	52	56.5	30	30.6	25	24.5			

จากตาราง 11 พบว่า วิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ ความถี่ในการเสพ และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับรายได้ครอบครัวของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีไม่มีความสัมพันธ์กัน

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

ตาราง 12

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับพฤติกรรมต่อต้านสังคมของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี (n = 263)

การเสพยาบ้า	พฤติกรรมต่อต้านสังคม						χ^2	df	p
	ต่ำ		ปานกลาง		สูง				
	ความถี่	e	ความถี่	e	ความถี่	e			
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า									
กิน/ฉีดเข้าเส้น	6	7.4	22	25.7	11	5.9	6.013	2	.05*
สูบ/สูดควันระเหย	44	42.6	151	147.3	29	34.1			
ปริมาณที่เสพ									
น้อยกว่าหรือเท่ากับ									
1 เม็ดต่อวัน	28	17.5	55	60.5	9	14.0	13.225	2	.00*
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	22	32.5	118	112.5	31	26.0			
ความถี่ในการเสพ									
ทุกวัน	15	27.4	100	94.7	29	21.9	22.294	4	.00*
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	17	13.3	48	46.1	5	10.6			
แล้วแต่โอกาส	18	9.3	25	32.2	6	7.5			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ									
เพื่อน/คนรักชวน	15	16.0	58	55.3	11	12.8	.650	2	.72
อยากลอง	35	34.0	115	117.7	29	27.2			

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 12 พบว่า วิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ และความถี่ในการเสพ กับพฤติกรรมต่อต้านสังคมของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับพฤติกรรมต่อต้านสังคมไม่มีความสัมพันธ์กัน

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

ตาราง 13

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

(n = 263)

การเสพยาบ้า	การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน				χ^2	df	p
	ต่ำ		สูง				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า							
กิน/ลิดเข้าเส้น	2	2.7	37	36.3	.211	1	.65
สูบ/สูดควันระเหย	16	15.3	208	208.7			
ปริมาณที่เสพ							
น้อยกว่าหรือเท่ากับ							
1 เม็ดต่อวัน	5	6.3	87	85.7	.441	1	.51
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	13	11.7	158	159.3			
ความถี่ในการเสพ							
ทุกวัน	13	9.9	131	134.1	2.382	2	.30
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	3	4.8	67	65.2			
แล้วแต่โอกาส	2	3.4	47	45.6			

ตาราง 13 (ต่อ)

การเสพยาบ้า	การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน				χ^2	df	p
	ต่ำ		สูง				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ							
เพื่อน/คนรักชวน	7	5.7	77	78.3	.429	1	.51
อยากลอง	11	12.3	168	166.7			

จากตาราง 13 พบว่า วิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ ความถี่ในการเสพ และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกดา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 14

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกดา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี (n = 263)

การเสพยาบ้า	การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล				χ^2	df	p
	มากกว่าอารมณ์						
	ต่ำ	สูง	ความถี่	e			
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า							
กิน/ฉีดเข้าเส้น	8	5.6	31	33.4	1.362	1	.24
สูบ/สูดควันระเหย	30	32.4	194	191.6			
ปริมาณที่เสพ							
น้อยกว่าหรือเท่ากับ							
1 เม็ดต่อวัน	9	13.3	83	78.7	2.492	1	.11
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	29	24.7	142	146.3			

ตาราง 14 (ต่อ)

การเสพยาบ้า	การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล				χ^2	df	p
	มากกว่าอารมณ์						
	ต่ำ		สูง				
ความถี่	e	ความถี่	e				
ความถี่ในการเสพ							
ทุกวัน	22	20.8	122	123.2	.736	2	.69
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	8	10.1	62	59.9			
แล้วแต่โอกาส	8	7.1	41	41.9			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ							
เพื่อน/คนรักชวน	12	12.1	72	71.9	.003	1	.96
อยากลอง	26	25.9	153	153.1			

จากตาราง 14 พบว่า วิธีที่ไ้เสพ ปริมาณที่เสพ ความถี่ในการเสพ และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 15

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี (n = 263)

การเสพยาบ้า	การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม				χ^2	df	p
	ต่ำ		สูง				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
วิธีที่ไ้เสพยาบ้า							
กิน/ฉีดเข้าเส้น	24	27.9	15	11.1	2.221	1	.14
สูบ/สูดควันระเหย	164	160.1	60	63.9			

ตาราง 15 (ต่อ)

การเสพยาบ้า	การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม				χ^2	df	p
	ต่ำ		สูง				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
ปริมาณที่เสพ							
น้อยกว่าหรือเท่ากับ							
1 เม็ดต่อวัน	58	65.8	34	26.2	4.944	1	.03*
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	130	122.2	41	48.8			
ความถี่ในการเสพ							
ทุกวัน	103	102.9	41	41.1	4.255	2	.12
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	55	50.0	15	20.0			
แล้วแต่โอกาส	30	34.1	19	14.9			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ							
เพื่อน/คนรักชวน	62	60.0	22	24.0	.328	1	.57
อยากลอง	126	128.0	53	51.0			

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 15 พบว่า ปริมาณที่เสพกับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมของวัยรุ่น
 ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมูทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี
 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีที่ใช้เสพ ความถี่ในการเสพ
 และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 16

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกายของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี (n = 263)

การเสพยาบ้า	การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิต				χ^2	df	p
	มากกว่าทางกาย						
	ต่ำ		สูง				
ความถี่	e	ความถี่	e				
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า							
กิน/ฉีดเข้าเส้น	9	9.9	30	29.1	.139	1	.71
สูบ/สูดควันระเหย	58	57.1	166	166.9			
ปริมาณที่เสพ							
น้อยกว่าหรือเท่ากับ							
1 เม็ดต่อวัน	24	23.4	68	68.6	.028	1	.87
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	43	43.6	128	127.4			
ความถี่ในการเสพ							
ทุกวัน	41	36.7	103	107.3	2.037	2	.36
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	17	17.8	53	52.2			
แล้วแต่โอกาส	9	12.5	40	36.5			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ							
เพื่อน/คนรักชวน	26	21.4	58	62.6	1.95	1	.16
อยากลอง	41	45.6	136	133.4			

จากตาราง 16 พบว่า วิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ ความถี่ในการเสพ และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกายของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีไม่มีความสัมพันธ์กัน

ตาราง 17

ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพยาบ้ากับการอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งพาตนเองของวัยรุ่น
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี

(n = 263)

การเสพยาบ้า	การอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งพาตนเอง				χ^2	df	p
	ต่ำ		สูง				
	ความถี่	e	ความถี่	e			
วิธีที่ใช้เสพยาบ้า							
กิน/ฉีดเข้าเส้น	29	31.0	10	8.0	.732	1	.39
สูบ/สูดควันระเหย	180	178.0	44	46.0			
ปริมาณที่เสพ							
น้อยกว่าหรือเท่ากับ							
1 เม็ดต่อวัน	75	73.1	17	18.9	.366	1	.55
มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน	134	135.9	37	35.1			
ความถี่ในการเสพ							
ทุกวัน	111	114.4	33	29.6	1.686	2	.43
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	56	55.6	14	14.4			
แล้วแต่โอกาส	42	38.9	7	10.1			
เหตุสำคัญที่ทำให้เสพ							
เพื่อน/คนรักชวน	66	66.8	18	17.2	.061	1	.81
อยากลอง	143	142.2	36	36.8			

จากตาราง 17 พบว่า วิธีที่ใช้เสพ ปริมาณที่เสพ ความถี่ในการเสพ และเหตุสำคัญที่ทำให้เสพกับการอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งพาตนเองของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูณา บ้านมุกิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณีไม่มีความสัมพันธ์กัน