




ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจำแนกกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค
และสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ นางผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักดิ์
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ พรณี เหมือนวงศ์)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ สุวิภา โกสุมวธารณ)

.....กรรมการ
(อาจารย์ วรรณชนก จันทชุม)


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจำแนกกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค และสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตัวอย่างคือสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค 100 คน และสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค 100 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เหตุการณ์ในชีวิตและแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตนในเรื่องการรับประทานอาหาร การใช้ยาแก้ปวดชนิดบรรจของและการใช้ยาชุด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การดื่มกาแฟ และการดื่มน้ำอัดลม แบบสัมภาษณ์เหตุการณ์ในชีวิต หาความเที่ยงโดยวิธีทดสอบซ้ำ (Test - retest) ได้เท่ากับ .98 และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตน ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงรวมเท่ากับ .82 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม โดยใช้สถิติจำแนกประเภท (Discriminant analysis) โดยวิธีแบบมีขั้นตอน ผลการวิเคราะห์จำแนกประเภท พบว่าสมการจำแนกประเภทสามารถจำแนกสตรีวัยเจริญพันธุ์ออกเป็นกลุ่มสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคและกลุ่มสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคได้ร้อยละ 81.50 ปัจจัยที่พบว่าสามารถจำแนกกลุ่มมี 5 ตัวแปรเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย คือ 1) การรับประทานอาหาร 2) การระครอบครัว 3) เหตุการณ์ในชีวิต 4) อายุ และ 5) การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์.

THESIS TITLE : FACTORS AFFECTING DISCRIMINATION THE GROUPS OF PEPTIC
ULCER AND NON PEPTIC ULCER FEMALE BANFANG DISTRICT,
KHON KAEN PROVINCE.

AUTHOR : MRS. PAWNGPHEN TRAKULKJONSAK

THESIS ADVISORY COMMITTEE :

 Chairman
(Associate Professor Punnee Muanwong)

 Member
(Associate Professor Suvipa Kosumwatcharaporn)

 Member
(Lecturer Wanchanok Jantachum)

ABSTRACT

The objective of this research was to identify factors to discriminate groups between peptic ulcer and non peptic ulcer female in Banfang District, Khon kaen Province. The samples were 100 diagnosed peptic ulcer females and 100 Non peptic ulcer females who were randomly selected. Data were collected by using the Social Readjustment Rating Scale and a set of self-care behavior questionnaires about eating pattern, medication use, alcohol, caffeine and carbonate beverage consumption. The testing for reliability of the Social Readjustment Rating Scale by the test - retest method resulting its reliability of .98. The reliability test of self-care behavior questionnaires by the Cronbach's alpha coefficient resulting its total reliability of .82. The data were analysed by percentage, mean, standard deviation and discriminant analysis by stepwise method.

The discriminant equation could differentiate between the groups of peptic ulcer and non peptic ulcer female about 81.50 percent. Five variables found to be able to discriminate among the two groups were 1) eating 2) family load 3) life event 4) age and 5) alcohol consumption.