

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจำแนกกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค และกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยทำการศึกษาดูอย่างที่เป็นโรคแผลเป็บติค และที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค กลุ่มละ 100 คน รวม 200 คน ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยโดยเรียงตามลำดับดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคและกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ

2. ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ได้แก่ การระบอบครัว เหตุการณ์ในชีวิต และพฤติกรรมการปฏิบัติตนในเรื่อง การรับประทานอาหาร การใช้ยาแก้ปวด ชนิดบรรจของและการใช้ยาชุด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การดื่มกาแฟ และการดื่มน้ำอัดลม

3. วิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค และกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค โดยใช้สถิติวิเคราะห์การจำแนก (Discriminant Analysis)

4.1 ผลการวิจัย

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์

จากผลการศึกษาพบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ์กลุ่มที่เป็นโรคแผลเป็บติคส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 33-41 ปี และ 24-32 ปีด้วยสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 33 และร้อยละ 32 ตามลำดับ โดยพบน้อยที่สุดในช่วงอายุ 15-33 ปีเพียงร้อยละ 11

สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค พบว่ามีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามลำดับ ส่วนสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค พบว่ามีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายในสัดส่วนเท่ากัน คือร้อยละ 50 จากสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ครอบครัวขยายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแรงงานการผลิตภาคเกษตรกรรม ได้ลดความสำคัญลง ในแรงงานภาคอุตสาหกรรมครอบครัวเดี่ยวมีปริมาณมากขึ้น สอดคล้องกับการทำงานระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม ซึ่งแยกจากครอบครัวขยายใน

ชนบทมาเป็นครอบครัวเดียวในเขตเมืองมากขึ้น จากสภาพสังคมปัจจุบัน สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค จึงพบในครอบครัวเดียวมากกว่าครอบครัวขยาย

สถานภาพสมรสของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีสถานภาพสมรสคู่เป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 78 และ 92 ตามลำดับ และในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค พบมีสถานภาพสมรสหม้าย ร้อยละ 6 หย่า แยก ร้อยละ 5 มากกว่ากลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค ซึ่งพบว่ามีสถานภาพสมรส หย่า, แยก เพียงร้อยละ 1

จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีบุตรจำนวน 2 คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 และ 42 เนื่องจากผลของการวางแผนครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันสตรีวัยเจริญพันธุ์มีบุตรอยู่ในช่วงจำนวน 1-3 คน

สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา พบมากที่สุดคือร้อยละ 77 และ 84 รองลงมาคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 16 และ 12 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบในจำนวนเพียงเล็กน้อย จะเห็นได้ว่าสตรีส่วนมากยังมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ

การประกอบอาชีพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจำนวนสูงสุดคือร้อยละ 40 และ 41 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างร้อยละ 26 และ 27 สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคส่วนมาก รับจ้างทำงานในโรงงานต่างๆ ได้แก่ โรงงานทำรองเท้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแหวน โรงงานกระดวย โรงงานน้ำแข็ง คนงานก่อสร้าง และรับจ้างทั่วไปรายวัน เช่น นวดสปา หิ้วของ นวดสปา สตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค ส่วนหนึ่งทำงานในโรงงานเช่นกัน นอกจากนี้เป็นงานรับจ้างทั่วไป เช่น ซักผ้า ทำงานบ้าน ขายของในบ้านค้า เป็นต้น นอกจากนี้ในกลุ่มสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติค พบมีอาชีพค้าขายร้อยละ 12 รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5 และอาชีพอื่นๆ ได้แก่ เย็บผ้า ทอผ้า ช่วยซ่อมรถ เจียรไนพลอย

รายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือนของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้เล็กน้อย มีผู้มีรายได้ระหว่าง 2,001-4,000 บาท เป็นจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 27 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 4,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค พบมีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001-6,000 บาท มากที่สุดร้อยละ 32 รองลงมาคือ 2,001-4,000 บาท ร้อยละ 30 และพบผู้มีรายได้ต่ำกว่าเท่ากับ 2,000 บาท ในกลุ่มสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติค มากกว่า คือร้อยละ 15 ส่วนในกลุ่มสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค พบร้อยละ 8 ประเภทรายได้ประจำที่ได้รับ พบว่าในกลุ่มสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติค ครึ่งหนึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน ในกลุ่มสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีรายได้ไม่แน่นอนร้อยละ 41 ในด้านฐานะเศรษฐกิจ สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติค มีรายได้ไม่เพียงพอร้อยละ 28 ซึ่งพบในจำนวนมากกว่าสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคคือพบร้อยละ 23

และในกลุ่มสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคนิรายได้เฉลี่ยกับร้อยละ 43 ซึ่งมีจำนวนผู้มิรายได้เฉลี่ย
เก็บมากกว่ากลุ่มสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคนิรายได้เฉลี่ยกับ ร้อยละ 38

การครอบครัวยุ สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคนิ มีการครอบครัวยุมากกว่า
สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคนิ สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคนิ พบมีการะหนักร้อยละ 28
การะปานกลางร้อยละ 66 ในขณะที่กลุ่มสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคนิ พบมีการะหนักร้อยละ 7
และการะปานกลางร้อยละ 79 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติคนิ จำแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป

	สตรีวัยเจริญพันธุ์					
					รวม	
	เป็นโรคแผลเป็ปติก		ไม่เป็นโรคแผลเป็ปติก			
	(n=100)		(n=100)		(n=200)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อายุ (ปี)						
15-23	11	11.0	17	17.0	28	14.0
24-32	32	32.0	36	36.0	68	34.0
33-41	33	33.0	29	29.0	62	31.0
42 ปีขึ้นไป	24	24.0	18	18.0	42	21.0
	$\bar{X}$	SD.	$\bar{X}$	SD.	$\bar{X}$	SD.
	34.74	8.41	32.08	8.20	33.41	8.39
ลักษณะครอบครัว						
ครอบครัวเดี่ยว	55	55.0	50	50.0	105	52.5
ครอบครัวขยาย	45	45.0	50	50.0	95	47.5
สถานภาพสมรส						
โสด	11	11.0	7	7.0	18	9.0
คู่	78	78.0	92	92.0	170	85.0
หม้าย	6	6.0	0	0.0	6	3.0
หย่า, แยก	5	5.0	1	1.0	6	3.0

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

	สตรีวัยเจริญพันธุ์				รวม	
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค			
	(n=100)		(n=100)		(n=200)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่						
1 คน	16	16.0	24	24.0	40	20.0
2 คน	44	44.0	42	42.0	86	43.0
3 คน	21	21.0	20	20.0	41	20.5
4 คนขึ้นไป	4	4.0	5	5.0	9	4.5
ยังไม่มีบุตร	15	15.0	9	9.0	24	12.0
ระดับการศึกษา						
ไม่ได้เรียนหนังสือ	1	1.0	1	1.0	2	1.0
ประถมศึกษา	77	77.0	84	84.0	161	80.5
มัธยมศึกษา	16	16.0	12	12.0	28	14.0
อาชีวศึกษา	1	1.0	2	2.0	3	1.5
อุดมศึกษา	3	3.0	0	0.0	3	1.5
อื่นๆ	2	2.0	1	1.0	3	1.5
อาชีพ						
แม่บ้าน	11	11.0	20	20.1	31	15.5
เกษตรกร	40	40.0	41	41.0	81	40.5
ค้าขาย	12	12.0	11	11.0	23	11.5
รับจ้าง	26	26.0	27	27.0	53	26.5
รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ	5	5.0	1	1.0	6	3.0
อื่นๆ เช่น เย็บผ้า ช่วย	6	6.0	0	0.0	6	3.0
ซ่อมรถ เจียรระโนพลอย						

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

	สตรีวัยเจริญพันธุ์					
	เป็นโรคแผลเป็ปติก		ไม่เป็นโรคแผลเป็ปติก		รวม	
	(n=100)		(n=100)		(n=200)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเภทของรายได้ประจำที่ได้รับ						
รายวัน	18	18.0	28	28.0	46	23.0
รายวิก (สองสัปดาห์)	10	10.0	6	6.0	16	8.0
รายเดือน	22	22.0	25	25.0	47	23.5
ไม่แน่นอน	50	50.0	41	41.0	91	45.5
รายได้ครอบครัว/เดือน						
ต่ำกว่า/เท่ากับ 2,000	15	15.0	8	8.0	23	11.5
2,001 - 4,000	27	27.0	30	30.0	57	28.5
4,001 - 6,000	26	26.0	32	32.0	58	29.0
6,001 - 8,000	6	6.0	10	10.0	16	8.0
8,001 - 10,000	15	15.0	8	8.0	23	11.5
สูงกว่า 10,000	11	11.0	12	12.0	23	11.5
	$\bar{X}$	SD.	$\bar{X}$	SD.	$\bar{X}$	SD.
	5112.51	1633.15	5162.84	1731.93	5137.67	1680.22
ฐานะทางเศรษฐกิจ						
รายได้เหลือเก็บ	38	38.0	43	43.0	81	40.5
รายได้เพียงพอ	34	34.0	34	34.0	68	34.0
รายได้ไม่เพียงพอ	28	28.0	23	23.0	51	25.5

4.1.2 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร

4.1.2.1 การะครอบครัว

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตามการะครอบครัว

	สตรีวัยเจริญพันธุ์					
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค		รวม	
	(n=100)		(n=100)		(n=200)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การะครอบครัว						
ไม่มีภาระ	6	6.0	14	14.0	20	10.0
ภาระปานกลาง	66	66.0	79	79.0	145	72.5
ภาระหนัก	28	28.0	7	7.0	35	17.5
	$\bar{X}$	SD.	$\bar{X}$	SD.	$\bar{X}$	SD.
	2.10	0.46	1.93	0.45	2.02	0.46

4.1.2.2 เหตุการณ์ในชีวิต

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม
การเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์				รวม	
	เป็น โรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค		(n=200)	
	(n=100)		(n=100)			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สุขภาพ						
1. ท่านเจ็บป่วยมากถึงกับต้อง เข้ารักษาพยาบาลในโรง พยาบาล	9	9.0	3	3.0	12	6.0
2. ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้อง เข้าโรงพยาบาล แต่ต้อง หยุดงานหรือหยุดทำกิจ กรรมตามปกติ	70	70.0	49	49.0	119	59.5
3. ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยว กับการนอน เป็นประจำ (เช่น นอนไม่หลับ เวลา นอนไม่แน่นอน)	42	42.0	23	23.0	65	32.5
4. ท่านมีการใช้กำลังแรงงาน มากกว่าปกติ ทำงานหนัก เช่น ขุดดิน แบกหาม งาน ก่อสร้าง ต้องทำงานล่วง เวลา งานเร่ง ทำงานแข่งกับ เวลา	56	56.0	22	22.0	78	39.0
5. ท่านไม่มีการผ่อนคลาย อารมณ์เลย (เช่น ชมภาพ ยนตร์ ฟังเพลง เดินเล่น)	14	14.0	8	8.0	22	11.0

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม
การเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ (ต่อ)

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์				รวม	
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค		(n=200)	
	(n=100)		(n=100)			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ครอบครัว						
6. สามี เสียชีวิต	6	6.0	1	1.0	7	3.5
7. หย่าแยก	5	5.0	0	0.0	5	2.5
8. สามี เจ็บป่วยหนัก	9	9.0	0	0.0	9	4.5
9. บุตรเจ็บป่วยหนัก	6	6.0	0	0.0	6	3.0
10. บุตรเสียชีวิต	2	2.0	1	1.0	3	1.5
11. ท่านและสามีมีเรื่องบาด หมางกัน (เช่น สามีนอก ใจ สามีชอบเที่ยว)	15	15.0	2	2.0	17	8.5
12. สามีทำร้ายร่างกายท่าน เสมอ	5	5.0	1	1.0	6	3.0
13. ท่านและสามีมีปัญหาเรื่อง เพศสัมพันธ์	8	8.0	1	1.0	9	4.5
14. บิดาหรือมารดาของท่าน/ สามีเจ็บป่วยหนัก	9	9.0	4	4.0	13	6.5

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม
การเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ (ต่อ)

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์				รวม	
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค		(n=200)	
	(n=100)		(n=100)			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
15. บิดาหรือมารดาของท่าน/ สามี เสียชีวิต	6	6.0	4	4.0	10	5.0
16. มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว (เช่น มีญาติมาอาศัยด้วย)	18	18.0	8	8.0	26	13.0
17. ท่านและสามีต้องจากกัน นานๆ (6 เดือนขึ้นไป)	16	16.0	7	7.0	23	11.5
18. บุตรเกร มีปัญหาการเรียน หรือความประพฤติของ บุตร (เช่น ดื่มสุรา ยาเสพติด เที่ยวเตร่)	8	8.0	6	6.0	14	7.0
19. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับญาติทาง สามี/ญาติของตนเอง/ เพื่อนบ้าน	28	28.0	11	11.0	39	19.5
เศรษฐกิจ						
20. การใช้จ่ายเพื่อปัจจัยสี่ใน ครอบครัวขาดสน ฝืดเคือง	61	61.0	39	39.0	100	50.0
21. ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้น พ้นตัว	3	3.0	1	1.0	4	2.0
22. ท่านหรือครอบครัวต้อง ผ่อนส่งของที่มีราคาสูง (เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์)	20	20.0	8	8.0	28	14.0

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม
การเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ (ต่อ)

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์				รวม	
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค		(n=200)	
	(n=100)		(n=100)			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
23. ครอบครัวของท่านถูกขี้ดหรือไล่ที่	1	1.0	1	1.0	2	1.0
24. กิจการงานของท่านหรือครอบครัวขาดทุน หรือล้มเหลวจนต้องล้มเลิกกิจการไป	4	4.0	0	0.0	4	2.0
25. ท่านต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียว	14	14.0	2	2.0	16	8.0
26. ท่านเริ่มทำงานนอกบ้านเป็นครั้งแรก	7	7.0	4	4.0	11	5.5
27. ท่านตกงาน	10	10.0	0	0.0	10	5.0
28. สามีตกงาน	7	7.0	1	1.0	8	4.0
29. ท่านต้องรับผิดชอบการทำงานมากขึ้นจนเวลาพักผ่อนน้อยลง	36	36.0	14	14.0	50	25.0
30. สามีต้องรับผิดชอบการทำงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว	12	12.0	4	4.0	16	8.0
31. ท่านทำงานที่ต้องเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ (เช่นงานก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง ทำงานที่มีเครื่องจักรเสียงดัง ฯลฯ)	20	20.0	4	4.0	24	12.0

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม
การเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ (ต่อ)

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์				รวม	
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค		(n=200)	
	(n=100)		(n=100)			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
32. ท่านเปลี่ยนงานใหม่ซึ่ง ต้องมีการปรับตัว	7	7.0	3	3.0	10	5.0
33. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา	7	7.0	2	2.0	9	4.5
34. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้อง, เพื่อนร่วมงาน	13	13.0	2	2.0	15	7.5
สังคม						
35. ครอบครัวของท่านประสบ อุบัติเหตุจนทรัพย์สินเสียหาย (เช่น ไฟไหม้บ้าน น้ำ ท่วม ขโมยชิ้นบ้าน)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
36. ท่านต้องโทษ (สถานเบา โดยไม่ถูกคุมขัง หรือถูก คุมขังไม่เกิน 3 เดือน)	1	1.0	1	1.0	2	1.0
37. สามีต้องโทษ (สถานเบา โดยไม่ถูกคุมขัง หรือถูก คุมขังไม่เกิน 3 เดือน)	1	1.0	0	0.0	1	0.5
38. ท่านหรือสามีถูกทำร้ายร่างกาย จนบาดเจ็บ	0	0.0	1	1.0	1	0.5
39. เพื่อนสนิทของท่านเสียชีวิต	2	2.0	0	0.0	2	1.0

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม
การเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายชื่อ (ต่อ)

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์				รวม	
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค		(n=200)	
	(n=100)		(n=100)			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
40. ท่านหรือสามีเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ (เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท ถูกประจาน ถูกกล่าวหา)	7	7.0	3	3.0	10	5.0
41. สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน (เช่น มีการลักขโมยบ่อยๆ มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลา มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี)	8	8.0	4	4.0	12	6.0

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตามการเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายชื่อ

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์			
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค	
	$\bar{X}$ (n=100)	S.D.	$\bar{X}$ (n=100)	S.D.
สุขภาพ				
1. ท่านเจ็บป่วยมากถึงกับต้องเข้ารับการรักษา พยาบาลในโรงพยาบาล	0.81	2.59	0.30	1.71
2. ท่านเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ต้องหยุดงานหรือหยุดทำกิจกรรมตาม ปกติ	4.20	2.76	2.94	3.02
3. ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการนอน เป็นประจำ (เช่น นอนไม่หลับ เวลานอน ไม่แน่นอน)	2.10	2.48	1.15	2.12
4. ท่านมีการใช้กำลังแรงงานมากกว่าปกติ ทำงานหนัก เช่น ขุดดิน แบกหาม งานก่อสร้าง ต้องทำงานล่วงเวลา งานเร่ง ทำงาน แข่งกับเวลา	3.92	3.49	1.54	2.91
5. ท่านไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์เลย (เช่น ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง เดินเล่น)	0.70	1.74	0.40	1.36
ครอบครัว				
6. สามี เสียชีวิต	0.66	2.63	0.11	1.10
7. หย่าแยก	0.45	1.97	0.00	0.00
8. สามี เจ็บป่วยหนัก	0.81	2.59	0.00	0.00
9. บุตรเจ็บป่วยหนัก	0.60	2.39	0.00	0.00
10. บุตรเสียชีวิต	0.22	1.55	0.11	1.10
11. ท่านและสามีมีเรื่องบาดหมางกัน (เช่น สามีนอกใจ สามีชอบเที่ยว)	1.20	2.87	0.16	1.13
12. สามีทำร้ายร่างกายท่านเสมอ	0.45	1.97	0.09	0.90

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตามการเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ (ต่อ)

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์			
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค	
	$\bar{X}$ (n=100)	S.D.	$\bar{X}$ (n=100)	S.D.
13. ท่านและสามีมีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์	0.48	1.64	0.06	0.60
14. บิดาหรือมารดาของท่าน/สามีเจ็บป่วยหนัก	0.72	2.30	0.32	1.58
15. บิดาหรือมารดาของท่าน/สามี เสียชีวิต	0.60	2.39	0.40	1.97
16. มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว (เช่น มีญาติมาอาศัยด้วย)	0.90	1.93	0.40	1.36
17. ท่านและสามีต้องจากกันนานๆ (6 เดือนขึ้นไป)	1.12	2.58	0.49	1.80
18. บุตรเกร มีปัญหาการเรียนหรือความประพฤติของบุตร (เช่น คิ้มสุรา ยาเสพติด เที้ยวเตร)	0.64	2.18	0.48	1.91
19. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับญาติทางสามี/ญาติของตนเอง/เพื่อนบ้าน	1.68	2.71	0.66	1.89
เศรษฐกิจ				
20. การใช้จ่ายเพื่อปัจจัยสี่ในครอบครัวขาดสน ฝืดเคือง	4.88	3.92	3.12	3.92
21. ท่านหรือสามีมีหนี้สินล้นพ้นตัว	0.30	1.71	0.10	1.00
22. ท่านหรือครอบครัวต้องผ่อนส่งของที่มีราคาสูง (เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์)	1.60	3.22	0.64	2.18
23. ครอบครัวของท่านถูกยึดหรือไล่ที่	0.10	1.00	0.10	1.00
24. กิจการงานของท่านหรือครอบครัวขาดทุน หรือล้มเหลวจนต้องล้มเลิกกิจการไป	0.28	1.38	0.00	0.00

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตามการเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายข้อ (ต่อ)

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์			
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค	
	$\bar{X}$ (n=100)	S.D.	$\bar{X}$ (n=100)	S.D.
25. ท่านต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียว	1.26	3.14	0.18	1.27
การงาน				
26. ท่านเริ่มทำงานนอกบ้านเป็นครั้งแรก	0.35	1.28	0.20	0.99
27. ท่านตกงาน	0.70	2.11	0.00	0.00
28. สามีตกงาน	0.56	2.05	0.08	0.80
29. ท่านต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนเวลาพักผ่อนน้อยลง	2.52	3.38	0.98	2.44
30. สามีต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว	0.66	1.80	0.22	1.08
31. ท่านทำงานที่ต้องเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ (เช่น งานก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง ทำงานที่มีเครื่องจักรเสียงดัง ฯลฯ)	1.20	2.41	0.24	1.18
32. ท่านเปลี่ยนงานใหม่ซึ่งต้องมีการปรับตัว	0.35	1.28	0.15	0.86
33. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา	0.42	1.54	0.12	0.84
34. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้อง, เพื่อนร่วมงาน	0.65	1.69	0.10	0.70
สังคม				
35. ครอบครัวของท่านประสบอุบัติเหตุจนทรัพย์สินเสียหาย (เช่น ไฟไหม้บ้าน น้ำท่วม ขโมยชิ้นบ้าน)	0.00	0.00	0.00	0.00
36. ท่านต้องโทษ (สถานเบาโดยไม่ถูกคุมขังหรือถูกคุมขังไม่เกิน 3 เดือน)	0.07	0.70	0.07	0.70
37. สามีต้องโทษ (สถานเบาโดยไม่ถูกคุมขังหรือถูกคุมขังไม่เกิน 3 เดือน)	0.08	0.80	0.00	0.00

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค จำแนกตามการเกิดเหตุการณ์ในชีวิตรายชื่อ (ต่อ)

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์			
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค	
	$\bar{X}$ (n=100)	S.D.	$\bar{X}$ (n=100)	S.D.
38. ท่านหรือสามีถูกทำร้ายร่างกาย จนบาดเจ็บ	0.00	0.00	0.09	0.90
39. เพื่อนสนิทของท่านเสียชีวิต	0.12	0.84	0.00	0.00
40. ท่านหรือสามีเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ (เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท ถูกประจาน ถูกกล่าวหา)	0.56	2.05	0.24	1.31
41. สถานที่อยู่อาศัยของท่านหรือครอบครัว ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน (เช่น มีการลักขโมยบ่อยๆ มีเสียงดัง รบกวนตลอดเวลา มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี)	0.48	1.64	0.20	1.13

จากตารางที่ 3-4 พบว่าการเกิดเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละเหตุการณ์ในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคมีผู้เกิดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มากกว่ากลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค และทั้งสองกลุ่มมีผู้เกิดเหตุการณ์ในชีวิตมากที่สุดในแต่ละด้านคือ ด้านสุขภาพ สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคและสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีเหตุการณ์ เคยเจ็บป่วยไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ต้องหยุดงานหรือหยุดทำกิจกรรมตามปกติ มากที่สุดร้อยละ 70 และ 49 ตามลำดับ รองลงมาคือเหตุการณ์ มีการใช้กำลังแรงงานมากกว่าปกติ ทำงานหนัก (เช่น ขุดดิน แบกหาม งานก่อสร้าง ต้องทำงานล่วงเวลา งานเร่งทำงานแข่งกับเวลา) ร้อยละ 56 และ 22

ด้านครอบครัว สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค มีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหากับญาติทางสามี/ญาติของตนเอง เพื่อนบ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28 และ 11

ด้านเศรษฐกิจ สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค มีเหตุการณ์ การใช้จ่ายเพื่อปัจจัยสี่ในครอบครัวขัดสนฝืดเคืองมากที่สุด ร้อยละ 61 และ 39 รองลงมาคือเหตุการณ์ คนเอง

หรือครอบครัวต้องผ่อนส่งของที่มีราคาสูงเกินกำลัง (เช่น บ้านที่ดิน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์) ร้อยละ 20 และ 8 ตามลำดับ

ด้านการงาน สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีเหตุการณ์ ต้องรับผิดชอบการงานมากขึ้นจนเวลาพักผ่อนน้อยลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 และ 14 และเหตุการณ์ที่ต้องทำงานเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ (เช่น งานก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง ทำงานที่มีเครื่องจักรเสียงดัง) ร้อยละ 20 และ 4

ด้านสังคม สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีเหตุการณ์ สถานที่อยู่อาศัยของตนเองหรือครอบครัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (เช่น มีการลักขโมยบ่อยๆ มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลา มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8 และ 4

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตด้านต่างๆ และรวมทุกด้านของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค

เหตุการณ์ในชีวิต	สตรีวัยเจริญพันธุ์			
	เป็นโรคแผลเป็บติค		ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค	
	$\bar{X}$	SD.	$\bar{X}$	SD.
สุขภาพ	12.00	8.28	6.03	0.66
ครอบครัว	10.53	14.29	3.28	6.48
เศรษฐกิจ	8.42	8.33	4.14	5.14
การงาน	7.41	9.37	2.09	4.50
สังคม	1.33	3.42	0.62	2.44
รวม	39.69	34.92	16.16	17.02

จากตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละด้าน และค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตรวมทุกด้านของสตรีวัยเจริญพันธุ์ทั้งสองกลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนเหตุการณ์ในชีวิตของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านของกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคเท่ากับ 39.69 และค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค เท่ากับ 16.16

4.1.2.3 พฤติกรรมการปฏิบัติตนของสตรีวัยเจริญพันธุ์

ตารางที่ 6 ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติคจำแนกตามพฤติกรรม

การปฏิบัติตนในเรื่องการรับประทานอาหาร

พฤติกรรม	สตรีวัยเจริญพันธุ์							
	เป็นโรคแผลเป็บติค				ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค			
	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บางครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บางครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ
1. ทานรับประทานอาหารรส เผ็ดจัด	57.0	15.0	22.0	6.0	16.0	15.0	43.0	26.0
2. ทานรับประทานอาหารรส เปรี้ยวจัด	35.0	15.0	26.0	24.0	7.0	10.0	35.0	48.0
3. ทานรับประทานอาหารจนรู้ สึกอิ่มเกินไป	3.0	9.0	43.0	45.0	2.0	1.0	18.0	79.0
4. ทานรับประทานอาหารจุบจิบ	8.0	13.0	34.0	45.0	1.0	10.0	37.0	52.0
5. ทานรับประทานอาหาร อย่างรีบเร่งไม่เคี้ยวให้ ละเอียด	29.0	17.0	25.0	29.0	3.0	8.0	16.0	73.0
6. ทานรับประทานอาหารไม่ ครบ 3 มื้อต่อวัน	28.0	19.0	22.0	31.0	4.0	7.0	14.0	75.0
7. ทานรับประทานอาหารไม่ ตรงเวลา	52.0	28.0	13.0	7.0	2.0	12.0	46.0	40.0
8. ทานรับประทานอาหารที่ ย่อยยากประเภทที่มีไขมัน เช่น เนื้อติดมัน อาหารทอด	6.0	5.0	67.0	22.0	0.0	5.0	55.0	40.0
9. ทานรับประทานอาหาร แข็งๆ เหนียวๆ เช่น เนื้อ เหนียวๆ หรือพืชผักที่มีเส้น ใยเหนียวๆ	3.0	5.0	55.0	37.0	0.0	1.0	47.0	52.0

ตารางที่ 6 ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติคจำแนกตามพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในเรื่องการรับประทานอาหาร (ต่อ)

พฤติกรรม	สตรีวัยเจริญพันธุ์							
	เป็นโรคแผลเป็บติค				ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค			
	การปฏิบัติ				การปฏิบัติ			
	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บาง ครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บาง ครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ
10.ท่านรับประทานอาหารข้าวเหนียว	57.0	33.0	9.0	1.0	68.0	24.0	8.0	0.0
11.ท่านรับประทานอาหารเนื้อดิบ ปลาดิบ	1.0	3.0	35.0	61.0	0.0	3.0	24.0	73.0
12.ท่านรับประทานอาหาร หมักดอง	36.0	29.0	29.0	6.0	3.0	15.0	74.0	8.0

พฤติกรรมการปฏิบัติตนของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในเรื่องการรับประทานอาหาร พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องมากกว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในแต่ละข้อ พบว่า การรับประทานอาหารข้าวเหนียวทั้งกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการรับประทานเป็นประจำเช่นเดียวกันทั้งสองกลุ่ม ร้อยละ 57 และ 68 เนื่องจากข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนอีสาน ในเรื่องการรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุด ร้อยละ 57 ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 15 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ร้อยละ 22 ในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการรับประทานอาหารรสเผ็ดจัดเป็นบางครั้งมากที่สุด ร้อยละ 43 ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 15 และปฏิบัติเป็นประจำ ร้อยละ 16 สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติครับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็นประจำ มากที่สุด ร้อยละ 52 ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 28 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ร้อยละ 13 ในขณะที่กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติครับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็นประจำน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 2 รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็นบางครั้ง ร้อยละ 46 การรับประทานอาหารหมักดอง กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุดร้อยละ 36 กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการปฏิบัติเป็นประจำน้อยที่สุด ร้อยละ 3 ปฏิบัติเป็นบางครั้งมากที่สุด ร้อยละ 74 กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติครับประทานอาหารเปรี้ยวจัดเป็นประจำมากที่สุด ร้อยละ 35 กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์

ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติกรับประทานรสเปรี้ยวจัดเป็นประจำน้อยที่สุด ร้อยละ 7 รับประทานเป็นบางครั้งร้อยละ 35 การรับประทานอาหารอย่างรีบเร่งไม่เคี้ยวให้ละเอียด สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติกรปฏิบัติเป็นประจำร้อยละ 29 สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติกรปฏิบัติเป็นประจำน้อยที่สุดร้อยละ 3 ปฏิบัติเป็นบางครั้งร้อยละ 16 และการรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อต่อวัน สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติกรปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุด ร้อยละ 28 สตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติกรปฏิบัติเป็นประจำเพียงร้อยละ 4 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6

ตารางที่ 7 ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ป่วยและไม่ป่วยด้วยโรคแผลเป็บติกรจำแนกตามพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในเรื่องการใช้ยาแก้ปวดชนิดบรรจของและการใช้ยาชุด

พฤติกรรม	สตรีวัยเจริญพันธุ์							
	เป็นโรคแผลเป็บติกรปฏิบัติ				ไม่เป็นโรคแผลเป็บติกรปฏิบัติ			
	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บาง ครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บาง ครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ
1. ท่านซื้อยาแก้ปวดชนิดบรรจของหรือยาชุดรับประทานเอง	5.0	5.0	25.0	65.0	0.0	3.0	15.0	82.0
2. ท่านรับประทานยาแก้ปวดชนิดบรรจของหรือยาชุดก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่าง	2.0	5.0	17.0	76.0	0.0	2.0	9.0	89.0
3. ท่านรับประทานยาแก้ปวดชนิดบรรจของหรือยาชุดร่วมกับเหล้าเบียร์หรือเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน	0.0	1.0	1.0	98.0	0.0	0.0	0.0	100.0

การใช้ยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนและการใช้ยาชุด พบว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค มีการใช้ยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนและการใช้ยาชุดมากกว่าสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคซื้อยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนและยาชุดรับประทานเองมากที่สุดร้อยละ 35 โดยใช้เป็นประจำร้อยละ 5 ใช้บ่อยครั้งร้อยละ 5 และใช้เป็นบางครั้งร้อยละ 25 ในขณะที่สตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค ซื้อยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนหรือยาชุดรับประทานเองเพียงร้อยละ 18 เป็นการใช้อย่างน้อยครั้งร้อยละ 3 และใช้เป็นบางครั้งร้อยละ 15 การรับประทานยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนหรือยาชุดก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่าง พบสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติค มีการใช้เป็นประจำร้อยละ 2 ใช้อย่างน้อยครั้งร้อยละ 5 และใช้เป็นบางครั้ง 17 ส่วนสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค มีเพียงการใช้อย่างน้อยครั้งร้อยละ 2 และใช้บางครั้งร้อยละ 9 นอกจากนี้พบว่ามีการรับประทานยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนหรือยาชุดร่วมกับเหล้า เบียร์ หรือเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน โดยเฉพาะในสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติค มีการใช้อย่างน้อยครั้งและเป็นบางครั้ง ร้อยละ 1, 1

การใช้ยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนและการใช้ยาชุด สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นและไม่เป็นโรคแผลเป็บติค พบว่า สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการใช้ยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนและยาชุดมากกว่าสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคซื้อยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนและยาชุดรับประทานเองเป็นบางครั้ง ร้อยละ 25 รับประทานยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนหรือยาชุดก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่างเป็นบางครั้งร้อยละ 17 และรับประทานยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนหรือยาชุดร่วมกับเหล้า เบียร์ หรือเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนเป็นบางครั้ง ร้อยละ 1 สำหรับสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค มีการซื้อยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนและยาชุดรับประทานเองเป็นบางครั้งร้อยละ 15 รับประทานยาแก้ปวดชนิดบรรจุก่อนหรือยาชุดก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่างเป็นบางครั้ง ร้อยละ 9 ดังรายละเอียดในตารางที่ 7

ตารางที่ 8 ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ป่วยและไม่ป่วยด้วยโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม

พฤติกรรมการปฏิบัติตนในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรม	สตรีวัยเจริญพันธุ์							
	เป็นโรคแผลเป็บติค				ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค			
	การปฏิบัติ				การปฏิบัติ			
	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บาง ครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บาง ครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ
1. ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่าง	3.0	7.0	46.0	44.0	2.0	1.0	31.0	66.0
2. ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมสารอื่น เป็นชาคองเหล่า	2.0	4.0	16.0	78.0	2.0	1.0	9.0	88.0
3. ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมกาแฟ	0.0	0.0	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	100.0
4. ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมยาแก้ปวด	0.0	0.0	1.0	99.0	0.0	0.0	0.0	100.0

สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่างมากที่สุดร้อยละ 56 โดยดื่มเป็นประจำร้อยละ 3 ดื่มน้อยครั้งร้อยละ 7 และดื่มเป็นบางครั้งร้อยละ 46 ในกลุ่มสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีเพียงร้อยละ 34 ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เบียร์ก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่าง โดยดื่มเป็นประจำร้อยละ 2 ดื่มน้อยครั้งร้อยละ 1 และดื่มเป็นบางครั้งร้อยละ 31 สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมสารอื่น เป็นชาคองเหล่าร้อยละ 22 ในจำนวนนี้ดื่มเป็นประจำร้อยละ 2 ที่เหลือดื่มน้อยครั้งและเป็นบางครั้ง สตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมสารอื่นเป็นชาคองเหล่า เพียงร้อยละ 12 โดยดื่มเป็นประจำร้อยละ 2 เช่นเดียวกัน และพบ

เฉพาะในสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมกาแฟและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมชาแก้ปวด ร้อยละ 1, 1 ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 8

ตารางที่ 9 ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ป่วยและไม่ป่วยด้วยโรคแผลเป็บติค จำแนกตาม
พฤติกรรมการปฏิบัติตนในเรื่องการดื่มกาแฟ

พฤติกรรม	สตรีวัยเจริญพันธุ์							
	เป็นโรคแผลเป็บติค				ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค			
	การปฏิบัติ				การปฏิบัติ			
	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บาง ครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ	เป็นประจำ ร้อยละ	บ่อย ครั้ง ร้อยละ	บาง ครั้ง ร้อยละ	ไม่เคย เลย ร้อยละ
1. ทานดื่มกาแฟแทนอาหาร บางมื้อ	20.0	3.0	13.0	64.0	5.0	6.0	11.0	78.0
2. ทานดื่มกาแฟระหว่างมื้อ อาหาร	5.0	1.0	10.0	84.0	0.0	3.0	4.0	93.0
3. ทานดื่มกาแฟหลังอาหาร	7.0	3.0	8.0	82.0	0.0	4.0	6.0	90.0
4. ทานดื่มกาแฟรองท้อง เพียงอย่างเดียว	12.0	3.0	7.0	78.0	1.0	2.0	8.0	89.0

สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคแผลเป็บติค มีการดื่มกาแฟ มากกว่าสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค พบมีการดื่มกาแฟแทนอาหารบางมื้อมากที่สุดร้อยละ 36 โดยดื่มเป็นประจำร้อยละ 20 ดื่มน้อยครั้งร้อยละ 3 และดื่มเป็นบางครั้งร้อยละ 13 ในสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการดื่มกาแฟแทนอาหารบางมื้อเพียงร้อยละ 22 โดยดื่มเป็นประจำร้อยละ 5 ดื่มน้อยครั้งร้อยละ 6 และดื่มเป็นบางครั้งร้อยละ 11 สตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคดื่มกาแฟระหว่างมื้ออาหารและดื่มกาแฟหลังอาหารเป็นประจำร้อยละ 5 และ 7 ตามลำดับ นอกนั้นดื่มน้อยครั้งและเป็นบางครั้ง ส่วนในกลุ่มสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค ไม่พบสตรีที่มีการดื่มเป็นประจำ มีเพียงการดื่มน้อยครั้งและดื่มเป็นบางครั้ง สำหรับการดื่มกาแฟ รองท้องเพียงอย่างเดียว พบว่าสตรีที่เป็นโรคแผลเป็บติคมีการดื่มเป็นประจำร้อยละ 12 แต่ในกลุ่มสตรีที่ไม่เป็นโรคแผลเป็บติค พบมีการดื่มเป็นประจำเพียงร้อยละ 1 ดังรายละเอียดในตารางที่ 9