


ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มต่อการดูแลตนเองใน
ผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ นางสาวอมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ไชยพันธุ์)

..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา แสงเวริญ)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Design) มีจุดมุ่งหมายคือศึกษาผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มต่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอระยะที่ 3 และ 4 ที่ได้รับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกรังสีรักษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ อายุ 20-60 ปี มีสติสัมปชัญญะดี และไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยวาจา กลุ่มตัวอย่าง 12 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติจำนวน 6 คน และกลุ่มทดลองที่ได้รับการพยาบาลตามปกติและการให้การปรึกษาแบบกลุ่มจำนวน 6 คน เข้ากลุ่ม 8 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม และแบบสัมภาษณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือแมน-วิทนี ยู เทสต์(The Mann-Whitney U Test) ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการพยาบาลตามปกติและการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ช่วยให้มีการดูแลตนเองมากกว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

THESIS TITLE : THE EFFECT OF GROUP COUNSELING ON SELF-CARE
OF THE CANCER PATIENTS AT SRINAKARIND
HOSPITAL IN KHON KAEN PROVINCE

AUTHOR : MISS AMORNRAT PONGJANYAKUL

THESIS ADVISORY COMMITTEE :

Ganjana Chaiyapan.....Chairman
(Assistant Professor Dr.Ganjana Chaiyapan)

Kritaya Swangchareon.....Member
(Assistant Professor Kritaya Swangchareon)

Abstract

The design of this research was Quasi-Experimental.
The purposes of this study was to study the effect of group counseling on self-care of the cancer patients. The samples were head and neck cancer stage 3 and 4 patients who were treated at the out-patients department of radiotherapy at Srinakarind Hospital at connection 4 weeks, with the age of 20-60 years old, were good orientation, and no problem about verbal communication. The sample consisted of 12 patients which were divided into two groups. Control group received only medical treatment and general nursing care but experimental group was treated not only by medicine and general nursing care but also by group counseling for

8 times by spending 45-60 minutes for each time during 4 weeks. The administered instruments are group-counseling plan and the self-care rating scale. The Mann-Whitney U Test was used to analyze the data. The result showed that self-care scores of the experimental group was significantly higher than the control group at .05 level.