

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึง ลักษณะสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ โดยส่วนรวม และลักษณะสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ซึ่งจำแนกโดยอาศัยระยะเวลาของการต้องโทษ คือ กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี, 25 ปี - 34 ปี และ 35 ปี - ตลอดชีวิต

ลักษณะสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง ซึ่งจำแนกโดยอาศัยระยะเวลาของการต้องโทษ ปรากฏดังนี้ คือกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี มีระดับสุขภาพจิตทั้ง 9 ด้านอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิต นั้น มีระดับสุขภาพจิตที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติถึง 8 ด้าน คือ ด้านความรู้สึกลึกซึ้งของร่างกาย ด้านการยับยั้งชั่งใจ ด้านความขี้อาย ด้านความวิตกกังวล ด้านความรู้สึกลึกซึ้งโกรธแค้น ก้าวร้าว ด้านความรู้สึกล้มโดยไม่มีเหตุผล ด้านความรู้สึกลึกซึ้งหวาดระแวง และด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ โดยส่วนรวมมีลักษณะสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ยกเว้นเพียง 2 ด้าน คือ สุขภาพจิตด้านความขี้อาย และด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ และมีกลุ่มที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 61.11 และ 47.78 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้ F-test และ Scheffé Test for all possible Comparison ข้อมูลปรากฏว่าพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระหว่างสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังทั้ง 3 กลุ่ม รายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวจะแสดงในตารางที่ 1 - 19 ตามลำดับต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกายของผู้ต้องขัง
เรือนจำกลางคลองไผ่ ($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะ
สุขภาพจิต

ด้านความรู้สึกผิดปกติของ ร่างกาย	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
ปวดศีรษะ	1.55	1.73	1.78
เป็นลมหรือวิงเวียน	0.63	0.83	1.52
ปวดที่หัวและหน้าอก	1.30	1.37	1.70
ปวดบนเอว	1.72	1.87	2.18
คลื่นไส้หรือปั่นป่วนในท้อง	0.98	1.03	1.62
ปวดกล้ามเนื้อ	1.20	1.40	1.67
หายใจไม่สะดวก	1.02	1.02	1.53
รู้สึกสับสนหรือสับสน	1.23	1.22	1.55
รู้สึกชาหรือชู่ซ่าตามตัว	0.87	0.90	1.37
มีก้อนอะไรมาจุกที่คอหอย	0.48	0.47	0.98
รู้สึกว่าบางส่วนของร่างกาย ไม่มีแรง	1.32	1.70	1.85
รู้สึกหนักตามแขนขา	0.97	1.03	1.27
รวมเฉลี่ย	1.11	1.22	1.59
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย 0.10 - 1.30			

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกายกับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา
กระทรวงสาธารณสุข, 2520) ปรากฏว่า ระดับสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย
ของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ใน
เกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี -
ตลอดชีวิตนั้น สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านย้ากีย้าทำ ของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่
($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิต

ด้านย้ากีย้าทำ	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
ชอบกินอะไรซ้ำ ๆ ซาก ๆ	1.47	1.80	1.95
อยู่อย่างเดียว			
ความยุ่งยากเกิดจากความ	1.55	1.57	1.92
ซ้ำจำของท่าน			
กังวลใจเกี่ยวกับความ	1.40	1.63	1.75
สะเพร่าของตนเอง			
รู้สึกลำบากใจในการทำงาน	1.17	1.07	1.70
ให้เสร็จ			
ต้องทำงานซ้ำ ๆ เพื่อให้	2.27	2.28	2.60
แน่ใจว่าถูกต้อง			
ตรวจตราสิ่งที่ทำไปแล้ว	1.60	1.63	2.02
ซ้ำแล้วซ้ำอีก			
มีความลำบากในการ	1.35	1.77	1.70
ตัดสินใจ			
จิตใจว่างเปล่า	1.38	1.52	2.15
ไม่มีสมาธิ	1.43	1.52	2.32
ทำอะไรซ้ำ ๆ ซาก ๆ เช่น	0.68	0.82	1.48
แตะ นับ ล้าง			
รวมเฉลี่ย	1.43	1.56	1.96
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านการย้ากีย้าทำ			0.61 - 1.81

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านการย้ากีย้าทำกับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา กระทรวงสาธารณสุข, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตด้านการย้ากีย้าทำของผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง

ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิตนั้น สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของลักษณะของสุขภาพจิตด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่นของผู้ต้อง
ขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะ
สุขภาพจิต

ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
มีความรู้สึกอยากวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น	0.60	0.37	1.00
ร้องไห้	0.40	0.53	0.63
รู้สึกสะเทือนใจง่าย	1.63	1.68	1.97
รู้สึกว่าคนอื่น ๆ ไม่เข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจท่าน	1.50	1.57	1.93
รู้สึกว่าคนอื่นไม่เป็นมิตรหรือไม่ชอบท่าน	1.28	1.13	1.72
รู้สึกว่าค้อยกว่าคนอื่น	1.00	0.97	1.88
รู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีคนเฝ้ามองหรือพูดเกี่ยวกับท่าน	1.22	1.17	1.77
รู้สึกว่าคนอื่นมุ่งความสนใจมาที่ตัวท่าน	1.03	0.90	1.40
รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องกินหรือดื่มในที่สาธารณะ	1.13	1.18	1.75
รวมเฉลี่ย	1.09	1.06	1.56
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น 0.08 - 1.79			

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่นกับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา ราชธรรมราชธรรมราชธรรม, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่นของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิตนั้น อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความซึมเศร้าของผู้ต้องขังเรือนจำกลาง
คลองไผ่ ($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิต

ด้านความซึมเศร้า	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
ขาดความสนใจทางเพศ	1.03	0.92	1.78
รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงเชิงข้อขา	1.05	1.40	1.82
กิทยากตาย	0.22	0.38	2.17
ไม่เจริญอาหาร	1.52	1.40	1.77
รู้สึกอายนหรืออึดอัดเมื่ออยู่ ต่อหน้าเพศตรงข้าม	0.87	1.03	2.03
ตำหนิตัวเองในเรื่องต่างๆ	1.67	1.43	1.78
รู้สึกเหงา	2.55	2.03	2.88
รู้สึกเศร้า	2.03	1.88	2.65
กังวลในสิ่งต่าง ๆ มาก เกินไป	1.57	1.23	1.73
รู้สึกไม่สนใจในสิ่งต่าง ๆ	1.20	1.15	1.85
รู้สึกสิ้นหวังเกี่ยวกับอนาคต	1.32	2.15	2.92
รู้สึกว่าภาระกระทำต่าง ๆ ต้องใช้ความพยายาม	2.28	2.18	2.90
รู้สึกตัวเองไม่มีค่า	1.17	1.13	2.47
รวมเฉลี่ย	1.42	1.43	2.21
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านความซึมเศร้า		0.42 - 1.43	

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความซึมเศร้ากับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา ราชธรรมสารธรรมสุข, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตด้านความซึมเศร้าของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิตนั้น สูงกว่าเกณฑ์ปกติ แต่พอสรุปได้ว่าทุกกลุ่มมีลักษณะสุขภาพจิตด้านความซึมเศร้าสูงถึงสูงมาก

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวลของผู้ห้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่
($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิต

ด้านความวิตกกังวล	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25 ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
ประสาอ่อนหรือประหม่าง่าย	1.01	1.43	1.83
มีอาการตัวสั่น	0.62	0.88	1.48
รู้สึกว่าคุณกักขังหรือถูกควบคุม	2.18	2.38	2.82
รู้สึกกลัว	0.70	0.95	1.27
หัวใจเต้นแรงและเร็ว	1.35	1.40	1.77
รู้สึกตึงเครียด	1.92	2.00	2.60
รู้สึกตื่นตกใจเป็นบางครั้ง	1.32	1.62	1.85
รู้สึกนั่งไม่ติด	1.05	0.90	1.92
รู้สึกว่าสิ่งที่คุ้นเคยมาก่อนดูแปลกไป	1.47	1.70	2.03
รวมเฉลี่ย	1.29	1.47	1.94
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวล	0.14 - 1.91		

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวลกับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา กระทรวงสาธารณสุข, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวลของกลุ่มผู้ห้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิตนั้น สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว ของผู้ต้องขังเรือนจำ
กลางคลองไผ่ ($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิต

ด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
รู้สึกโกรธและหงุดหงิดง่าย	1.75	2.06	2.43
มีอาการหลั่งไหลผ่านจนระงับ ไม่ได้	0.75	1.08	2.03
อยากทำร้ายผู้อื่น	0.40	0.25	1.10
อยากทำลายข้าวของ	0.28	0.23	1.18
มีเรื่องโต้แย้งกับคนอื่นบ่อยๆ	0.82	0.70	1.45
อยากตะโกนหรือขว้างปา ข้าวของ	0.47	0.47	1.40
รวมเฉลี่ย	0.75	0.81	1.60
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว 0.14 - 1.39			

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าวกับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา
กระทรวงสาธารณสุข, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว
ของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิตนั้น สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผลของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิต

ด้านความรู้สึกกลัวโดย ไม่มีเหตุผล	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
รู้สึกกลัวที่โล่งแจ้งหรือถนน	0.43	0.63	1.02
รู้สึกกลัวเมื่อออกนอกบ้าน คนเดียว	0.63	0.77	1.37
รู้สึกกลัวการเดินทางโดย รถประจำทางหรือรถไฟ	0.42	2.42	0.70
หลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่าง สถานที่บางแห่ง	1.40	1.42	2.30
รู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในคน กลุ่มมาก	1.57	1.47	2.45
รู้สึกกระวนกระวายเมื่อถูก หอดทิ้งให้อยู่คนเดียว	1.70	1.67	2.28
รู้สึกกลัวจะเป็นลมในที่ สาธารณะ	0.35	0.65	1.25
รวมเฉลี่ย	0.90	1.06	1.63
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผล		0.18 - 1.21	

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผลกับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยาบรมวงศ์ชนานุสรณ์, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผลของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิตนั้น สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกหวัหระแวงของผู้ต้องขังเรือนจำกลาง
คลองไผ่ ($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิต

ด้านความรู้สึกหวัหระแวง	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
รู้สึกว่าคนอื่น ๆ ควรได้รับ คำตำหนิที่ทำให้ท่านลำบาก	1.23	1.18	1.97
รู้สึกไม่ไว้วางใจผู้อื่น	1.53	1.76	2.53
รู้สึกถูกจ้องมองหรือกล่าวถึง	1.03	0.78	1.36
รู้สึกว่าคนอื่นไม่เห็นด้วยและ ไม่ร่วมมือกับท่าน	0.83	0.75	1.33
คนอื่นไม่ให้ความเชื่อถือใน ความสำเร็จของท่าน	1.00	1.00	1.57
รู้สึกว่าคนอื่นจะเอาเปรียบ ถ้าหากท่านยอมเขามา	1.25	1.60	1.88
รวมเฉลี่ย	1.14	1.18	1.77
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านความรู้สึกหวัหระแวง		0.28 - 1.71	

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านความรู้สึกหวัหระแวงกับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา
กระทรวงสาธารณสุข, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตด้านความรู้สึกหวัหระแวงของกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ในเกณฑ์
ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอด
ชีวิตนั้น สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิตของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ($N_1 = N_2 = N_3 = 60$) และเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิต

ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการ ผิดปกติทางจิต	ค่าเฉลี่ย		
	กลุ่ม 10ปี-24ปี	กลุ่ม 25ปี-34ปี	กลุ่ม 35ปี-ตลอดชีวิต
คิดว่าผู้หนึ่งผู้ใดสามารถควบคุม ความคิดของท่าน	0.75	0.82	1.27
ได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน	0.40	0.55	1.73
รู้สึกว่าคนอื่นล่วงรู้ถึงความคิด ในใจของท่าน	0.88	0.75	1.18
มีความคิดที่ไม่ใช่เป็นความคิด ของตัวเอง	0.78	0.73	1.25
รู้สึกว่าแห้วแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คน	1.43	1.55	2.05
ความคิดเรื่องเพศรบกวน ท่านค่อนข้างมาก	1.52	1.58	1.83
มีความคิดว่าท่านควรได้รับ โทษจากบาปที่ท่านก่อขึ้น	2.08	2.37	2.15
รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น กับร่างกายของท่าน	1.13	1.15	1.53
ไม่เคยรู้สึกสนิทสนมกับผู้อื่น	1.03	1.18	2.10
มีความคิดว่าบางสิ่งบางอย่าง ที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับจิตใจ ของท่าน	1.20	1.32	1.37
รวมเฉลี่ย	1.12	1.21	1.65
เกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต 0.03 - 1.28			

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติทางจิตกับเกณฑ์ปกติ (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา ราชธรรมสารธรรมสุข, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิตของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างสูง (normal high) ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิตนั้น สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 10 พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้านของ
ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
(N = 180) และเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน

ลักษณะสุขภาพจิต	พิสัย	ค่าเฉลี่ย	S.D.	พิสัยของเกณฑ์ปกติของ ลักษณะสุขภาพจิต
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งผิดปกติของ ร่างกาย	0.00-3.50	1.30	0.76	0.10 - 1.30
ด้านการย่ำคิดย่ำทำ	0.20-3.30	1.65	0.71	0.61 - 1.81
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งไม่ชอบติดต่อกับ บุคคลอื่น	0.00-3.11	1.24	0.71	0.08 - 1.79
ด้านความซึมเศร้า	0.15-3.39	1.69	0.69	0.42 - 1.43
ด้านความวิตกกังวล	0.11-3.56	1.57	0.75	0.14 - 1.91
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งโกรธแค้น	0.00-3.50	1.05	0.83	0.14 - 1.39
ก้าวร้าว				
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งกลัวโดยไม่มี เหตุผล	0.00-3.29	1.20	0.76	0.18 - 1.21
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งหวาดระแวง	0.00-3.17	1.37	0.79	0.28 - 1.71
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการ ผิดปกติทางจิต	0.00-3.00	1.33	0.71	0.03 - 1.28

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะสุขภาพจิต
แต่ละด้านกับเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าพระยา ราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์วรพินิต, 2520) ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตแต่ละด้านของผู้ต้องขัง
เรือนจำกลางคลองไผ่ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นด้านความซึมเศร้า และด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้
ถึงอาการผิดปกติทางจิต ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ดังจำนวนร้อยละ แสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 จำนวนร้อยละของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดไว้ในกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และกลุ่มต่ำกว่าเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน (N = 180)

ลักษณะสุขภาพจิต	กลุ่มสูงกว่า เกณฑ์ปกติ	กลุ่มที่อยู่ใน เกณฑ์ปกติ	กลุ่มที่ต่ำกว่า เกณฑ์ปกติ
ด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย	46.11	51.11	2.78
ด้านการย่ำคิดย่ำทำ	42.78	48.33	8.89
ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น	23.89	72.22	3.89
ด้านความซึมเศร้า	61.11	34.44	4.45
ด้านความวิตกกังวล	31.11	68.33	0.56
ด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว	27.78	56.11	16.11
ด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผล	46.66	47.78	5.56
ด้านความรู้สึกหวาดระแวง	35.00	51.67	13.33
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต	47.78	43.89	8.33

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 11 เมื่อคิดเป็นจำนวนร้อยละปรากฏว่ารระดับสุขภาพจิตของผู้ต้องขังส่วนมากอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นด้านความซึมเศร้าที่อยู่ในกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 12 พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้านของ
ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี -
24 ปี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีกี้ว จังหวัดนครราชสีมา (N = 60) และเกณฑ์
ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน

ลักษณะสุขภาพจิต	พิสัย	ค่าเฉลี่ย	S.D.	พิสัยของเกณฑ์ปกติของ ลักษณะสุขภาพจิต
ด้านความรู้สึกผิดปกติกของ ร่างกาย	0.00-2.92	1.11	0.71	0.10 - 1.30
ด้านการย่ำคิดย่ำทำ	0.20-3.10	1.43	0.69	0.61 - 1.81
ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับ บุคคลอื่น	0.00-2.56	1.09	0.64	0.08 - 1.79
ด้านความขี้มเสีร่า	0.15-2.62	1.43	0.62	0.42 - 1.43
ด้านความวิตกกังวล	0.33-2.56	1.29	0.55	0.14 - 1.91
ด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว	0.00-2.00	0.74	0.54	1.04 - 1.39
ด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มี เหตุผล	0.00-2.57	0.90	0.58	0.18 - 1.39
ด้านความรู้สึกหวาดระแวง	0.00-3.17	1.15	0.74	0.28 - 1.71
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการ ผิดปกติทางจิต	0.00-2.90	1.12	0.65	0.03 - 1.28

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิต
แต่ละด้านกับเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าพระยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร, 2520). ปรากฏว่า ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่
กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี มีระดับสุขภาพจิตแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ถึงจำนวนร้อยละ แสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 จำนวนร้อยละของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีกี้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดไว้ในกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติและกลุ่มต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน (N = 60)

ลักษณะสุขภาพจิต	กลุ่มสูงกว่า เกณฑ์ปกติ	กลุ่มที่อยู่ใน * เกณฑ์ปกติ	กลุ่มต่ำกว่า เกณฑ์ปกติ
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งผิดปกติของร่างกาย	35.00	60.00	5.00
ด้านการย้ากึกย้าทำ	28.34	58.33	13.33
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น	13.34	83.33	3.33
ด้านความซึมเศร้า	46.66	46.67	6.67
ด้านความวิตกกังวล	11.67	88.33	0.00
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งโกรธแค้น ท้าวร้าว	13.33	65.00	21.67
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งกลัวโดยไม่มีเหตุผล	25.00	73.33	1.67
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งหวาดระแวง	20.00	61.67	18.33
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต	38.33	51.67	10.00

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 13 เมื่อคิดเป็นจำนวนร้อยละปรากฏว่า ระดับสุขภาพจิตของผู้ต้องขังกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี ทุกด้านส่วนมากอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 14 พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้านของ ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 25 ปี - 34 ปี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (N = 60) และ เกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน

ลักษณะสุขภาพจิต	พิสัย	ค่าเฉลี่ย	S.D.	พิสัยของเกณฑ์ปกติของ ลักษณะสุขภาพจิต
ด้านความรู้สึกผิดปกติของ ร่างกาย	0.08-3.50	1.22	0.83	0.10 - 1.30
ด้านการย้ากิดย้าทำ	0.20-2.70	1.57	0.72	0.61 - 1.81
ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับ บุคคลอื่น	0.00-2.56	1.07	0.76	0.08 - 1.79
ด้านความซึมเศร้า	0.15-2.39	1.43	0.59	0.42 - 1.43
ด้านความวิตกกังวล	0.11-3.22	1.48	0.87	0.14 - 1.91
ด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว	0.00-2.83	0.81	0.71	0.14 - 1.39
ด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มี เหตุผล	0.00-3.29	1.06	0.78	0.18 - 1.21
ด้านความรู้สึกหวาดระแวง	0.00-2.83	1.20	0.78	0.28 - 1.71
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการ ผิดปกติทางจิต	0.10-3.00	1.21	0.73	0.03 - 1.28

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้านกับ เกณฑ์ปกติของ ลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยา ราชธรรมสารธรรมสุข, 2520) ปรากฏว่า ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 25 ปี - 34 ปี มีระดับสุขภาพจิตแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งจำนวนร้อยละ แสดงในตารางที่ 15

ตารางที่ 15 จำนวนร้อยละของผู้ต้องขัง เรือนจำกลางคลองไผ่กลุ่มที่มีอายุของการต้องโทษ 25 ปี - 34 ปี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีกี้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดไว้ในกลุ่มที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และกลุ่มต่ำกว่าเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน (N = 60)

ลักษณะสุขภาพจิต	กลุ่มสูงกว่า เกณฑ์ปกติ	กลุ่มที่อยู่ใน เกณฑ์ปกติ	กลุ่มที่ต่ำกว่า เกณฑ์ปกติ
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งผิดปกติของร่างกาย	38.34	58.33	3.33
ด้านการย่ำคิดย้ำทำ	43.33	45.00	11.67
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งผิดปกติต่อบุคคลอื่น	21.67	70.00	8.33
ด้านความซึมเศร้า	46.66	46.67	6.67
ด้านความวิตกกังวล	33.33	65.00	1.67
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งโกรธแค้น ก้าวร้าว	15.00	63.33	21.67
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งกลัวโดยไม่มีเหตุผล	40.00	46.67	13.33
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งหวาดระแวง	26.67	53.33	20.00
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต	40.00	45.00	15.00

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 15 เมื่อคิดเป็นร้อยละ ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิตของผู้ต้องขังกลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 25 ปี - 34 ปี ทุกด้านส่วนมากอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 16 พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้านของ
ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี-
ตลอดชีวิต ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีกี้ว (N = 60) และเกณฑ์ปกติของลักษณะ
สุขภาพจิตแต่ละด้าน

ลักษณะสุขภาพจิต	พิสัย	ค่าเฉลี่ย	S.D.	พิสัยของเกณฑ์ปกติของ ลักษณะสุขภาพจิต
ด้านความรู้สึกผิดปกติของ ร่างกาย	0.33-3.25	1.58	0.67	0.10 - 1.30
ด้านการย่ำคิดย้ำทำ	0.50-3.30	1.96	0.62	0.61 - 1.81
ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับ บุคคลอื่น	0.22-3.11	1.56	0.60	0.08 - 1.79
ด้านความซึมเศร้า	0.69-3.39	2.21	0.55	0.42 - 1.43
ด้านความวิตกกังวล	0.44-3.56	1.94	0.66	0.14 - 1.91
ด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว	0.17-3.50	1.60	0.92	0.14 - 1.39
ด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มี เหตุผล	0.14-3.29	1.63	0.72	0.18 - 1.21
ด้านความรู้สึกหวาดระแวง	0.33-3.17	1.78	0.69	0.28 - 1.71
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการ ผิดปกติทางจิต	0.00-2.80	1.65	0.66	0.03 - 1.28

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 16 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะ
สุขภาพจิตแต่ละด้าน กับเกณฑ์ปกติของลักษณะสุขภาพจิตแต่ละด้าน (แผนกจิตวิทยา โรงพยาบาล
สมเด็จพระยา ราชวรวงศ์เสาวนสุข, 2520) ปรากฏว่า ผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่
กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิต มีระดับสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
ยกเว้น ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น ดังจำนวนร้อยละ แสดงในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 จำนวนร้อยละของผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ กลุ่มที่มีอายุของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิต ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีกี้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดไว้ใน กลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และกลุ่มที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ของลักษณะ สุขภาพจิตแต่ละด้าน (N = 60)

ลักษณะสุขภาพจิต	กลุ่มสูงกว่า เกณฑ์ปกติ	กลุ่มที่อยู่ใน เกณฑ์ปกติ	กลุ่มที่ต่ำกว่า เกณฑ์ปกติ
ด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย	65.00	35.00	0.00
ด้านการย่ำคิดย้ำทำ	56.60	41.67	1.67
ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น	36.67	63.33	0.00
ด้านความซึมเศร้า	90.00	10.00	0.00
ด้านความวิตกกังวล	48.33	51.67	0.00
ด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว	55.00	40.00	5.00
ด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผล	75.00	23.33	1.67
ด้านความรู้สึกหวาดระแวง	58.33	40.00	1.67
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต	63.33	35.00	1.67

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 17 เมื่อคิดเป็นร้อยละ ปรากฏว่าระดับสุขภาพจิต ของผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิต ทุกด้านส่วนมากอยู่ในกลุ่มที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ยกเว้นด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น และด้านความวิตกกังวลที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ F-test ของกลุ่มผู้ต้องขัง
เรือนจำกลางคลองไผ่ ที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี- 24 ปี, 25 ปี- 34 ปี
และ 35 ปี -ตลอดชีวิต จำแนกตามลักษณะสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ

กลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มระยะเวลาของการต้องโทษ						
	10ปี-24ปี		25ปี-34ปี		35ปี-ตลอดชีวิต		F
ลักษณะสุขภาพจิต	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งของร่างกาย	1.11	0.71	1.22	0.83	1.58	0.67	6.81*
ด้านการย่ำคิดย่ำทำ	1.43	0.69	1.57	0.72	1.96	0.62	9.88*
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น	1.09	0.64	1.07	0.76	1.56	0.60	10.39*
ด้านความซึมเศร้า	1.43	0.62	1.43	0.59	2.21	0.55	35.20*
ด้านความวิตกกังวล	1.29	0.55	1.48	0.87	1.94	0.66	13.37*
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งโกรธแค้น ก้าวร้าว	0.74	0.54	0.81	0.71	1.60	0.92	24.67*
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งกลัวโดยไม่มีเหตุผล	0.90	0.58	1.06	0.78	1.63	0.72	17.79*
ด้านความรู้สึกลึกซึ้งหวาดระแวง	1.15	0.74	1.20	0.78	1.78	0.69	12.35*
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต	1.12	0.65	1.21	0.73	1.65	0.66	10.33*

* P < .01

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 18 ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของระดับสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี, 25 ปี - 34 ปี และ 35 ปี-ตลอดชีวิต มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 9 ด้าน ซึ่งแสดงว่าระยะเวลาของการต้องโทษมีผลต่อสุขภาพจิตแต่ละด้านของผู้ต้องขัง เรือนจำกลางคลองไผ่

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ โดยวิธีการของ Scheffé (S-test) ของกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองไผ่ ที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี, 25 ปี - 34 ปี และ 35 ปี - ตลอดชีวิต ($n = 60$)

ลักษณะสุขภาพจิต	$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$	$\bar{X}_1 - \bar{X}_3$	$\bar{X}_2 - \bar{X}_3$	F
ด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย	0.11	0.47 *	0.36	0.38
ด้านการย่ำคิดย่ำทำ	0.14	0.53 *	0.39	0.46
ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น	0.02	0.47	0.49 *	0.48
ด้านความซึมเศร้า	0.00	0.78	0.78	1.26
ด้านความวิตกกังวล	0.19	0.65	0.46	0.69
ด้านความรู้สึกโกรธแค้น ก้าวร้าว	0.07	0.86	0.79	1.38
ด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผล	0.16	0.73	0.57	0.89
ด้านความรู้สึกหวาดระแวง	0.05	0.63	0.58	0.75
ด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต	0.09	0.53 *	0.44	0.49

* $P < .01$

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 19 ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 25 ปี - 34 ปี ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 10 ปี - 24 ปี และ 35 ปี - ตลอดชีวิต นั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะสุขภาพจิตรวม 3 ด้าน คือ ด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย ด้านการย่ำคิดย่ำทำและด้านพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต และสำหรับกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 25 ปี - 34 ปี และ 35 ปี - ตลอดชีวิต นั้น พบความแตกต่างกันเพียงด้านเดียวคือ ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของลักษณะสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาของการต้องโทษ 35 ปี - ตลอดชีวิต สูงกว่าทุกกลุ่ม