

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของผู้ป่วยไคเคน พลาณัสในช่องปากเฉพาะจากกลุ่มที่ถูกคัดเลือกเข้าการศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรอยโรคไคเคน พลาณัสชนิดร่างแหและชนิดฟ่อลีบ-แผลถลอกถือเป็นลักษณะที่พบได้มากที่สุดทั่วโลก ลักษณะทางคลินิกและข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยไคเคน พลาณัสในช่องปากของการศึกษานี้คล้ายกับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เคยได้มีการศึกษามา และเป็นข้อบ่งชี้ที่คล้ายกันในการส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษา

ต่อกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ช่องปาก และจากการศึกษานี้ยังได้ยืนยันชัดเจนว่าผู้ป่วยไคเคน พลาณัสส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยกลางคน นอกจากนี้ความชุกของโรคทางระบบในกลุ่มผู้ป่วยไคเคน พลาณัสในช่องปากของการศึกษานี้ไม่ได้แตกต่างจากที่พบในประชากรทั่วไป⁵⁰⁻⁵² แต่ยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุที่สัมพันธ์กันระหว่างรอยโรคไคเคน พลาณัสในช่องปากกับโรคทางระบบบางอย่างได้

ข้อสรุป

ผู้ป่วยไคเคน พลาณัสในช่องปากมักพบบ่อยในผู้ป่วยเพศหญิงทั้งสองเชื้อชาติ และมักเกิดในผู้ป่วยวัยกลางคน แต่ในชาวโครเอเชียพบผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าผู้ป่วยไทย อาการปวดแสบปวดร้อนเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยไคเคน พลาณัสทั้งสองเชื้อชาติ พบ