

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )      เช่นตำแหน่งของการเกิดรอยโรค

อาการเจ็บปวด อาการระคายเคือง      โรคของระบบและการใช้ยารักษาโรคของผู้ป่วยทั้งสอง

เชื้อชาติ โดยผู้ป่วยโครเอเทียนมีโรคทางระบบและมีการใช้ยารักษาโรคทางระบบมากกว่าผู้ป่วย

ไทย พบลักษณะของการเจริญผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปากจำนวน 3 รายในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม

ในขณะที่ผู้ป่วยไทยมีการเปลี่ยนเป็นมะเร็ง 1 ราย      แม้ว่าผู้ป่วยไทยและโครเอเทียนมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับชนิดของไลเคน      พลาแนสในช่องปากแต่อัตราการเปลี่ยนเป็น

มะเร็งต่ำมาก

#### ข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาผลระยะยาวของการรักษารอยโรคไลเคน พลาแนสในช่องปากในผู้ป่วย

ไทยและผลข้างเคียงของการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทาเฉพาะที่ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

รักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต