

ภาคผนวก

ศัพท์บัญญัติที่ใช้ในคำอธิบาย

actinomorphic	ดอกสมมาตรตามรัศมี
acute	โคนใบหรือปลายใบแหลม
anther	อับเรณู
ascending	ลำต้นเจริญในแนวขึ้นบน
axile pacentation	พลาเซนดารอบแกนร่วม
bilateral symmetry	สมมาตรดอกด้านข้าง
boat shape	ลักษณะคล้ายรูปเรือ
bract	ใบประดับ ใบที่ลดรูปหรือเปลี่ยนรูปไปจนแตกต่างจากใบเดิม
capitate	ช่อดอกรวมกันแน่นเป็นกระจุก
capsule	ผลแห้งแตก
claw	กลีบก้านกลีบ
condensed	อยู่รวมกัน หรืออัดกันแน่น
corymb	ช่อเชิงหลั่น
crystal	ผลึก
cyme	ช่อดอกเป็นกระจุก
decumbent	ลำต้นทอดชูยอด
dorsifixed	อับเรณูติดด้านหลัง
endosperm	ชั้นของเนื้อเยื่อของเมล็ด ซึ่งจะให้หรือเป็นอาหารสำหรับต้นอ่อน
epidermis	เนื้อเยื่อชั้นผิว
falcate	ใบประดับรูปเคียว
flagelliform hair	ขนเป็นเส้นยาว
glandular hair	ขนเป็นต่อม
helicoid	ดอกเกิดบนด้านเดียวกันของแกน
hirsute	มีขนแข็ง
hook	งอเป็นตะขอ
hypodermis	เนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว
lanceolate	รูปใบหอก

linear	ใบรูปแถบ
loculicidal capsule	แตกกลางพู
membranous	ลักษณะเป็นแผ่นบางใส
monodelphous	ลักษณะเกสรเพศผู้มีก้านมาเชื่อมติดกันเป็นมัดหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่อับเรณูยังคงแยกกัน
oblong	รูปขอบขนาน
obtuse	โคนใบมน ป้าน
ovary	รังไข่
ovule	ส่วนที่จะเจริญเป็นเมล็ดหลังจากปฏิสนธิแล้ว
panicle	ช่อแยกแขนง
papillae	ลักษณะเป็นปุ่มเล็ก
peduncle	ก้านดอก
petaloid	มีลักษณะรูปร่างและสีคล้ายกลีบดอกชั้นใน
prickle hair	ขนเป็นหนาม
reticulate	ผิวเป็นตาข่าย
rugose	มีรอยย่น ขรุขระ
sepaloid	กลีบดอกชั้นนอกมีลักษณะคล้ายกัน
spathe	กาบรองช่อดอก
stoma	ปากใบ
stolon	ไหล
stigma	ยอดเกสรเพศเมีย
style	ก้านชูยอดเกสรเพศเมีย
subscandent	กิ่งरोเลื้อย
subsessile axillary panicle	กลีบดอก ติดอยู่กับฐานแบบแผ่กระจาย
tuber-like	รากหนากคล้ายหัว
succulent	อวบน้ำ

ศัพท์บัญญัติที่ใช้ในคำอธิบาย (ต่อ)

superior ovary	รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ
trichome	ขน
unbranched hair	ขนเป็นเส้นเดี่ยวไม่แตกแขนง
unique leaf venation	การเรียงของเส้นใบมีลักษณะเฉพาะตัว
water storage tissue	เนื้อเยื่อสะสมน้ำ
zygomorphic	ดอกสมมาตรแบบด้านข้าง