

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์การศึกษา	7
คำถามการศึกษา	7
ขอบเขตและวิธีดำเนินการศึกษา	8
นิยามศัพท์	8
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
โรคซึมเศร้า	11
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา	22
แนวปฏิบัติทางคลินิก	30
สถานการณ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา	
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขียงของ อำเภอยะรังของ จังหวัดเขียงราย	38
กรอบแนวคิดในการศึกษา	40
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	42
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	43
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	46
การพิทักษ์สิทธิของประชากรตัวอย่าง	47
ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล	48

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การวิเคราะห์ข้อมูล	54
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล	
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	55
การอภิปรายผล	64
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการศึกษา	70
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้	71
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	71
เอกสารอ้างอิง	73
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก เอกสารรับรองโครงการวิจัย	83
ภาคผนวก ข การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	84
ภาคผนวก ค ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล	90
ภาคผนวก ง ตัวอย่างแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือ ในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า	94
ภาคผนวก จ กระบวนการความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ารายบุคคล ก่อนและหลังใช้แนวปฏิบัติ ทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า	97
ประวัติผู้เขียน	98

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน	56
2 จำนวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสุขภาพผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับ ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา จำแนกตาม เพศ ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง	58
3 ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า ก่อนและ หลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา	59
4 การมาตรวจตามนัดของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า ก่อนและหลังการใช้แนว ปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา	60
5 การกลับมารักษาซ้ำด้วยอาการกำเริบจากการขาดยาของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรค ซึมเศร่าก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือใน การรักษาด้วยยา	61
6 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับการ ดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา	62
7 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา	63