

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 การสะสมน้ำหนักแห้ง (กรัมต่อตารางเมตร) ของถั่วลิสง 3 พันธุ์ ใน 4 ช่วงวันปลูก และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับช่วงวันปลูก

กรรมวิธี	จำนวนวันหลังจากงอก						
	28 วัน	42 วัน	56 วัน	70 วัน	84 วัน	98 วัน	
ช่วงวันปลูก							
ฤดูร้อน (15 มีค.)	69.4 b	233.9b	358.6b	494.9b	676.0a	671.2b	
ต้นฤดูฝน (24 พค.)	163.4a	440.2a	622.5a	664.9a	627.8a	568.4c	
ปลายฤดูฝน (29 สค.)	74.4 b	131.2c	215.3d	246.4d	282.9c	286.3d	
ฤดูหนาว (20 ธค.)	59.6b	138.3c	262.7c	437.2c	521.6b	783.1a	
F-test	**	**	**	**	**	**	
พันธุ์							
สข.38	101.1	234.6	356.2	440.1b	524.0ab	544.8b	
ไทนาน 9	88.4	247.7	365.1	457.6b	481.2b	544.6b	
ขอนแก่น 60-3	85.6	225.4	373.0	500.4a	575.9a	642.4a	
F-test	ns	ns	ns	**	*	**	
ช่วงวันปลูก x พันธุ์							
ฤดูร้อน	สข.38	71.3	243.0	347.9	468.2cde	721.5	647.6b
	ไทนาน 9	71.9	245.5	355.6	510.3cd	648.7	688.8ab
	ขก. 60-3	64.9	213.1	372.3	506.1cde	657.8	677.3ab
ต้นฤดูฝน	สข.38	191.3	416.5	593.5	556.3c	545.2	471.5c
	ไทนาน 9	145.7	476.7	635.1	664.5b	563.4	467.2c
	ขก. 60-3	152.9	427.4	638.9	773.8a	774.7	766.5ab
ปลายฤดูฝน	สข.38	77.7	134.1	210.2	224.9f	291.0	274.1d
	ไทนาน 9	74.2	136.6	208.4	239.6f	263.4	250.6d
	ขก. 60-3	71.2	122.5	227.3	274.9f	294.4	334.1d
ฤดูหนาว	สข.38	64.1	144.6	273.3	448.8de	538.5	785.8a
	ไทนาน 9	61.6	131.8	261.3	416.1e	449.5	771.6a
	ขก.60-3	53.2	138.6	253.6	446.8de	576.9	791.8a
F-test	ns	ns	ns	*	ns	**	
% CV	22.6	20.5	13.5	12.3	16.4	13.1	

1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กำกับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่แตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99% โดยวิธี Duncan's multiple range test

*, ** แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แล 99 % ตามลำดับ

ตารางผนวกที่ 2 อัตราการเจริญเติบโต (crop growth rate) ของถั่วลิสง 3 พันธุ์ ใน 4 ช่วงวันปลูก และแต่ละพันธุ์ใน 4 ช่วงวันปลูก หน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน

กรรมวิธี	จำนวนวันหลังงอก					
	28-42	42-56	56-70	70-84	84-98	
ช่วงวันปลูก						
ฤดูร้อน (15 มี.ค.)	11.75	8.91	9.08	11.35	1.72	
ต้นฤดูฝน (24 พค.)	19.78	13.02	3.03	-2.65	-4.24	
ปลายฤดูฝน (29 สค.)	4.05	6.01	2.23	2.61	0.24	
ฤดูหนาว (20 ธค.)	5.25	8.89	12.46	6.03	26.14	
พันธุ์						
1. สข.38	9.44	8.69	4.74	7.11	3.60	
2. ไทนาน 9	11.30	8.39	6.42	0.81	7.70	
3. ขอนแก่น 60-3	9.89	10.54	8.94	5.09	6.59	
ช่วงวันปลูก x พันธุ์						
ฤดูร้อน	สข.38	12.27	7.49	8.02	18.10	-3.85
	ไทนาน 9	12.40	7.86	10.31	6.37	6.38
	ขก. 60-3	10.58	11.38	8.92	9.59	2.63
ต้นฤดูฝน	สข.38	16.09	12.64	-2.66	-0.79	-5.26
	ไทนาน 9	23.64	11.32	2.10	-7.22	-6.87
	ขก. 60-3	19.61	15.11	9.64	0.07	-0.59
ปลายฤดูฝน	สข.38	4.03	5.43	1.05	4.73	-1.21
	ไทนาน 9	4.46	5.13	2.23	1.70	-0.91
	ขก. 60-3	3.67	7.48	3.40	1.39	2.84
ฤดูหนาว	สข.38	5.37	9.19	12.54	6.40	24.74
	ไทนาน 9	4.68	9.25	11.06	2.39	32.21
	ขก.60-3	5.70	8.21	13.80	9.30	21.48

หมายเหตุ ใช้ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ำคำนวณค่าอัตราการเจริญเติบโตตามสูตร

ตารางผนวกที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ (relative growth rate) ของถั่วลิสง 3 พันธุ์ ใน 4 ช่วงวันปลูก และแต่ละพันธุ์ใน 4 ช่วงวันปลูก หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกรัมต่อวัน

กรรมวิธี		จำนวนวันหลังออก				
		28-42	42-56	56-70	70-84	84-98
ช่วงวันปลูก						
ฤดูร้อน (15 มีค.)		86.72	30.66	21.45	19.74	2.79
ต้นฤดูฝน (24 พค.)		71.22	24.84	4.10	-4.38	-8.17
ปลายฤดูฝน (29 สค.)		40.47	35.45	9.45	10.03	0.41
ฤดูหนาว (20 ธค.)		56.28	45.83	36.37	12.26	41.16
พันธุ์						
1. สข.38		59.11	32.11	13.85	15.23	4.40
2. ไทนาน 9		66.68	31.51	17.62	3.00	11.76
3. ขอนแก่น 60-3		65.23	38.97	22.05	10.01	10.98
ช่วงวันปลูก x พันธุ์						
ฤดูร้อน	สข.38	87.64	25.64	19.79	30.89	-5.55
	ไทนาน 9	87.69	26.46	24.08	11.51	9.92
	ขก. 60-3	84.84	39.87	20.47	16.81	4.00
ต้นฤดูฝน	สข.38	55.59	25.29	-4.63	-1.44	-10.37
	ไทนาน 9	84.65	20.50	3.23	-11.76	-13.37
	ขก. 60-3	73.43	28.72	13.68	0.09	-0.76
ปลายฤดูฝน	สข.38	38.98	32.07	4.81	18.44	-4.28
	ไทนาน 9	43.67	30.17	9.95	6.76	-3.55
	ขก. 60-3	38.77	44.13	13.59	4.89	9.04
ฤดูหนาว	สข.38	54.23	45.46	35.44	13.01	37.80
	ไทนาน 9	50.73	48.89	33.22	5.51	54.03
	ขก.60-3	63.88	43.15	40.46	18.27	31.65

หมายเหตุ ใช้ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ำคำนวณค่าอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ตามสูตร

ตารางผนวกที่ 4 ดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) ของถั่วลิสง 3 พันธุ์ ใน 4 ช่วงวันปลูกและปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับช่วงวันปลูก

กรรมวิธี		จำนวนวันหลังจากออก					
		28 วัน	42 วัน	56 วัน	70 วัน	84 วัน	98 วัน
ช่วงวันปลูก							
ฤดูร้อน (15 มีค.)		0.69b	2.35b	3.04b	3.30a	4.53a	3.76b
ต้นฤดูฝน (24 พค.)		2.38a	3.82a	4.65a	3.17a	2.13b	1.49c
ปลายฤดูฝน (29 สค.)		0.76b	0.97d	1.22d	1.18b	1.41c	0.96d
ฤดูหนาว (20 ธค.)		0.73b	1.60c	2.31c	2.97a	4.52a	4.96a
F-test		**	**	**	**	**	**
พันธุ์							
สข.38		1.30	2.28	2.75 ab	2.48 b	3.15 ab	2.42 b
ไทนาน 9		1.13	2.30	2.99 a	2.93 a	3.34 a	3.06 a
ขอนแก่น 60-3		0.99	1.97	2.66 b	2.56 b	2.95 b	2.91 a
F-test		ns	ns	*	**	*	**
ช่วงวันปลูก x พันธุ์							
ฤดูร้อน	สข.38	0.72	2.56	2.87	3.12	4.65 bc	3.00cd
	ไทนาน 9	0.68	2.46	3.26	3.91	5.34 a	4.55ab
	ขก. 60-3	0.66	2.04	2.98	2.88	3.59 d	3.72 bc
ต้นฤดูฝน	สข.38	2.89	3.85	4.68	2.98	2.26 ef	0.98 e
	ไทนาน 9	2.29	4.08	5.05	3.56	1.71 fg	1.28 e
	ขก. 60-3	1.95	3.54	4.21	2.96	2.43 e	2.22 d
ปลายฤดูฝน	สข.38	0.78	1.03	1.26	1.03	1.37 g	0.86 e
	ไทนาน 9	0.80	1.10	1.19	1.23	1.31 g	0.92 e
	ขก. 60-3	0.70	0.78	1.20	1.29	1.54 g	1.10 e
ฤดูหนาว	สข.38	0.80	1.69	2.20	2.78	4.32 c	4.82 a
	ไทนาน 9	0.75	1.57	2.47	3.03	5.01 ab	5.49 a
	ขก.60-3	0.64	1.53	2.26	3.09	4.25 c	4.58 ab
F-test		ns	ns	ns	ns	**	*
% CV		29.64	19.96	12.96	15.30	13.78	22.65

1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กำกับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่แตกต่างทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี Duncan's multiple range test

*, ** แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แล 99 % ตามลำดับ

ตารางผนวกที่ 5 อัตราการสะสมน้ำหนักแห้งสุทธิต่อหน่วยพื้นที่ใบ (net assimilation rate) ของถั่วลิสง 3 พันธุ์ ใน 4 ช่วงวันปลูก และแต่ละพันธุ์ใน 4 ช่วงวันปลูก หน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน

กรรมวิธี		จำนวนวันหลังออก				
		28-42	42-56	56-70	70-84	84-98
ช่วงวันปลูก						
ฤดูร้อน (15 มีค.)		8.69	3.37	2.87	3.03	0.33
ต้นฤดูฝน (24 พค.)		6.60	3.12	0.73	-1.33	-
ปลายฤดูฝน (29 สค.)		1.89	2.25	0.73	0.84	0.03
ฤดูหนาว (20 ธค.)		4.77	4.60	4.76	1.67	5.48
พันธุ์						
1. สข.38		4.89	3.10	1.87	1.94	0.99
2. ไทนาน 9		5.67	2.93	2.02	-0.28	1.78
3. ขอนแก่น 60-3		5.89	3.99	2.93	1.49	1.62
ช่วงวันปลูก x พันธุ์						
ฤดูร้อน	สข.38	8.46	2.77	2.68	4.72	-1.02
	ไทนาน 9	8.96	2.77	2.89	1.39	1.29
	ขก. 60-3	8.65	4.59	3.05	2.98	0.72
ต้นฤดูฝน	สข.38	4.81	2.97	-0.62	-0.39	-
	ไทนาน 9	7.63	2.49	0.43	-3.65	-
	ขก. 60-3	7.36	3.91	2.38	0.03	-
ปลายฤดูฝน	สข.38	1.79	1.90	0.37	1.59	-0.44
	ไทนาน 9	1.89	1.79	0.74	0.54	-0.33
	ขก. 60-3	1.98	3.06	1.09	0.39	0.87
ฤดูหนาว	สข.38	4.51	4.75	5.06	1.83	5.42
	ไทนาน 9	4.22	4.66	4.03	0.61	6.14
	ขก.60-3	5.58	4.39	5.20	2.56	4.87

หมายเหตุ ใช้ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ำคำนวณค่าอัตราการสะสมน้ำหนักแห้งเติบโตสุทธิต่อหน่วยพื้นที่ใบตามสูตร

ตารางผนวกที่ 6 เปอร์เซนต์การรับแสง (% light interception) ของถั่วลิสง 3 พันธุ์ ใน 4 ช่วงวันปลูก และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับช่วงวันปลูก

กรรมวิธี	จำนวนวันหลังจากงอก					
	28 วัน	42 วัน	56 วัน	70 วัน	84 วัน	
ช่วงวันปลูก						
ฤดูร้อน (15 มีค.)	24.59a	25.57c	62.73 c	71.45 b	90.03a	
ต้นฤดูฝน (24 พค.)	32.12a	88.43a	93.69a	75.33b	56.98b	
ปลายฤดูฝน (29 สค.)	7.62b	17.36d	45.35d	41.41c	33.44c	
ฤดูหนาว (20 ธค.)	14.29b	62.09b	85.53b	85.34a	87.04a	
F-test	**	**	**	**	**	
พันธุ์						
สข.38	24.51	52.11a	74.43	66.60	65.20	
ไทนาน 9	16.51	42.96b	68.27	69.67	64.76	
ขอนแก่น 60-3	17.94	50.01a	72.77	68.87	70.66	
F-test	ns	*	ns	ns	ns	
ช่วงวันปลูก x พันธุ์						
ฤดูร้อน	สข.38	28.32	31.97	65.73	68.97	91.36a
	ไทนาน 9	21.27	22.16	58.39	82.55	93.55a
	ขก. 60-3	24.18	22.58	64.06	62.82	85.16a
ต้นฤดูฝน	สข.38	36.47	89.59	95.27	76.91	58.54a
	ไทนาน 9	29.27	88.48	92.13	72.37	52.60bc
	ขก. 60-3	30.62	87.21	93.66	76.73	59.70b
ปลายฤดูฝน	สข.38	9.70	19.32	51.26	38.03	28.39d
	ไทนาน 9	5.98	12.57	41.57	42.74	27.17d
	ขก. 60-3	7.18	20.18	43.22	43.45	44.76c
ฤดูหนาว	สข.38	23.56	67.56	85.46	82.49	82.49a
	ไทนาน 9	9.53	48.65	80.98	81.03	85.71a
	ขก.60-3	9.79	70.14	90.14	92.50	92.91a
F-test	ns	ns	ns	ns	*	
% CV	53.63	18.42	11.01	11.86	10.19	

1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กำกับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT)

*, ** แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ 99 % ตามลำดับ

ตารางผนวกที่ 7 ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส) พลังงานแสง (แคลอรีต่อตารางเซนติเมตรต่อวัน) ในช่วง
วันปลูกฤดูร้อน เฉลี่ยจากทุก 7 วัน

จำนวนวัน หลังจากปลูก	ปริมาณน้ำฝน	อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิต่ำสุด	อุณหภูมิเฉลี่ย	ความเข้มแสง
7	0.0	36.1	23.8	30.0	285.9
14	0.4	34.1	23.7	28.9	263.4
21	4.9	36.8	26.5	32.5	273.2
28	0.0	34.3	23.8	29.1	293.7
35	0.0	39.1	26.0	32.6	274.6
42	8.1	37.0	26.0	31.5	295.9
49	0.3	38.6	25.1	31.8	273.5
56	0.0	34.4	25.6	30.0	249.1
63	6.2	32.6	24.9	28.8	214.9
70	2.8	36.1	25.4	30.9	314.4
77	8.2	36.1	25.4	30.8	265.1
84	4.5	34.3	25.2	29.7	247.7
91	13.7	32.8	25.3	29.1	224.5
98	6.6	33.1	24.5	28.8	265.9
105	3.2	34.7	25.3	30.0	277.7
112	6.2	32.7	24.7	28.7	204.4
119	18.1	31.1	23.5	27.3	230.7
126	0.7	32.0	25.2	28.6	240.5
133	15.8	31.4	24.1	27.7	281.8

ตารางผนวกที่ 8 ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส) พลังงานแสง (แคลอรีต่อตารางเซนติเมตรต่อวัน) ในช่วง
วันปลูกต้นฤดูฝน เฉลี่ยจากทุก 7 วัน

จำนวนวันหลังจาก ปลูก	ปริมาณน้ำฝน	อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิต่ำสุด	อุณหภูมิเฉลี่ย	ความเข้มแสง
7	8.2	36.1	25.4	30.8	265.1
14	4.5	34.3	25.2	29.7	247.7
21	13.7	32.8	25.3	29.1	224.5
28	6.6	33.1	24.5	28.8	265.9
35	3.2	34.7	25.3	30.0	277.7
42	6.2	32.7	24.7	28.7	204.4
49	18.1	31.1	23.5	27.3	230.7
56	0.7	32.0	25.2	28.6	240.5
63	15.8	31.4	24.1	27.7	281.8
70	1.2	31.0	24.3	27.7	225.5
77	20.6	32.8	23.9	28.4	231.6
84	13.1	30.0	23.1	26.6	201.1
91	10.3	31.6	24.2	27.9	272.1
98	0.7	32.1	24.9	28.5	243.3
105	11.5	30.2	24.2	27.2	201.3
112	20.1	31.4	24.3	27.9	250.2
119	2.8	31.2	24.3	28.3	268.8
126	0.0	30.9	23.6	27.3	277.5

ตารางผนวกที่ 9 ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส) พลังงานแสง (แคลอรีต่อตารางเซนติเมตรต่อวัน) ในช่วง
วันปลูกปลายฤดูฝน เฉลี่ยจากทุก 7 วัน

จำนวนวัน หลังจากปลูก	ปริมาณน้ำฝน	อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิต่ำสุด	อุณหภูมิเฉลี่ย	พลังงานแสง
7	11.5	30.2	24.2	27.2	201.3
14	20.1	31.4	24.3	27.9	250.2
21	2.8	31.2	24.3	28.3	268.8
28	0.0	30.9	23.6	27.3	277.5
35	9.8	32.2	24.0	28.1	273.3
42	6.5	30.1	23.4	26.7	207.0
49	8.9	31.1	23.5	27.3	208.6
56	0.0	31.3	22.3	26.8	284.4
63	0.3	30.2	21.6	25.9	233.1
70	1.0	29.6	19.6	24.6	235.5
77	0.3	30.8	21.1	26.0	253.5
84	0.0	29.5	18.2	23.9	263.1
91	0.0	31.7	18.2	25.0	270.5
98	0.0	31.5	17.9	24.7	258.0
105	0.0	27.1	14.2	20.7	265.3
112	0.0	31.4	19.1	25.3	220.1
119	0.0	28.8	15.4	22.1	253.3

ตารางผนวกที่ 10 ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) พลังงานแสง (แคลอรีต่อตารางเซนติเมตรต่อวัน) ในช่วงวันปลูกฤดูหนาว เฉลี่ยจากทุก 7 วัน

จำนวนวัน หลังจากปลูก	ปริมาณน้ำฝน	อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิต่ำสุด	อุณหภูมิเฉลี่ย	พลังงานแสง
7	0.0	28.8	15.4	22.1	253.3
14	0.0	24.3	11.4	17.9	279.9
21	0.0	28.7	14.0	21.4	258.3
28	0.0	31.5	18.6	25.1	225.1
35	0.0	33.1	20.0	26.6	223.1
42	0.0	31.8	18.2	25.0	264.9
49	0.0	28.4	15.6	22.0	289.4
56	0.0	29.7	15.2	22.5	290.1
63	0.4	33.7	20.4	27.1	198.9
70	0.0	27.7	16.0	21.9	300.4
77	0.0	31.8	19.1	25.4	276.5
84	2.4	35.0	21.9	28.4	227.5
91	0.0	36.1	23.0	29.6	297.3
98	1.7	38.4	24.3	31.3	290.1
105	5.0	34.7	23.9	29.3	292.1
112	1.1	32.8	23.2	28.0	256.1
119	1.5	35.4	24.7	30.1	267.7
126	0.0	32.8	23.8	28.3	261.4
133	15.1	33.4	23.8	28.6	247.6
140	1.6	32.7	24.6	28.6	280.0

ตารางผนวกที่ 11 น้ำหนักผักของถั่วลันเตา 3 พันธุ์ ใน 4 วันปลูก และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ และช่วงวันปลูก

กรรมวิธี		จำนวนวันหลังออก					
		42 วัน	56 วัน	70 วัน	84 วัน	98 วัน	112 วัน
ช่วงวันปลูก							
ฤดูร้อน (15 มีค.)		0	0	74.61b	144.87a	244.08a	-
ต้นฤดูฝน (24 พค.)		23.09	78.41	124.99a	124.38ab	186.89b	-
ปลายฤดูฝน (29 สค.)		4.43	31.94	62.85b	76.60c	93.98c	-
ฤดูหนาว (20 ธค.)		0	12.80	68.99b	114.55b	273.31a	-
F-test				**	**	**	
พันธุ์							
สข.38		8.33	32.85	96.20	136.06a	208.13	-
ไทนาน 9		8.40	33.78	78.94	98.76b	200.71	-
ขอนแก่น 60-3		3.92	25.73	77.32	110.47b	189.85	-
F-test				**	**	ns	
ช่วงวันปลูก x พันธุ์							
ฤดูร้อน	สข.38	0	0	92.47cd	182.05a	239.15	-
	ไทนาน 9	0	0	67.55d	103.43cd	256.03	-
	ขก. 60-3	0	0	79.30bcd	149.13abc	237.05	296.40
ต้นฤดูฝน	สข.38	28.83	78.96	109.70abc	112.03bcd	169.49	-
	ไทนาน 9	28.11	85.82	122.37a	103.22cd	194.73	-
	ขก. 60-3	12.34	70.44	142.91a	157.88ab	196.46	-
ปลายฤดูฝน	สข.38	4.50	31.55	68.20d	85.83d	90.98	-
	ไทนาน 9	5.48	31.80	57.10de	75.68d	79.53	-
	ขก. 60-3	3.33	32.48	63.25d	68.30d	111.45	-
ฤดูหนาว	สข.38	0	20.88	114.44ab	164.35a	332.93	-
	ไทนาน 9	0	17.51	68.73d	112.74bcd	272.56	354.79
	ขก.60-3	0	0	23.81e	66.57d	214.46	252.70
F-test				**	**	**	
% CV				31.05	25.13	21.81	

1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่กำกับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่แตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT)

*, ** แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แล 99 % ตามลำดับ

ตารางผนวกที่ 12 อุณหภูมิสะสมของถั่วลิสงในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต ตั้งแต่ปลูก-วันงอก, อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ปลูก-วันออกดอก, อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ปลูก-วันเก็บเกี่ยว ของถั่วลิสงทั้ง 3 พันธุ์ ที่ปลูกในแต่ละช่วงวันปลูก หน่วยเป็นองศาวัน

ช่วงวันปลูก	พันธุ์	อุณหภูมิสะสม ตั้งแต่ปลูก- วันงอก	อุณหภูมิสะสม ตั้งแต่ปลูก- วันออกดอก	อุณหภูมิสะสม ตั้งแต่ปลูก- วันเก็บเกี่ยว
ฤดูร้อน	สข.38	121.9	601.0	2144.5
(15 มี.ค.)	ไทนาน 9	121.9	647.5	2161.7
	ขก 60-3	121.9	714.7	2306.9
ต้นฤดูฝน	สข. 38	126.5	530.4	1830.1
(24 พ.ค.)	ไทนาน 9	126.5	530.4	1849.2
	ขก 60-3	126.5	548.4	2042.2
ปลายฤดูฝน	สข.38	102.6	456.7	1576.0
(29 ส.ค.)	ไทนาน 9	102.6	456.7	1589.4
	ขก 60-3	102.6	490.8	1710.1
ฤดูหนาว	สข.38	114.4	507.3	1799.8
(20 ธ.ค.)	ไทนาน 9	114.4	520.6	1865.9
	ขก 60-3	114.4	582.4	2106.6