

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์	บุหงามงคล	รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำพน	นวลโคกสูง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นายแพทย์วิวัฒน์ชัย	สุแสงรัตน์	นายแพทย์ 9 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
4. แพทย์หญิงจรรยาภรณ์	อุ้นชัย	นายแพทย์ 7 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
5. นางสาวเขาวลักษณ์	หาญวชิรพงศ์	พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
6. นางสาวประภัสศรี	ชาวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
7. นางสาวนัยนา	นักรบไทย	พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ภาคผนวก ข.
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

[] []

แบบสอบถามสำหรับงานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น

คำชี้แจงทั่วไปในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ตอนคือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการได้รับข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

2.1 ประเภทของแหล่งข้อมูลข่าวสาร

2.2 ความถี่ของการติดตามข้อมูลข่าวสาร

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ

3.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์

3.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์

3.3 การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

3.4 การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

3.5 การปฏิบัติด้านสุขภาพทั่วไป

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์

ตอนที่ 5 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

ตอนที่ 6 แบบสอบถามการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่อง () หน้าข้อความที่กำหนดตามความเป็นจริง

1. ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน..... [] []
2. ปัจจุบันท่านอายุ.....ปี [] []
3. สถานภาพสมรสของท่าน []
 - () โสด
 - () คู่
 - () อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ.....ปี [] []
5. ท่านเคยได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ติดเชื้อเอดส์หรือไม่ []
 - () เคย
 - () ไม่เคย
6. ดึกที่ท่านปฏิบัติงานเคยมีผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ติดเชื้อเอดส์มารับบริการ หรือไม่ []
 - () มี
 - () ไม่มี
 - () ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
7. ท่านเคยได้รับการอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา เกี่ยวกับโรคเอดส์ หรือไม่ []
 - () เคย
 - () ไม่เคย
8. ท่านเคยศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข หรือไม่ []
 - () เคย
 - () ไม่เคย

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งของข่าวสารที่ท่านรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหลังข้อความที่ตรงกับความจริงของท่าน

* ได้รับน้อย หมายถึง ได้รับข่าวสารน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง

* ได้รับปานกลาง หมายถึง ได้รับข่าวสารทุกสัปดาห์

* ได้รับบ่อย หมายถึง ได้รับข่าวสารทุกวัน

ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาตอบทุกข้อ)

แหล่งของข่าวสาร	ไม่ได้ รับเลย	ได้รับ น้อย	ได้รับ ปานกลาง	ได้รับ บ่อย	สำหรับผู้วิจัย
1. โทรทัศน์					[]
2. วิทยุ					[]
3. หนังสือพิมพ์					[]
4. วารสาร/สิ่งตีพิมพ์					[]
5. ตำราทางวิชาการ					[]
6. จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา					[]
7. อื่น ๆ (ระบุ).....					[]

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติด้านสุขภาพทั่วไป เนื่องจากเป็นเรื่องความรู้สึกหรือความคิดเห็นจึงไม่มีข้อถูกหรือผิด
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างหลังข้อความที่ตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่าน

หมายเหตุ UP = Universal Precaution หมายถึง การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
3.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์						
1. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ ทำให้ท่าน มีโอกาสสัมผัสเลือดและสารน้ำในร่างกาย ผู้ป่วยได้สูง						[]
2. มีความเป็นไปได้สูงที่เลือดและสารน้ำจาก ร่างกายผู้ป่วยจะมีเชื้อเอดส์						[]
3. โอกาสที่จะติดเชื้อเอดส์มีอยู่ทุกขณะที่ ปฏิบัติงาน						[]
4. ท่านมีโอกาสมากต่อการติดเชื้อเอดส์						[]
3.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์						
5. ชีวิตครอบครัวของท่านจะเดือดร้อนหาก ท่านติดเชื้อเอดส์						[]
6. โรคเอดส์เป็นโรคที่สิ้นหวังในการรักษา						[]
7. การติดเชื้อเอดส์ไม่เป็นอุปสรรคต่อ การประกอบอาชีพของท่าน*						[]

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
8. หากท่านติดเชื้อเอดส์จะมีผลต่อฐานะด้าน การเงินของท่าน						[]
9. การติดเชื้อเอดส์จะต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน						[]
10. การติดเชื้อเอดส์จะทำให้ท่านทุกข์หนักกว่า การเป็นโรคอื่น ๆ						[]
11. ท่านต้องสูญเสียอนาคตที่ดี หากติดเชื้อ เอดส์						[]
3.3 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันการติด เชื้อแบบครอบคลุม						
12. การปฏิบัติตามหลัก UP จะป้องกันปัญหา การติดเชื้อเอดส์จากการปฏิบัติงานได้เป็น อย่างดี						[]
13. ท่านได้ประโยชน์น้อยจากการปฏิบัติตาม หลัก UP*						[]
14. การปฏิบัติตามหลัก UP ช่วยลดความ ขัดแย้งกับผู้ป่วยและญาติ						[]
15. การปฏิบัติตามหลัก UP ช่วยให้ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ของท่าน						[]
16. การปฏิบัติตามหลัก UP. ทำให้ท่านไม่ กังวลเรื่องการติดเชื้อเอดส์						[]

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
3.4 การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล						
17. ท่านรู้สึกไม่สะดวกหากจะต้องปฏิบัติตามหลัก UP						[]
18. การปฏิบัติตามหลัก UP ทำให้ท่านทำงานไม่ถนัด						[]
19. การปฏิบัติตามหลัก UP ทำให้ท่านเสียเวลา						[]
20. ท่านไม่รู้สึกอาย เมื่อต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง*						[]
21. การปฏิบัติตามหลัก UP ทำให้งานเสร็จช้า						[]
22. การปฏิบัติตามหลัก UP เป็นการฝึกนิสัยใหม่ซึ่งทำได้ยาก						[]
23. ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามหลัก UP ได้						[]
3.5 การปฏิบัติด้านสุขภาพทั่วไป						
24. ท่านรับประทานอาหารไม่ครบหมู่ และไม่ถูกส่วนเสมอ*						[]
25. ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องสุขภาพ เพราะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ						[]
26. ท่านมักจะทำในสิ่งที่จะช่วยให้สุขภาพดี						[]
27. ท่านติดตาม/ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ						[]

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
28. ท่านไม่เคยไปตรวจสุขภาพฟันนอกเหนือจากการไปตรวจเมื่อมีปัญหาเรื่องฟัน*						[]
29. ท่านไม่เคยไปตรวจสุขภาพประจำปีนอกเหนือจากการไปตรวจเมื่อเจ็บป่วย*						[]
30. ท่านออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง						[]

* ข้อความเชิงลบ

ตอนที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลในหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติ โปรดกาเครื่องหมาย (/) ในช่องว่างท้ายข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดย

* มีเพียงพอ หมายถึง มีพร้อมเสมอเมื่อท่านต้องการใช้

* มีไม่เพียงพอ หมายถึง มีอุปกรณ์แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่พร้อมเมื่อจะใช้งาน

* ไม่มี หมายถึง วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่มีเลย หรือมีแต่ใช้การไม่ได้เลย

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล	มีเพียงพอ	มีไม่เพียงพอ	ไม่มี	สำหรับผู้วิจัย
1. เข็มฉีดยา เข็มเจาะเลือดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง				[]
2. ถุงมือ				[]
3. เลือคลุม				[]
4. ผ้าปิดปาก ปิดจมูก				[]
5. ผ้าขี้ริ้วกันเปื้อน				[]
6. ถุงใส่ขยะติดเชื้อ				[]
7. ภาชนะที่เข็มแทงไม่ทะลุ สำหรับใส่เข็มที่ใช้แล้ว				[]
8. แวนดา				[]
9. รองเท้าบูท				[]
10. อ่างล้างมือ				[]
11. สบู่ ผ้าเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง				[]
12. ผ้ายาง ผ้าพลาสติกปูเตียงนอน เปล				[]
13. น้ำยาทำลายเชื้อ เช่น โลโซล 2% ไฮเตอร์ไฮโปคลอไรต์ 0.5%				[]

ตอนที่ 5 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบคลุม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ใน () หน้าข้อความที่ถูกต้อง

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ	สำหรับผู้วิจัย
1. การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบคลุมหมายถึง				
1.1 การตั้งสมมติฐานว่าผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาล ทุกคนมีเชื้อโรคที่อาจติดต่อได้ทางเลือดและสารน้ำ จากร่างกาย				[]
1.2 การป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขจากการติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางเลือด และ สารน้ำจากร่างกาย โดยไม่ต้องมีการตรวจเลือดผู้มารับ บริการก่อนว่าติดเชื้อหรือไม่				[]
2. หลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบคลุมที่สำคัญคือ				
2.1 การป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้บริการ				[]
2.2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม				[]
2.3 การรักษาสุขภาพอนามัยของบุคลากรและผู้ให้บริการ				[]
2.4 การจัดสุขาภิบาลที่ดี				[]
2.5 การแยกผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากผู้ป่วยอื่น ๆ*				[]
3. เชื้อไวรัสเอดส์พบจำนวนมากในเลือด น้ำเหลือง น้ำอสุจิ				[]
4. การส่งของมีคมให้ปลอดภัย ให้ส่งให้ผู้รับมือต่อมือ*				[]
5. การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มตำให้รีบเค้นเลือดออกให้ มากที่สุดแล้วชำระบาดแผลด้วยน้ำและสบู่				[]
6. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใช้ในทุกกิจกรรม*				[]
7. ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง				[]
8. การล้างมือหลังดูดเสมหะผู้ป่วยใช้สบู่เหลวฆ่าเชื้อและน้ำ ที่ไหลจากก๊อก ฟอกมือให้ทั่วอย่างน้อย 30 วินาที				[]
9. การผ่าตัดหลอดเลือด การทำคลอด การใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นป้องกันตา*				[]

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ	สำหรับผู้วิจัย
10. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานการณ์				[]
11. การเช็ดตัวผู้ป่วยทุกรายใช้ถุงมือสะอาด				[]
12. การให้การดูแลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสัมผัสเลือด หรือสารน้ำจากร่างกายให้ใส่ถุงมือทุกครั้ง				[]
13. การเจาะเลือดไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือ				[]
14. เมื่อจะปฏิบัติกิจกรรมใหม่ให้เปลี่ยนถุงมือโดยไม่จำเป็นต้องล้างมือทุกครั้ง				[]
15. การล้างมือก่อนทำผ่าตัด โดยใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อฟอกมือให้ทั่วถึงข้อศอก 3-5 นาที				[]
16. น้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้กับเครื่องยาคือ โลโซล 2% แช่นาน 30 นาที				[]
17. ขยะทุกชนิดจากผู้ติดเชื้อเอดส์ทำลายโดยการเผา				[]
18. การล้างทำความสะอาด (cleaning) เครื่องมือ สามารถลดปริมาณเชื้อโรคลงได้เกือบหมด				[]
19. การต้มเครื่องมือในน้ำเดือดนาน 20 นาที สามารถทำลายเชื้อเอดส์ได้				[]
20. เลือดหรือหนอง กระเด็นเปื้อนที่พื้นให้ราดน้ำยาโลโซล 2% นาน 30 นาที ก่อนเช็ดทำความสะอาด				[]

ตอนที่ 6 การปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติ

ของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว โปรดตอบตามที่ท่านปฏิบัติ และกรุณาตอบ

ทุกข้อ การเลือกตอบคือเกณฑ์ดังนี้

ทำทุกครั้ง หมายถึง ข้อความนั้นเป็นพฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้ง

ทำเป็นบางครั้ง หมายถึง ข้อความนั้นเป็นพฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติ แต่ไม่เป็นประจำ

ไม่เคยทำ หมายถึง ข้อความนั้นเป็นพฤติกรรมที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติ

ไม่มีกิจกรรม หมายถึง ไม่เคยมีกิจกรรมนั้นในขณะที่ท่านปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

ลำดับ	พฤติกรรม	ทำทุกครั้ง	ทำเป็น บางครั้ง	ไม่เคยทำ	ไม่มี กิจกรรม	สำหรับผู้วิจัย
1.	สวมถุงมือขณะเจาะเลือด					[]
2.	สวมถุงมือขณะให้สารละลายเข้าหลอดเลือด					[]
3.	สวมถุงมือเมื่อคาดว่าจะสัมผัสเลือด สารน้ำ จากร่างกาย เนื้อเยื่อของผู้ป่วย					[]
4.	สวมถุงมือเมื่อมีบาดแผลที่มือ หรือเล็บฉีก					[]
5.	เปลี่ยนถุงมือเมื่อจะปฏิบัติกิจกรรมใหม่หรือ ดูแลผู้ป่วยรายใหม่					[]
6.	ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เมื่อทำแผลผู้ป่วย					[]
7.	ทดสอบการรั่วของถุงมือก่อนใช้					[]
8.	สวมถุงมือสะอาดเมื่อเตรียมผิวหนังก่อน ผ่าตัด					[]
9.	สวมรองเท้าน้ำยาง ฝ้ายกันเปื้อน เสื้อคลุม ถุงมือยาว ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และแว่นตา ป้องกัน เมื่อทำคลอด					[]
10.	ใช้ฝ้ายกันเปื้อน ถุงมือ Sterile ผ้าปิดปาก ปิดจมูก แว่นตา เมื่อทำแผล active bleeding					[]
11.	ใส่ฝ้ายกันเปื้อน ถุงมือ sterile เมื่อ scrub แผลจากอุบัติเหตุทั่วไป					[]

ลำดับ	พฤติกรรม	ทำทุกครั้ง	ทำเป็น บางครั้ง	ไม่เคยทำ	ไม่มี กิจกรรม	สำหรับผู้วิจัย
12.	สวมแว่นตาป้องกันเมื่อใส่ท่อหายใจผู้ป่วย					[]
13.	ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เมื่อดูดเสมหะผู้ป่วย					[]
14.	หลังเจาะเลือดผู้ป่วยแล้วสวมปลอกเข็มกลับ คืนโดยใช้มือจับปลอกเข็ม*					[]
15.	เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลังจากใช้ แล้วใส่ในกล่องที่เข็มแทงไม่ทะลุ ก่อนนำไป ทำลาย					[]
16.	ส่งของมีคมโดยวางบนถาดให้ผู้รับหยิบเอง					[]
17.	การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ร่างกายเปื้อนเลือด ให้ใส่ถุงมือสะอาดและผ้ากันเปื้อน					[]
18.	หลอดปั่น hematocrit หลังใช้แล้วทิ้งใน ถังขยะทั่วไป*					[]
19.	ใบมีดผ่าตัดหลังใช้แล้ว ถอดใบมีดออกจาก ด้ามมีดก่อนแยกแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ*					[]
20.	เข็มชนิดใช้ซ้ำ แช่รวมกับกระบอกฉีดยา*					[]
21.	การหักหลอดเลือด ใช้สำลีหรือผ้าก๊อกรอง เพื่อป้องกันเศษแก้วที่มือ					[]
22.	เข็มเย็บแผลหลังใช้ครั้งแรกซ่อนปลายเข็ม โดยใช้เข็มจับใกล้บริเวณปลายเข็ม แล้ววาง คว่ำไว้					[]
23.	หลังฉีดยาผู้ป่วย ถือหลอดฉีดยาและเข็มไป เก็บโดยไม่ใส่ในถาดหรือชามรูปใด					[]
24.	ล้างมือก่อนให้การพยาบาล					[]
25.	ล้างมือหลังให้การพยาบาล					[]
26.	เลือด สารน้ำจากร่างกาย เนื้อเยื่อของ ผู้ป่วยที่ส่งตรวจใส่ภาชนะมีฝาปิดมิดชิด ก่อนนำส่ง					[]

ลำดับ	พฤติกรรม	ทำทุกครั้ง	ทำเป็น บางครั้ง	ไม่เคยทำ	ไม่มี กิจกรรม	สำหรับผู้วิจัย
27.	เช็ดเตียงผู้ป่วยด้วย Lysol 2% ทุกครั้ง ก่อนรับผู้ป่วยใหม่*					[]
28.	ใบมีดโกนที่ใช้กับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียวทิ้ง					[]
29.	แยกผู้ป่วยโรคเอดส์ทุกระยะให้อยู่ห้องแยก*					[]
30.	เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเลือด หรือ สารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย เช็ดคราบเลือด ออกให้มากที่สุดก่อนนำไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ					[]
31.	ก่อนปฏิบัติงานสำรวจตัวเองว่ามีบาดแผลที่ มือหรือผิวหนัง ตามร่างกาย					[]
32.	แยกของใช้ที่ใช้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น เสื้อผ้า ช้อน แก้วน้ำ ปรัช จากผู้ป่วยอื่น*					[]
33.	แก้วยาเม็ด ยาน้ำ ที่ใช้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ แช่น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำไปทำความสะอาด*					[]
34.	ผ้าเปื้อนเลือด สารน้ำจากร่างกายของ ผู้ป่วยส่งซักรวมกับผ้าเปื้อนธรรมดา*					[]
35.	ขยะหรือสิ่งของที่ใช้กับผู้ป่วยที่เปื้อนเลือด แยกทิ้งในถังขยะติดเชื้อ ก่อนนำไปทำลาย					[]
36.	ก่อนทิ้งผ้าเปื้อนลงในภาชนะรองรับ จัด อุจจาระ ก้อนเลือด เศษวัสดุออกให้หมด					[]
37.	ขยะหรือสิ่งของทุกชนิดที่ใช้กับผู้ป่วยโรค- เอดส์ทิ้งในถังขยะติดเชื้อ*					[]
38.	เมื่อถูกเข็มหรือของมีคมตำลึงด้วยน้ำเย็น จากก๊อก (running water) และบีบ เลือดออกให้มากที่สุด					[]

ลำดับ	พฤติกรรม	ทำทุกครั้ง	ทำเป็น บางครั้ง	ไม่เคยทำ	ไม่มี กิจกรรม	สำหรับผู้วิจัย
39.	ตรวจสอบวันหมดอายุของน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน ใช้					[]
40.	เมื่อเลือด หรือสารน้ำจากร่างกายหกบนพื้น ให้ใช้กระดาษเช็ดบริเวณนั้นให้มากที่สุด ราดน้ำยาไลโซล 2% หรือโซเดียมไฮโป- คลอไรด์ 0.5% ลงบริเวณพื้นที่ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วจึงทำความสะอาดตามปกติ					[]

* ข้อความเชิงลบ

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้