

Rh genes ในไทยส่วย^{1/}

นเรศร์ มุลาตี^{2/} และ พินลดา มุลาตี^{3/}

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ของตัวนำลักษณะพันธุกรรมของ หมู่เลือด Rh ของประชากรไทยส่วย ศึกษาโดยสุ่มตัวอย่างและเข้าไปสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านไทยส่วย ที่อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุขันธ์ และ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 859 คน พบคนที่มีหมู่เลือด Rh⁻ จำนวน 13 คน (1.51%) คิดเป็นความถี่ของยีน Rh⁻ เท่ากับ 0.123

1/ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ วท. 8/2539

2/ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3/ เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและสถิติ รพ.จิตเวชขอนแก่น

Rh genes in Thai Sui^{1/}
Nareit Mularlee^{2/} and Pinlada Mularlee^{3/}

ABSTRACT

The main objectives of this research project was to study the frequencies of genetics conductor for Rh Blood groups. Studies by collected field research data and taking part in various activities in the villages.

The Rh Blood groups were randoming determined in 859 samples from the Thai Sui Population in Sriratana, Khu-Kun and Muang distric, Srisaket province. The incidence of Rh negative (Rh⁻) was 13 out 589 samples. This is equivalent to 0.123 When expressed in term of the gene frequency.

^{1/} Granted by a research grant No. Sc.8/2539 from Khon Kaen University.

^{2/} Associate professor Department of Biology, Faculty of Science Khon-Kaen University 40002.

^{3/} Khon Kaen Neuro Psychiatric Hospital 40000.