




ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม แหล่งสนับสนุนกับพฤติกรรม
แสวงหาการดูแลสุขภาพของบิดามารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบ
พลันทางเดินหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ นางสาวอุมาพร อัครลา

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพุมล ธนาเศรษฐ์องกุล)

 กรรมการ
(อาจารย์ ดร. ชนิษฐา นันทบุตร)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์วิลาวรรณ พันธุ์ฤกษ์)

บทคัดย่อ

เด็กนับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญ เมื่อมีการเจ็บป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันทางเดิน
หายใจในเด็กขึ้น บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ดูแลสุขภาพจะต้องปฏิบัติการแสวงหาการดูแลสุขภาพทั้งที่
เป็นวิธีการ และการไปใช้แหล่งบริการสุขภาพตามความคาดหวังถึงผลที่จะได้รับสามารถบำบัด
อาการเจ็บป่วยได้ การวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษาพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนทาง
สังคม และแหล่งสนับสนุน ตลอดจนหาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม แหล่ง
สนับสนุน กับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างคือบิดามารดาที่นำบุตรมารับการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 290 คน เก็บรวบรวมข้อมูลตั้ง
แต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
แน่นอน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากข้อมูลการศึกษานำร่อง แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม และแหล่ง

สนับสนุนของ House, J.J. (1981) และแนวคิดระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นของ Klienman, A. (1980) ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพเมื่อมีอาการเจ็บคอ คอบวมแดง ดูดน้ำ,นม หรือกินอาหารไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีการรักษาแผนปัจจุบันทุกอาการ ได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ส่วนใหญ่เป็นระดับปานกลาง แหล่งสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด เมื่อทดสอบความสัมพันธ์พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพทั้งหมด และเมื่อมีอาการไข้ อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล และอาการเจ็บคอ คอบวมแดง ดูดน้ำ,นม หรือกินอาหารไม่ได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($\chi^2 = 50.03$, $C = .18$, $\chi^2 = 11.53$, $C = .19$, $\chi^2 = 30.03$, $C = .31$ และ $\chi^2 = 15.4$, $C = .22$ $P < 0.05$ ตามลำดับ) ส่วนแหล่งสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพเมื่อมีอาการเจ็บคอ คอบวมแดง ดูดน้ำ,นม หรือกินอาหารไม่ได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($\chi^2 = 7.16$, $C = .16$ $P < 0.05$)

THESIS TITLE : THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT, RESOURCES AND
HEALTH CARE SEEKING BEHAVIOR IN PARENTS OF UNDER 5 YEARS
OLD CHILDREN WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION.

AUTHOR : MISS UMAPORN AKALA

THESIS ADVISORY COMMITTEE :

Sukumal Thanasate-angkool...... Chairman

(Assistant Professor Sukumal Thanasate-angkool)

[Signature]..... Member

(Lecturer Dr.Khanitta Nuntaboot)

Wilawan Phanphruk...... Member

(Associate Professor Wilawan Phanphruk)

ABSTRACT

This descriptive research aimed to study health care seeking behavior, social support, social resources as well as to investigate relationship between social support, social resources and health care seeking behavior in parents whose under five years old children had acute respiratory infection.

Two hundreds ninety parents of under five years old children with acute respiratory infection being diagnosed at four community hospitals in Kalasin during December 1995 to March 1996, were included in the study.

The research tool was questionnaire consisted of three main parts; social support, social resources and health care seeking behavior. The social support and social resources parts were developed by the researcher based on findings from the pilot study and House's (1981). Whereas the health care seeking behavior part was based on Kleinman's (1980). Data were then analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and chi-square test.

Results indicated the following.

1. Modern medicine was utilized in every symptom related to acute respiratory infection. Health care seeking behaviors were occurred, at the highest mean, for pharyngotonsillitis.

2. The overall social support received, was at middle level. Whereas emotional support was received most. Parents received those support mostly from relating people by blood relationship.

3. Relationship between social support, social resources and health care seeking behavior were tested using chi-square and contingency coefficient. It was found that there was statistical significant correlation between social support and health care seeking behavior of parents ($X^2 = 50.03, C = .18, X^2 = 11.53, C = .19, X^2 = 30.03, C = .31, X^2 = 15.4, C = .22$ at $p < 0.05$ for over all, fever, common cold, and pharyngotonsillitis'symptom respectively). There was also statistical significant correlation between social resources and health care seeking behavior of parents ($X^2 = 7.16, C = .16$ at $p < 0.05$).