

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ เจตคติ กับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สถานเอนามัยในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 251 คน ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนอย่างสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นำเสนอตามหัวเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ตามลำดับ คือ

- 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
- 4.2 ข้อมูลด้านการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
- 4.3 ข้อมูลด้านเจตคติต่อโรคเอดส์
- 4.4 ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์
- 4.5 ข้อมูลด้านสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ เจตคติ กับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์

#### 4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่สถานเอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สถานภาพที่ศึกษาประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ ตำแหน่ง เงินเดือน และจำนวนผู้ร่วมงานในสถานเอนามัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏในตารางที่ 2 คือ

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัย จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ ตำแหน่ง เงินเดือน และจำนวนผู้ร่วมงานในสถานีนอนามัย

| รายการ        |                         | จำนวน<br>( n = 251 ) | ร้อยละ |
|---------------|-------------------------|----------------------|--------|
| เพศ           |                         |                      |        |
|               | ชาย                     | 96                   | 38.2   |
|               | หญิง                    | 155                  | 61.8   |
| อายุ          |                         |                      |        |
|               | ต่ำกว่า 31 ปี           | 109                  | 43.4   |
|               | 31 - 40 ปี              | 90                   | 35.9   |
|               | 41 - 50 ปี              | 38                   | 15.1   |
|               | 51 ปีขึ้นไป             | 14                   | 5.6    |
| สถานภาพสมรส   |                         |                      |        |
|               | โสด                     | 73                   | 29.1   |
|               | สมรส                    | 172                  | 68.5   |
|               | หย่า แยก หม้าย          | 6                    | 2.4    |
| ระดับการศึกษา |                         |                      |        |
|               | ต่ำกว่าปริญญาตรี        | 185                  | 73.7   |
|               | ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | 64                   | 25.5   |
|               | สูงกว่าปริญญาตรี        | 2                    | 0.8    |
| อายุราชการ    |                         |                      |        |
|               | ต่ำกว่า 5 ปี            | 84                   | 33.5   |
|               | 5 - 10 ปี               | 45                   | 17.9   |
|               | 11 - 15 ปี              | 46                   | 18.3   |
|               | 16 - 20 ปี              | 31                   | 12.4   |
|               | 21 ปีขึ้นไป             | 45                   | 17.9   |

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัย จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ ตำแหน่ง เงินเดือน และจำนวนผู้ร่วมงานในสถานีนอนามัย (ต่อ)

| รายการ                        | จำนวน<br>( n = 251 ) | ร้อยละ |
|-------------------------------|----------------------|--------|
| ตำแหน่ง                       |                      |        |
| เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข | 71                   | 28.3   |
| เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน     | 172                  | 68.5   |
| อื่น ๆ (ระบุ)                 | 8                    | 3.2    |
| เงินเดือน                     |                      |        |
| ต่ำกว่า 5,000 บาท             | 0                    | 0      |
| 5,001 - 10,000 บาท            | 166                  | 66.1   |
| 10,001 - 15,000 บาท           | 70                   | 27.9   |
| 15,000 บาทขึ้นไป              | 15                   | 6.0    |
| จำนวนผู้ร่วมงานในสถานีนอนามัย |                      |        |
| 2 คน                          | 15                   | 6.0    |
| 3 คน                          | 178                  | 70.9   |
| 4 คน                          | 46                   | 18.3   |
| 5 คน                          | 11                   | 4.4    |
| 6 คน                          | 1                    | 0.4    |

จากตารางที่ 2 พบว่าเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 31 ปี รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่สมรสแล้วมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 73.7) มีอายุราชการต่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ 33.5) มีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ร้อยละ 68.5) มีอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 66.1) และมีจำนวนผู้ร่วมงานในสถานีนอนามัย 3 คน เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.9)

#### 4.2 ด้านการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อโรคเอดส์ การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคเอดส์ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการรับรู้ถึงอุปสรรคของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านแต่ละด้าน ปรากฏในตารางที่ 3-7 ตามลำดับดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ของการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์โดยภาพรวม

| รายการ                          | ระดับการรับรู้ |      |         |
|---------------------------------|----------------|------|---------|
|                                 | $\bar{X}$      | S.D. | แปลความ |
| 1. ด้านโอกาสเสี่ยงต่อโรค        | 3.80           | 0.56 | ดี      |
| 2. ด้านความรุนแรงของโรค         | 4.00           | 0.47 | ดี      |
| 3. ด้านประโยชน์ของการปฏิบัติงาน | 4.13           | 0.43 | ดี      |
| 4. ด้านอุปสรรคของการปฏิบัติงาน  | 4.20           | 0.47 | ดี      |
| รวม                             | 4.01           | 0.35 | ดี      |

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( $\bar{X} = 4.01$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยมีข้อสังเกตว่าด้านที่มีการรับรู้ระดับสูงกว่าด้านอื่น คือ การรับรู้ถึงอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ( $\bar{X} = 4.20$ ) ส่วนที่มีการรับรู้ระดับต่ำกว่าด้านอื่นคือ การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อโรค ( $\bar{X} = 3.80$ )

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของการรับรู้ถึงโอกาส  
เสี่ยงต่อโรคเอดส์ จำแนกเป็นรายชื่อ

| รายการ                                                                                                                 | ระดับการรับรู้ |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|
|                                                                                                                        | $\bar{X}$      | S.D. | แปลความ   |
| 1. การเย็บแผลผู้ป่วยผ่านได้นิ้วมือที่กดแผลนั้น อาจทำให้<br>ท่านมีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ได้                              | 4.03           | 0.94 | ดี        |
| 2. การฉีดวัคซีนโดยใช้กระบอกฉีดร่วมกันไม่ทำ ให้<br>ติดเชื้อโรคเอดส์                                                     | 3.80           | 1.22 | ดี        |
| 3. เข็มฉีดยาชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลังจากใช้แล้วให้ทิ้ง<br>ลงถุงขยะได้ทันทีจะปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคเอดส์          | 3.36           | 1.41 | ดีปานกลาง |
| 4. ผู้ป่วยที่มาใช้บริการทุกคนควรได้รับการปฏิบัติเสมือน<br>เป็นผู้ติดเชื้อโรคเอดส์                                      | 4.31           | 1.07 | ดี        |
| 5. ขณะทำคลอดดื่มน้ำคร่ำกระเด็นเข้าตาหรือเข้าปากจะ<br>ไม่ติดเชื้อโรคเอดส์ เนื่องจากในน้ำคร่ำไม่มีเชื้อโรคเอดส์          | 4.12           | 0.90 | ดี        |
| 6. ผ้าก๊อซ และสำลีที่ผ่านการใช้กับผู้ป่วยแล้วควรใส่ถุง<br>ขยะแยกจากขยะอื่น ๆ แล้วรวบรวมไว้เผาหรือฝัง<br>สัปดาห์ละครั้ง | 2.72           | 1.33 | ดีปานกลาง |
| 7. พื้นอาคารที่เปียกและมีสื่อน้ำจากร่างกายหกเลอะเทอะ<br>อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การติดเชื้อโรคเอดส์ได้         | 4.03           | 1.07 | ดี        |
| 8. วิธีการสวมปลอกเข็มที่ไขแล้วเข้าปลอก ควรใช้มือข้าง<br>หนึ่งจับเข็ม แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งจับปลอกเข็มสวมเข้า<br>หากัน | 4.02           | 1.22 | ดี        |
| รวม                                                                                                                    | 3.80           | 0.56 | ดี        |

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานอนามัยส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยง  
ต่อโรคเอดส์ในรายชื่ออยู่ในระดับดี ( $\bar{X} = 3.80$ ) แต่มีบางเรื่องที่มีการรับรู้อยู่ในระดับดีปานกลาง  
ได้แก่ การใช้เข็มฉีดยาชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลังจากใช้แล้วให้ทิ้งลงถุงขยะได้ทันทีจะปลอดภัยจาก  
การติดเชื้อโรคเอดส์ ( $\bar{X} = 3.36$ ) และการรับรู้เรื่องผ้าก๊อซและสำลีที่ผ่านการใช้กับผู้ป่วยแล้วควร

ใส่ถุงขยะแยกจากขยะอื่น ๆ แล้วรวบรวมไว้เผาหรือฝังสัปดาห์ละครั้ง ( $\bar{X} = 3.36$  และ 2.72 ตามลำดับ) โดยมีข้อสังเกตว่าด้านที่มีการรับรู้สูงกว่าด้านอื่น คือ การรับรู้ที่ว่าให้บริการทุกคนควรได้รับการปฏิบัติเสมือนผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ( $\bar{X} = 4.31$ )

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคเอดส์ จำแนกเป็นรายชื่อ

| รายการ                                                                                                   | ระดับการรับรู้ |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|
|                                                                                                          | $\bar{X}$      | S.D. | แปลความ   |
| 1. ปัจจุบันโรคเอดส์ได้แพร่กระจายเข้าสู่ครอบครัวในชุมชนแล้ว                                               | 4.63           | 0.60 | ดีมาก     |
| 2. ขณะนี้การติดเชื้อโรคเอดส์ในกลุ่มหญิงมีครรภ์มีแนวโน้มลดลง                                              | 3.84           | 0.95 | ดี        |
| 3. ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาส                                          | 4.33           | 0.82 | ดี        |
| 4. ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์แล้วเชื้อจะอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต ไม่มีโอกาสหาย                                 | 4.48           | 0.80 | ดี        |
| 5. ปัจจุบันมีการค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเอดส์ได้                                       | 3.66           | 0.82 | ดี        |
| 6. ปัจจุบันมีการค้นพบยาที่สามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ แต่ยังมีราคาแพง จึงยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย | 3.56           | 1.00 | ดี        |
| 7. ลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ จะติดเชื้อจากแม่ทุกคน                                             | 3.25           | 1.18 | ดีปานกลาง |
| 8. ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในระยะแรกที่ยังไม่มีอาการสามารถทำงานได้เหมือนคนทั่วไป                              | 4.25           | 0.98 | ดี        |
| รวม                                                                                                      | 4.00           | 0.47 | ดี        |

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานีนอนามัยส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคเอดส์ในระดับดี ( $\bar{X} = 4.00$ ) แต่พบว่าการรับรู้ที่อยู่ในระดับดีมาก คือ การรับรู้

ที่ว่าปัจจุบันโรคเอดส์ได้แพร่กระจายเข้าสู่ครอบครัวในชนบทแล้ว ( $\bar{X} = 4.63$ ) โดยมีข้อสังเกตว่า การรับรู้ที่ว่าลูกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อจะติดเชื้อจากแม่ทุกคนมีการรับรู้ในระดับดีปานกลาง ( $\bar{X} = 3.25$ )

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของการรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ จำแนกรายข้อ

| รายการ                                                                                                                                | ระดับการรับรู้ |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|
|                                                                                                                                       | $\bar{X}$      | S.D. | แปลความ   |
| 1. การทำคลอด หรือให้บริการผู้ป่วยที่มีเลือดออกจากร่างกายทุกครั้ง ไม่จำเป็นต้องป้องกันแบบครอบจักรวาล เพราะสิ้นเปลืองมาก                | 4.40           | 0.89 | ดี        |
| 2. การให้บริการผู้ป่วยที่มีสารน้ำหรือเลือดออกจากร่างกาย ต้องใช้ผ้าปิดปาก และจมูก (Mask) ทุกครั้ง                                      | 3.69           | 1.24 | ดี        |
| 3. หลังจากให้บริการผู้ป่วยไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อเอดส์หรือไม่ก็ตาม จำเป็นต้องแช่เครื่องมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง                    | 4.56           | 0.75 | ดีมาก     |
| 4. การสวมแว่นตาทำคลอดเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์                                                                  | 4.47           | 0.71 | ดี        |
| 5. เมื่อถูกเข็มเป็อนเลือดแทงเข้าได้ผิวหนังต้องรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ (AZT) ทุกครั้ง                                                | 3.44           | 1.16 | ดีปานกลาง |
| 6. น้ำยาที่ใช้แช่เครื่องมือ เช่น 70% Alcohol หรือ 0.5% Hypochlorite ต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์จึงจะให้ผลในการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 3.96           | 0.98 | ดี        |
| 7. การให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคเอดส์                                                   | 4.55           | 0.62 | ดีมาก     |
| 8. ปอทวดใช้ที่ใช้แล้วสามารถทำลายเชื้อได้โดยใช้ 70% Alcohol แช่นาน 30 นาที                                                             | 3.95           | 0.94 | ดี        |
| รวม                                                                                                                                   | 4.13           | 0.43 | ดี        |

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานอนามัยส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี ( $\bar{X} = 4.13$ ) แต่มีการรับรู้ในระดับดีมาก คือ การรับรู้ว่า หลังจากให้บริการผู้ป่วยไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อเอดส์หรือไม่ก็ตาม จำเป็นต้องแช่เครื่องมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และการรับรู้ว่าการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคเอดส์ ( $\bar{X} = 4.56$  และ 4.55 ตามลำดับ) โดยมีข้อสังเกตว่าการรับรู้ว่าเมื่อถูกเข็มเป็อนเลือดแทงเข้าได้ผิวหนังต้องรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ (AZT) ทุกครั้ง มีการรับรู้ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 3.44$ )

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของการรับรู้ถึงอุปสรรคของการปฏิบัติงาน จำแนกรายข้อ

| รายการ                                                                                                                           | ระดับการรับรู้ |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|
|                                                                                                                                  | $\bar{X}$      | S.D. | แปลความ |
| 1. การใช้เครื่องนึ่ง (Autoclave) ที่สถานอนามัยยังไม่จำเป็นเพราะมีความยุ่งยากในการใช้                                             | 4.46           | 0.75 | ดี      |
| 2. น้ำยาที่สามารถฆ่าเชื้อโรคเอดส์ได้ดี ส่วนใหญ่มีราคาแพงไม่เหมาะสมที่จะใช้ในระดับสถานอนามัย                                      | 4.26           | 0.86 | ดี      |
| 3. การป้องกันแบบครอบจักรวาลควรทำเฉพาะกับผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีเชื้อโรคเอดส์เท่านั้น                                                | 4.20           | 0.93 | ดี      |
| 4. สถานอนามัยที่ยังไม่มีเดาเผาขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ควรใช้วิธีทิ้งในหลุมลึกแล้วเผา หรือฝังกลบทุกวัน                           | 3.83           | 0.98 | ดี      |
| 5. เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่สถานอนามัยที่ต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้มาขอรับคำปรึกษา ถึงแม้ว่าจะไม่เคยผ่านการอบรมเรื่องการให้คำปรึกษาก็ตาม | 4.26           | 0.80 | ดี      |
| รวม                                                                                                                              | 4.20           | 0.47 | ดี      |

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานีนามัยส่วนใหญ่ มีการรับรู้ถึงอุปสรรคของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดีทุกเรื่อง ( $\bar{X} = 4.20$ ) โดยมีข้อสังเกตว่าการรับรู้ที่อยู่ในระดับดีกว่าทุกเรื่อง คือ การรับรู้ถึงการใช้เครื่องนึ่ง (Autoclave) ที่สถานีนามัยยังไม่จำเป็นเพราะมีความยุ่งยากในการใช้ ( $\bar{X} = 4.46$ ) และการรับรู้ที่อยู่ระดับต่ำกว่าทุกเรื่อง คือ การรับรู้ที่ว่าสถานีนามัยที่ยังไม่มีเตาเผาขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐานควรใช้วิธีทิ้งในหลุมลึกแล้วเผาหรือฝังกลบทุกวัน ( $\bar{X} = 3.83$ )

#### 4.3 ด้านเจตคติต่อโรคเอดส์

เจ้าหน้าที่สถานีนามัยมีเจตคติต่อโรคเอดส์ โดยจำแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความคิดเห็น ความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านความรู้สึกรู้สึกต่อโรคเอดส์ และแนวโน้มที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ปรากฏในตารางที่ 8-11 ตามลำดับดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความเกี่ยวกับเจตคติต่อโรคเอดส์ จำแนกเป็นรายด้าน และเจตคติต่อโรคเอดส์โดยภาพรวม

| รายการ                       | ระดับเจตคติ |      |           |
|------------------------------|-------------|------|-----------|
|                              | $\bar{X}$   | S.D. | แปลความ   |
| 1. ด้านความคิดเห็น ความเชื่อ | 4.12        | 0.43 | ดี        |
| 2. ด้านความรู้สึกรู้สึก      | 3.33        | 0.45 | ดีปานกลาง |
| 3. ด้านแนวโน้มของพฤติกรรม    | 3.58        | 0.52 | ดี        |
| รวม                          | 3.79        | 0.36 | ดี        |

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สถานีนามัย มีเจตคติต่อโรคเอดส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( $\bar{X} = 3.79$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเจตคติเกี่ยวกับความคิดเห็น ความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ และแนวโน้มของพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี ( $\bar{X} = 4.12$  และ 3.58 ตามลำดับ) ส่วนเจตคติด้านความรู้สึกรู้สึกต่อโรคเอดส์อยู่ในระดับดีปานกลาง โดยมีข้อสังเกตว่าด้านที่มีเจตคติสูงกว่าด้านอื่นคือ ด้านความคิดเห็นความเชื่อต่อโรคเอดส์ ( $\bar{X} = 4.12$ )

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของเจตคติด้านความคิด  
เห็นหรือความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ จำแนกเป็นรายชื่อ

| รายการ                                                                                                                                        | ระดับเจตคติ |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|
|                                                                                                                                               | $\bar{X}$   | S.D. | แปลความ |
| 1. การให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ โรคเอดส์ที่มาขอรับบริการ<br>จะสามารถลดผลกระทบด้านจิตใจของผู้ติดเชื้อได้อย่างมาก                               | 4.28        | 0.68 | ดี      |
| 2. บุคลากรสาธารณสุขในระดับตำบลเป็นกลไกสำคัญที่จะ<br>ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ในชุมชนได้                                           | 4.37        | 0.65 | ดี      |
| 3. ท่านมั่นใจว่า ท่านจะไม่แพร่เชื้อจากผู้รับบริการคนหนึ่ง<br>ไปสู่อีกคนหนึ่ง เพราะท่านปฏิบัติตามหลัก Universal<br>Precaution อย่างถูกต้องเสมอ | 4.24        | 0.77 | ดี      |
| 4. การเปลี่ยนน้ำยามาซื้อบ่อย ๆ เป็นการสิ้นเปลืองเกิน<br>ความจำเป็นสำหรับสถานีนามัย                                                            | 3.92        | 0.96 | ดี      |
| 5. ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระบอกฉีดยาทุกครั้ง<br>ในการฉีดวัคซีนในเด็ก                                                                 | 4.10        | 1.06 | ดี      |
| 6. การให้สุขศึกษาแก่ประชาชนเป็นมาตรการที่ไม่ได้ผล<br>เพราะเป็นการยากที่จะทำให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม                                          | 3.99        | 0.93 | ดี      |
| 7. การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่นักเรียนระดับ<br>ประถมศึกษายังไม่มีความจำเป็น เนื่องจากมีพฤติกรรม<br>เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์น้อย    | 4.20        | 0.76 | ดี      |
| 8. ปัจจุบันประชาชนในชนบทมีความรู้เรื่องโรคเอดส์เป็นอย่างดี<br>ดี จึงไม่จำเป็นต้องชี้แจง เมื่อมารับบริการที่สถานีนามัย                         | 4.13        | 0.71 | ดี      |
| 9. ไม่ใช่น้ำที่ของเจ้าหน้าที่สถานีนามัยในการให้คำ<br>ปรึกษา แก่ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์                                                            | 4.36        | 0.59 | ดี      |
| 10. งานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานีนามัยมีมากทำให้ไม่<br>มีเวลาพอที่จะมานั่งฟังเรื่องราวและคอยให้คำแนะนำแก่<br>ผู้มาขอคำปรึกษาที่สถานีนามัย   | 3.90        | 0.96 | ดี      |
| รวม                                                                                                                                           | 4.12        | 0.43 | ดี      |

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานีนามัยมีเจตคติด้านความคิดเห็น ความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดีทุกเรื่อง ( $\bar{X} = 4.12$ ) โดยมีข้อสังเกตว่า เจตคติที่ดีกว่าทุกเรื่อง คือ ความเชื่อที่ว่าบุคลากรสาธารณสุขในระดับตำบลเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ในชุมชนได้ ( $\bar{X} = 4.37$ ) และเจตคติที่อยู่ในระดับต่ำกว่าทุกเรื่อง คือ ความคิดเห็นที่ว่างงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานีนามัยมีมากทำให้ไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งฟังเรื่องราว และคอยให้คำแนะนำแก่ผู้มาขอคำปรึกษาที่สถานีนามัย ( $\bar{X} = 3.90$ )

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของเจตคติด้านความรู้สึกรู้สึกต่อโรคเอดส์ จำแนกรายข้อ

| รายการ                                                                                                                     | ระดับเจตคติ |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
|                                                                                                                            | $\bar{X}$   | S.D. | แปลความ   |
| 1. เจ้าหน้าที่สถานีนามัยเป็นผู้ที่มีบทบาทช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์                           | 4.20        | 0.9  | ดี        |
| 2. ถ้าให้ดูศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว จะมั่นใจได้ว่าจะสามารถลดอัตราการแพร่กระจายของโรคได้อย่างแน่นอน | 3.76        | 1.01 | ดี        |
| 3. เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ต้องให้บริการผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ที่มาขอรับบริการที่สถานีนามัย                                   | 3.36        | 1.13 | ดีปานกลาง |
| 4. ไม่ควรให้มีการทำคลอดที่สถานีนามัย เพราะเจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ได้ง่าย                                   | 3.03        | 1.24 | ดีปานกลาง |
| 5. การที่ต้องปฏิบัติตามหลัก Universal Precautions อย่างเคร่งครัดทำให้รู้สึกไม่สะดวกต่อการทำงาน                             | 3.72        | 1.00 | ดี        |
| 6. การที่จะต้องอธิบายเกี่ยวกับโรคเอดส์ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้แก่ผู้มารับบริการทุกวันทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย                         | 2.30        | 0.94 | ไม่ดี     |
| 7. การควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ทำได้ยาก ทำให้รู้สึก ท้อแท้                                                                  | 3.59        | 0.98 | ดี        |
| 8. อยากให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ เพราะรู้สึกเห็นใจในโชคชะตาของผู้ติดเชื้อและครอบครัว                             | 4.01        | 0.79 | ดี        |
| รวม                                                                                                                        | 3.33        | 0.45 | ดีปานกลาง |

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานีนามัยส่วนใหญ่มีเจตคติด้านความรู้สึกต่อโรคเอดส์ในระดับดี ( $\bar{X} = 3.33$ ) ยกเว้น ความรู้สึกเบื่อนายที่ต้องอธิบายเกี่ยวกับโรคเอดส์ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้แก่ผู้มารับบริการทุกวัน มีเจตคติที่ไม่ดี ( $\bar{X} = 2.30$ ) ส่วนเรื่องความหนักใจที่ต้องให้บริการ ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ที่มาขอรับบริการที่สถานีนามัย และเรื่องไม่ควรให้มีการทำคลอดที่สถานีนามัยเพราะ เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ได้ง่าย มีเจตคติในระดับดีปานกลาง ( $\bar{X} = 3.36$  และ  $3.03$  ตามลำดับ) โดยมีข้อสังเกตว่า ความรู้สึกที่มีระดับดีมากกว่าทุก ๆ เรื่อง คือ เจ้าหน้าที่สถานีนามัยเป็นผู้มีบทบาทช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ( $\bar{X} = 4.20$ )

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของเจตคติด้านแนวโน้มพฤติกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ จำแนกเป็นรายชื่อ

| รายการ                                                                                                                              | ระดับเจตคติ |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
|                                                                                                                                     | $\bar{X}$   | S.D. | แปลความ   |
| 1. ถ้ามีผู้ติดเชื้อโรคเอดส์มาขอรับบริการท่านจะแนะนำให้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลทันที                                                  | 3.72        | 0.95 | ดี        |
| 2. ท่านไม่ต้องการ ไปดูแลผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ที่บ้าน                                                                                  | 3.20        | 1.17 | ดีปานกลาง |
| 3. ท่านจะหลีกเลี่ยงการแจ้งผลการตรวจเชื้อให้แก่ผู้ติดเชื้อทราบเพราะเป็นการทำร้ายจิตใจเขามากเกินไป                                    | 2.97        | 1.15 | ดีปานกลาง |
| 4. ท่านอยากเปลี่ยนอาชีพเพราะคิดว่าท่านมีโอกาสดูแลผู้ติดเชื้อโรคเอดส์จากการให้บริการ                                                 | 3.45        | 1.08 | ดีปานกลาง |
| 5. ถ้าเพื่อนร่วมงานของท่านปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลัก Universal Precaution ท่านจะให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง                       | 4.02        | 0.72 | ดี        |
| 6. กรณีที่ไม่สะดวกในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ท่านจะไม่ใช้อุปกรณ์นั้นแม้ว่าจะต้องสัมผัสกับสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยก็ตาม | 4.10        | 1.13 | ดี        |
| รวม                                                                                                                                 | 3.58        | 0.52 | ดี        |

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานีนามัยมีเจตคติด้านแนวโน้มพฤติกรรม การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( $\bar{X} = 3.58$ ) ยกเว้นการไปดูแลผู้ติดเชื้อ โรคเอดส์ที่บ้าน การแจ้งผลการตรวจเชื้อให้แก่ผู้ติดเชื้อทราบและการอยากเปลี่ยนอาชีพเพราะคิดว่า มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์จากการให้บริการ มีเจตคติอยู่ในระดับดีปานกลาง ( $\bar{X} = 3.20, 2.97$  และ  $3.45$  ตามลำดับ) โดยมีข้อสังเกตว่า พฤติกรรมการปฏิบัติกรณที่ไม่สะดวกในการใช้อุปกรณ์ การป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แล้วจะไม่ใช้อุปกรณ์นั้น ถึงแม้ว่าจะต้องสัมผัสกับสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยก็ตาม มีเจตคติอยู่ในระดับดีมากกว่าเรื่องอื่น ( $\bar{X} = 4.10$ )

#### 4.4 ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์

เจ้าหน้าที่สถานีนามัย มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ในด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ปรากฏในตารางที่ 12-15 ตามลำดับดังต่อไปนี้

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยภาพรวม

| รายการ                                               | ระดับการปฏิบัติงาน |      |         |
|------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|
|                                                      | $\bar{X}$          | S.D. | แปลความ |
| 1. ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ | 3.89               | 0.44 | มาก     |
| 2. ด้านการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์                   | 4.15               | 0.52 | มาก     |
| 3. ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ                           | 4.10               | 0.84 | มาก     |
| รวม                                                  | 4.00               | 0.41 | มาก     |

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานีนามัยมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 4.00$ ) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติงานในระดับมาก ทั้งด้านการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยมีข้อสังเกตว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ( $\bar{X} = 4.15$ )

ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของการปฏิบัติงาน  
ด้านการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ จำแนกรายข้อ

| รายการ                                                                                                                                                          | ระดับการปฏิบัติงาน |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
|                                                                                                                                                                 | $\bar{X}$          | S.D. | แปลความ   |
| 1. ใส่ถุงมือเวลาเขียนแผลผู้ป่วยที่มารับบริการทุกราย                                                                                                             | 4.94               | 0.29 | มากที่สุด |
| 2. ใส่ถุงมือเวลาให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีเลือดหรือสารน้ำ<br>ออกจากร่างกาย                                                                                    | 4.92               | 0.31 | มากที่สุด |
| 3. เปลี่ยนกระบอกลดึกยา เมื่อมีการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนใน<br>โรงเรียน                                                                                            | 4.55               | 0.85 | มากที่สุด |
| 4. สวมปลอกเข็มโดยใช้เข็มจับปลอกเข็ม เมื่อใช้เข็มฉีดยา<br>แล้ว                                                                                                   | 3.27               | 1.50 | ปานกลาง   |
| 5. กำจัดเข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว โดยการทำลายเชื้อก่อนแล้วทิ้ง<br>ลงในภาชนะที่เข็มแทงไม่ทะลุ และมีฝาปิดมิดชิด                                                         | 4.41               | 1.07 | มาก       |
| 6. ใช้ผ้าปิดปาก-จมูก (Mask) ในการให้บริการผู้ป่วยที่มี<br>เลือดหรือสารน้ำออกจากร่างกาย                                                                          | 3.45               | 1.27 | ปานกลาง   |
| 7. ทำลายขยะติดเชื้อจากการให้บริการ โดยการเผาทุกวัน<br>หลังปฏิบัติงาน                                                                                            | 3.99               | 0.95 | มาก       |
| 8. ทำความสะอาดพื้นห้องที่เปื้อนเลือดหรือสารน้ำจาก<br>ร่างกายผู้ป่วยโดยใช้กระดาษเช็ดออกให้มากที่สุดแล้วใช้น้ำยา<br>2% Lysol ราดทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนเช็ดถูตามปกติ | 3.95               | 1.18 | มาก       |
| 9. ทำความสะอาดปรอทวัดไข้ที่ใช้แล้ว โดยแช่ใน 70%<br>Alcohol หรือ 0.5% Hypochlorite นาน 30 นาที แล้วล้าง<br>น้ำสบู่หรือผงซักฟอก ก่อนล้างน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง   | 4.25               | 1.07 | มาก       |
| 10. เปลี่ยนน้ำยาที่ใช้แช่เครื่องมือ เช่น 70% Alcohol หรือ<br>0.5% Hypochlorite ทุกสัปดาห์                                                                       | 4.65               | 0.68 | มากที่สุด |
| 11. ทำให้ปราศจากเชื้อในเครื่องมือประเภทชุดเย็บแผล<br>ชุดทำแผล โดยนึ่งด้วย Autoclave อุณหภูมิ 121° C<br>ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์/ตร.นิ้ว นาน 15 นาที               | 4.75               | 0.67 | มากที่สุด |

ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของการปฏิบัติงาน  
ด้านการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์ จำแนกรายข้อ (ต่อ)

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                 | ระดับการปฏิบัติงาน |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | $\bar{X}$          | SD   | แปลความ |
| 12. ทำความสะอาดผ้าปูเตียง ผ้าปูโต๊ะวางเครื่องมือ หรือ<br>ผ้าสีเหลืองเจาะกลาง ที่เปื้อนเลือดหรือสารน้ำจาก<br>ร่างกายผู้ป่วย โดยการแช่น้ำยา 2 % Lysol หรือ 0.5%<br>Hypochlorite นาน 30 นาที แล้วแปรงคราบเปื้อนออก<br>ก่อน นำไปซักตามปกติ | 4.21               | 0.99 | มาก     |
| รวม                                                                                                                                                                                                                                    | 3.89               | 0.44 | มาก     |

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานอนามัย ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคเอดส์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 3.89$ ) โดยการปฏิบัติที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การใส่ถุงมือเวลาเย็บแผลผู้ป่วยที่มารับบริการทุกราย การใส่ถุงมือเวลาให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีเลือดหรือสารน้ำออกจากร่างกาย การเปลี่ยนกระบอกฉีดยาเมื่อมีการฉีควัคซีนเด็กนักเรียนในโรงเรียน การเปลี่ยนน้ำยาที่ใช้แช่เครื่องมือ เช่น 70% Alcohol หรือ 5% Hypochlorite ทุกสัปดาห์ และการให้ปราศจากเชื้อในเครื่องมือประเภทชุดเย็บแผล ชุดทำแผลโดยนึ่งด้วย Autoclave อุณหภูมิ  $121^{\circ}\text{C}$  ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์/ตร.นิ้ว นาน 15 นาที ( $\bar{X} = 4.94, 4.92, 4.55, 4.65$  และ  $4.75$  ตามลำดับ) แต่ยังพบว่าเจ้าหน้าที่สถานอนามัยมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ปานกลาง คือ การสวมปลอกแขนโดยใช้เข็มจับปลอกแขน เมื่อใช้เข็มฉีดยาแล้ว และการใช้ผ้าปิดปาก - จมูก (Mask) ในการให้บริการผู้ป่วยที่มีเลือดหรือสารน้ำออกจากร่างกาย โดยมีข้อสังเกตว่า การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าทุกเรื่อง คือ การใส่ถุงมือเวลาเย็บแผลผู้ป่วยที่มารับบริการทุกราย ( $\bar{X} = 4.94$ )

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ของการปฏิบัติงาน  
ด้านการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำแนกรายข้อ

| รายการ                                                                                                                                      | ระดับการปฏิบัติงาน |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
|                                                                                                                                             | $\bar{X}$          | S.D. | แปลความ   |
| 1. ให้สุขศึกษาเรื่องโรคเอดส์แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน<br>ที่รับผิดชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา                                                    | 4.05               | 0.87 | มาก       |
| 2. ให้สุขศึกษาเรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านที่<br>รับผิดชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา                                                   | 4.04               | 0.54 | มาก       |
| 3. จัดอบรมหรือประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ อสม.และผู้นำ<br>ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์                                                        | 4.58               | 0.65 | มากที่สุด |
| 4. ให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการ ที่สถานอนามัย โดยใช้สื่อ<br>ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ที่จัดเตรียมไว้ เช่น บอร์ด<br>นิทรรศการ หรือแผ่นพับ ฯลฯ | 4.09               | 0.63 | มาก       |
| 5. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ผู้รับผิดชอบหอ<br>กระจายข่าวในหมู่บ้าน                                                               | 3.98               | 0.95 | มาก       |
| 6. ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ครู<br>อนามัยในโรงเรียนที่รับผิดชอบ                                                       | 4.16               | 0.89 | มาก       |
| รวม                                                                                                                                         | 4.15               | 0.52 | มาก       |

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานอนามัยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานใน  
การให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับมากทุกด้าน ( $\bar{X} = 4.15$ ) ยกเว้นการให้  
สุขศึกษาเรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านที่รับผิดชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพบว่า  
มีการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.58$ )

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ของการปฏิบัติงาน  
ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ จำแนกรายข้อ

| รายการ                                                                                                                        | ระดับการปฏิบัติงาน |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
|                                                                                                                               | $\bar{X}$          | S.D. | แปลความ   |
| 1. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ที่มาขอรับบริการด้านรักษาพยาบาลที่สถานีนอนมัย | 4.13               | 0.92 | มาก       |
| 2. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่หญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์                                                               | 4.58               | 0.67 | มากที่สุด |
| 3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์และครอบครัวที่มาขอรับคำแนะนำปรึกษาจากท่าน                                            | 3.88               | 1.41 | มาก       |
| 4. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่ผู้รักที่เตรียมตัวจะแต่งงานหรือคู่สมรสที่มีปัญหาขอรับคำปรึกษาแนะนำจากท่าน             | 3.80               | 1.28 | มาก       |
| รวม                                                                                                                           | 4.10               | 0.84 | มาก       |

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สถานีนอนมัยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง ( $\bar{X} = 4.10$ ) ยกเว้นการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่หญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์ มีการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.58$ )

#### 4.5 ด้านสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ เจตคติ กับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์

การหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ เจตคติ กับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สถานีนอนมัย โดยวิธีการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment - Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้ในตารางที่ 16-17 ดังต่อไปนี้ ตามลำดับคือ

ตารางที่ 16 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ กับ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์  
ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เป็นรายด้าน

| การรับรู้ 4 ด้าน                            | การปฏิบัติงาน 3 ด้าน                          |                        |                             | รวม     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
|                                             | (1) การควบคุมและป้องกัน<br>การแพร่กระจายเชื้อ | (2) การให้<br>สุขศึกษา | (3) การให้คำ<br>ปรึกษาแนะนำ |         |
| 1. การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยง                  | .0071                                         | .1274*                 | -.0915                      | .0143   |
| 2. การรับรู้ถึงความรุนแรง                   | -.0194                                        | .1220*                 | -.0330                      | .0185   |
| 3. การรับรู้ถึงประโยชน์ของ<br>การป้องกันโรค | .1598**                                       | .1709**                | .0232                       | .1636** |
| 4. การรับรู้ถึงอุปสรรคของ<br>การปฏิบัติงาน  | .0997                                         | .1204*                 | .0769                       | .1303*  |
| รวม                                         | .0726                                         | .1873**                | -.0273                      | .0983   |

\*  $P < .05$

\*\*  $P < .01$

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคเอดส์ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกันโรค และการรับรู้ถึงอุปสรรคของการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้สุขศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ( $r = .1274, .1220, .1709$  และ  $.1204$  ตามลำดับ) ส่วนการรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกันโรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และการให้สุขศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( $r = .1598$  และ  $.1709$  ตามลำดับ) การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้สุขศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( $r = .1873$ ) โดยมีข้อสังเกตว่าระดับความสัมพันธ์ของเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว ข้างต้นอยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีความนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติ กับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์  
ของเจ้าหน้าที่สถานเอดส์ เป็นรายด้าน

| เจตคติ 3 ด้าน            | การปฏิบัติงาน 3 ด้าน                          |                        |                             | รวม     |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
|                          | (1) การควบคุมและป้องกัน<br>การแพร่กระจายเชื้อ | (2) การให้<br>สุขศึกษา | (3) การให้คำ<br>ปรึกษาแนะนำ |         |
| 1. ความคิดเห็น ความเชื่อ | .1005                                         | .2025**                | .0878                       | .1635** |
| 2. ความรู้สึก            | .0259                                         | .0125                  | -.0006                      | .0195   |
| 3. แนวโน้มพฤติกรรม       | .1712**                                       | .0625                  | .0744                       | .1518** |
| รวม                      | .1307*                                        | .1474**                | .0794                       | .1591** |

\*  $P < .05$

\*\*  $P < .01$

จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่าเจตคติด้านความคิดเห็นหรือความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้สุขศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( $r = .2025$ ) เจตคติด้านแนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( $r = .1712$ ) ส่วนเจตคติต่อโรคเอดส์โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และการให้สุขศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ( $r = .1307$  และ .1479 ตามลำดับ) โดยมีข้อสังเกตว่าระดับความสัมพันธ์ของเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ