

บทที่ 4

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย

4.1 ศึกษาปริมาณไขมันและชนิดกรดไขมันในสาหร่าย

4.1.1 ปริมาณไขมันในสาหร่าย

ปริมาณไขมันที่พบในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก *B. braunii* มีปริมาณไขมันมากที่สุดคือ 13.2 ± 0.2 % ส่วนในกลุ่มไดอะตอม *Isochrysis* sp. มีปริมาณไขมันมากที่สุดคือ 6.3 ± 0.5 % กลุ่มไซยาโนแบคทีเรีย *Arthrospira* มีปริมาณไขมันมากที่สุดคือ 4.08 ± 0.15 % ในกลุ่มสาหร่ายขนาดใหญ่พบว่าสาหร่ายสีเขียว *Cladophora* มีปริมาณไขมันมากที่สุดคือ 3.65 ± 0.26 % (ตารางที่ 4.1)

Wahbeh (1997) ทดลองนำสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 4 ชนิดคือ *Ulva lactuca* (Chlorophyta), *Enteromorpha compressa* (Chlorophyta), *Padina pavonica* (Phaeophyta) และ *Laurencia obtuse* (Rhodophyta) มาศึกษาปริมาณไขมัน พบปริมาณไขมันในสาหร่ายสีเขียว *Ulva lactuca* 5.2 ± 1.2 % และ *Enteromorpha compressa* 6.6 ± 2.4 % และสาหร่ายสีน้ำตาลมีปริมาณไขมันทั้งหมดน้อยกว่าชนิดอื่นก็สอดคล้องกับการทดลองของ Matanjun และคณะ (2008) ได้ทำการทดลองโดยใช้สาหร่าย 3 ชนิดมาเป็นตัวแทนสาหร่ายทั้ง 3 ประเภทได้แก่ *Eucheuma cottonii* สาหร่ายสีแดง, *Caulerpa lentillifera* สาหร่ายสีเขียว และ *Sargassum polycystum* สาหร่ายสีน้ำตาล มาทำการหาปริมาณไขมันทั้งหมดโดยผลการทดลองพบว่าปริมาณไขมันทั้งหมด ในสาหร่าย *Sargassum polycystum* (น้ำหนักแห้ง) ซึ่งเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลมีปริมาณไขมันน้อยที่สุดคือ 0.29 ± 0.01 %

4.1.2 ปริมาณและชนิดกรดไขมันที่พบในสาหร่าย

กรดไขมันที่พบในไซยาโนแบคทีเรียพบกรดไขมันโอเมกาในชนิด C18:2 Linoleic acid ในสาหร่ายทั้งหมด และพบกรดไขมันที่เหมือนกันในไซยาโนแบคทีเรียทุกชนิดคือ Palmitic acid, Palmitoleic acid และ Linoleic acid และสามารถพบ Docosahexaenoic acid หรือ DHA ได้ใน *Mastigocladopsis* โดยกรดไขมันที่มีปริมาณมากที่สุดคือ palmitic acid (ตารางที่ 4.2) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Matsunaga et al. (1995) ที่บันทึกไว้ว่าไซยาโนแบคทีเรียส่วนมากจะพบ กรดไขมัน C16:1 Palmitoleic acid อยู่อย่างโดดเด่นซึ่งในการทดลองนี้พบ C16:1 Palmitoleic acid ในสาหร่าย *Phormidium* sp. 54.5% และสาหร่าย *Oscillatoria* sp. 54.4% และจัดเป็นกรดไขมันที่มีมากที่สุดกว่ากรดไขมันชนิดอื่น

กรดไขมันที่พบในสาหร่ายสีเขียวทุกชนิดคือ Palmitic acid, Palmitoleic acid และ Oleic acid โดยชนิดกรดไขมันที่มีปริมาณมากที่สุดคือ palmitic acid โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 22-62 % ของกรดไขมันทั้งหมด โดยพบว่าสามารถพบ EPA ได้ในสาหร่าย *Chlorella* น้ำเค็ม และ *U. intestinalis* และพบ DHA ได้ในสาหร่าย *Chlorella* ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม (ตารางที่ 4.3)

ตารางที่ 4.1 ปริมาณไขมันที่พบในสาหร่าย

	ชนิดสาหร่าย	ปริมาณไขมันทั้งหมด (%)
Microalgae		
Cyanobacteria	<i>Hapalosiphon</i>	3.5 ± 0.0
	<i>Stigonema</i>	2.3 ± 0.4
	<i>Nostoc</i>	1.6 ± 0.2
	<i>Fischerella</i>	1.5 ± 0.0
	<i>Phormidium</i>	2.3 ± 0.0
	<i>Arthrospira</i>	4.1 ± 0.1
	<i>Mastigocladopsis</i>	2.1 ± 0.0
	<i>Oscillatoria</i>	2.1 ± 0.0
Green algae	<i>Chlorella</i> sp. freshwater	4.5 ± 0.0
	<i>Chlorella</i> -marine	2.1 ± 0.1
	<i>Botryococcus braunii</i> K0	12.2 ± 0.5
	<i>B. braunii</i> K1	12.5 ± 0.5
	<i>B. braunii</i> K2	13.2 ± 0.2
	<i>B. braunii</i> K4	12.3 ± 0.4
	<i>B. braunii</i> K5	10.1 ± 0.4
Prasinophyte	<i>Tetraselmis</i> sp.	5.0 ± 0.4
Diatom	<i>Isochrysis</i> sp.	6.3 ± 0.5
	<i>Chaetoceros</i> sp.	2.4 ± 0.3
	<i>Thalassiosira</i> sp.	6.0 ± 0.5
Macroalgae		
Green algae	<i>Ulva</i>	2.3 ± 0.1
	<i>Caulerpa lentilifera</i>	2.2 ± 0.1
	<i>Enteromorpha</i>	2.1 ± 0.1
	<i>Caulerpa</i>	2.2 ± 0.0
	<i>Cladophora</i>	3.7 ± 0.3
Red algae	<i>Acanthophora</i>	2.0 ± 0.0
Brown algae	<i>Sargassum</i>	0.5 ± 0.0
	<i>Padina</i>	0.4 ± 0.1

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

กรดไขมันที่พบในสาหร่ายไดอะตอมทุกชนิดคือ Myristic acid, Palmitic acid, Palmitoleic acid และ Oleic acid โดยชนิดกรดไขมันที่แนวโน้มมีปริมาณมากที่สุดคือ palmitic acid โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 16-44 %ของกรดไขมันทั้งหมด โดยพบว่าสามารถพบ EPA ได้ในไดอะตอมทั้งสามสกุลคือ *Chaetoceros*, *Isochrysis* และ *Tetraselmis* และพบ DHA ได้ในสาหร่าย *Chaetoceros* และ *Tetraselmis* (ตารางที่ 4.4) ส่วนใน *Acanthophora*, *Sargassum* และ *Padina* กรดไขมันที่มีปริมาณมากที่สุดคือ palmitic acid สามารถพบ EPA ได้ใน *Acanthophora* และพบ DHA ใน *Sargassum*

การศึกษาของ Hotimchenko (2002) ที่มีการบันทึกไว้ว่าพบกรดไขมัน DHA หรือ C22:6 Docosahexaenoic acid ในสาหร่าย *Ulva fenestrata* อยู่ $1.6 \pm 0.1\%$ การศึกษาของ Matanjun และคณะ (2008) ที่บันทึกไว้ว่า สาหร่ายสีน้ำตาล *Sargassum polycystum* มีการพบกรดไขมัน C22:6 Docosahexaenoic acid 0.13%

โดยพบว่าสาหร่ายที่มีกรดไขมันรวม C16-C18 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่เหมาะสมกับการนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล อยู่ในปริมาณสูงมากกว่า 90 % ได้แก่ *Stigonema*, *Fischerella*, *Arthrospira*, *Nostoc* และ *B. braunii* ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสาหร่ายที่เหมาะสมที่จะนำไปศึกษาต่อคือ *B. braunii* เนื่องจากมีปริมาณไขมันสูงที่สุด และมีชนิดกรดไขมันที่เหมาะสมที่สุดต่อการนำมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ตารางที่ 4.2 กรดไขมัน (ร้อยละ) ที่พบในไฮยาโนแบคทีเรีย (ค่าเฉลี่ย $\pm$ ค่ามาตรฐาน)

	cyanobacteria								
ชนิดกรดไขมัน	Phormidium	Stigonema	Oscillatoria	Fischerella	Hapalosiphon	Arthrospira	Nostoc	Mastigocladopsis	
C14:0 Myristic acid	0	0	0	0	10.08 ± 0.91	0	0	1.71 ± 0.19	
C15:0 Pentadecanoic acid	0	0	0	0	0	0	0	1.25 ± 0.11	
C16:0 Palmitic acid	33.7 ± 4.01	26.54 ± 0.66	34.63 ± 3.74	31.96 ± 0.39	24.25 ± 0.41	58.89 ± 38.6	38.2 ± 4.88	40.81 ± 4.86	
C16:1 Palmitoleic acid	10.57 ± 1.99	44.95 ± 1.74	8.46 ± 0.87	40.31 ± 1.08	42.44 ± 1.61	4.28 ± 0.75	14.26 ± 1.38	17.78 ± 3.8	
C18:0 Stearic acid	22.24 ± 3.77	0	0	0	0	0.97 ± 0.84	0	4.73 ± 0.91	
C18:1 Oleic acid	0	15.22 ± 0.77	27.74 ± 1.14	16.01 ± 0.16	12.94 ± 0.36	3.36 ± 0.06	8.18 ± 1.15	14.11 ± 1.92	
C18:2 Linoleic acid	11.21 ± 1.34	6.18 ± 0.20	18.51 ± 1.06	11.71 ± 0.54	4.85 ± 0.07	11.21 ± 1.35	12.7 ± 1.32	5.58 ± 1.98	
C18:3 γ-Linolenic acid	0	0		0	0	12.16 ± 1.65	0	0	
C18:3 α-Linolenic acid	0	0		0	0	0	18.58 ± 2.67	0.87 ± 0.06	
C20:4 Arachidonic acid	0	0		0	0	0	0	0	
C20:5 Eicosapentaenoic acid	0	0		0	0	0	0	0	
C22:6 Docosahexaenoic acid	0	0		0	0	0	0	1.29 ± 0.01	
Other	22.2 ± 3.09	7.1 ± 2.42	10.66 ± 4.65	0.025 ± 0.01	5.45 ± 1.52	3.12 ± 2.72	8 ± 11.40	11.86 ± 1.58	
Total C16-C18	77.72	92.89	89.34	99.99	84.48	90.87	91.92	83.88	



ตารางที่ 4.3 กรดไขมัน (ร้อยละ) ที่พบในสาหร่ายกลุ่มสาหร่ายสีเขียว (ค่าเฉลี่ย $\pm$ ค่ามาตรฐาน)

	green algae						
	<i>Chlorella</i> <i>freshwater</i>	<i>Chlorella</i> <i>marine</i>	<i>U. intestinalis</i>	<i>Cladophra</i>	<i>C. racemosa</i>	<i>C. lentilifera</i>	<i>U. rigida</i>
ชนิดกรดไขมัน							
C14:0 Myristic acid	2.35 ± 0.41	0	2.23 ± 0.31	17.57 ± 0.51	4.28 ± 0.99	3.89 ± 0.12	1.55 ± 0.08
C15:0 Pentadecanoic acid	0	0	0.62 ± 0.41	0	0	0	1.05 ± 0.33
C16:0 Palmitic acid	21.76 ± 0.66	23.84 ± 0.56	40.55 ± 4.46	50.8 ± 0.91	62.42 ± 8.53	55.68 ± 0.32	46.23 ± 1.05
C16:1 Palmitoleic acid	4.55 ± 0.11	5.74 ± 0.99	3.87 ± 0.44	9.80 ± 0.77	3.55 ± 0.21	5.90 ± 0.06	12.08 ± 3.10
C18:0 Stearic acid	1.01 ± 0.02	2.8 ± 0.03	0	0	0	2.19 ± 0.01	0
C18:1 Oleic acid	14.45 ± 0.37	9.4 ± 0.08	11.57 ± 1.05	21.82 ± 0.39	4.89 ± 0.46	3.83 ± 0.12	15.28 ± 3.11
C18:2 Linoleic acid	14.60 ± 0.22	23.46 ± 0.69	13.82 ± 1.21	0	8.30 ± 0.19	1.64 ± 0.10	1.25 ± 0.23
C18:3 γ-Linolenic acid	1.87 ± 0.03	0	0.83 ± 0.55	0	0	0	5.77 ± 0.24
C18:3 α-Linolenic acid	13.95 ± 0.21	20.42 ± 6.52	7.07 ± 0.42	0	3.15 ± 0.31	0	7.03 ± 1.77
C20:4 Arachidonic acid	0.21 ± 0.02	0.09 ± 0.12	1.95 ± 0.15	0	2.31 ± 0.48	0	0
C20:5 Eicosapentaenoic acid	0	0.09 ± 0.12	0.24 ± 0.16	0	0	0	0
C22:6 Docosahexaenoic acid	0.20 ± 0.04	0.065 ± 0.09	0	0	0	0	0.6
Other	25.04 ± 0.81	14.11 ± 6.54	17.26 ± 6.83	0.02 ± 0.01	11.13 ± 7.59	17.41 ± 0.39	9.14 ± 2.71
Total C16-C18	72.19	85.66	77.71	82.42	82.31	69.24	87.64

ตารางที่ 4.4 กรดไขมัน (ร้อยละ) ที่พบในสาหร่ายกลุ่มสาหร่ายสีแดง สีน้ำตาลและไดอะตอม (ค่าเฉลี่ย $\pm$ ค่ามาตรฐาน)

ชนิดกรดไขมัน	red algae	brown algae		diatom		
	<i>Acanthophora</i>	<i>Sargassum</i>	<i>Padina</i>	<i>Chaetoceros</i>	<i>Isochrysis</i>	<i>Tetraselmis</i>
C14:0 Myristic acid	6.07	7.65 $\pm$ 0.69	9.24 $\pm$ 0.66	12.72 $\pm$ 0.10	17.60 $\pm$ 2.0	6.20 $\pm$ 0.74
C15:0 Pentadecanoic acid	0	0	1.20 $\pm$ 0.37	0.68 $\pm$ 0.05	0	1.47 $\pm$ 0.18
C16:0 Palmitic acid	65.30 $\pm$ 10.71	60.67 $\pm$ 5.76	57.45 $\pm$ 3.89	28.99 $\pm$ 0.9	15.55 $\pm$ 2.26	44.14 $\pm$ 6.89
C16:1 Palmitoleic acid	0	5.05 $\pm$ 0.37	6.54 $\pm$ 0.95	26.00 $\pm$ 0.89	17.07 $\pm$ 8.77	24.49 $\pm$ 4.74
C18:0 Stearic acid	0	2.17 $\pm$ 0.28	5.76 $\pm$ 0.44	0	2.95 $\pm$ 0.67	1.10 $\pm$ 0.57
C18:1 Oleic acid	14.03 $\pm$ 1.88	12.89 $\pm$ 2.77	15.05 $\pm$ 1.36	17.54 $\pm$ 0.88	16.44 $\pm$ 6.20	7.14 $\pm$ 0.25
C18:2 Linoleic acid	0	2.12 $\pm$ 1.27	0	2.85 $\pm$ 0.07	1.94 $\pm$ 0.70	0
C18:3 γ -Linolenic acid	0	0	0	0	0	1.00 $\pm$ 0.54
C18:3 α -Linolenic acid	0	0	0	2.54 $\pm$ 0.34	0	0
C20:4 Arachidonic acid	0	0	0	0.86 $\pm$ 0.06	2.26 $\pm$ 1.78	1.47 $\pm$ 1.26
C20:5 Eicosapentaenoic acid	11.1 $\pm$ 0.92	0	0	0.85 $\pm$ 0.08	3.26 $\pm$ 3.43	2.28 $\pm$ 1.92
C22:6 Docosahexaenoic acid	0	0.65 $\pm$ 0.11	0	1.86 $\pm$ 0.71	0	0.58 $\pm$ 0.09
Other	6.54 $\pm$ 9.22	8.82 $\pm$ 2.42	4.79 $\pm$ 3.04	5.22 $\pm$ 0.31	22.96 $\pm$ 3.54	10.15 $\pm$ 0.25
Total C16-C18	79.33	82.9	84.8	77.92	53.95	77.87

ตารางที่ 4.5 กรดไขมัน (ร้อยละ) ที่พบใน *Botryococcus braunii* KMITL 2 (ค่าเฉลี่ย ± ค่ามาตรฐาน)

Fatty acid	Amount (%)	
	Hexane	Chlroform: methanol
Myristic acid (C14:0)	0.63	0.50
Pentadecanoic acid (C15:0)	-	0.14
Palmitic acid (C16:0)	35.91	32.48
Heptadecanoic acid (C17:0)	-	0.32
Stearic acid (C18:0)	11.52	12.98
Arachidic acid (C20:0)	-	0.15
Behenic acid (C22:0)	-	0.04
Lignoceric acid (C24:0)	-	0.06
Palmitoleic acid (C16:1n7)	2.36	1.91
trans-9-Elaidic acid (C18:1n9t)	-	0.18
cis-9-Oleic acid (C18:1n9c)	3.14	1.83
trans-Linolelaidic acid (C18:2n6t)	-	7.43
cis-9, 12-Linoleic acid (C18:2n6)	23.36	20.63
gamma-Linolenic acid (C18:3n6)	4.29	4.12
alpha-Linolenic acid (C18:3n3)	12.84	12.27
Arachidonic acid (C20:4n6)	-	0.04
cis-5, 8, 11, 14, 17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3)	1.01	-
Total C16-C18	93.42	94.15

4.2 การศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำมัน : การหาสภาวะในการเลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ไขมันสูง

4.2.1 ปริมาณไขมันใน *Hapalosiphon* sp. ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะการเลี้ยงที่แตกต่างกัน

การเลี้ยง *Hapalosiphon* sp. ที่ระยะเวลาการเลี้ยงต่างกันคือ 10, 20, 30 และ 40 วัน พบว่าการเลี้ยงที่ 20 วันให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 8.08 ± 0.49 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเลี้ยงที่ 30 และ 40 วัน แต่ไม่แตกต่างกับการเลี้ยง 10 วัน และพบว่าการเลี้ยงที่ 30 วัน ให้ปริมาณน้ำหนักรวบรวมแห้งที่สุดคือ 0.9771 ± 0.0719 g/L และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเลี้ยงที่ 10 และ 20 วัน แต่ไม่แตกต่างกับการเลี้ยง 40 วัน (ตารางที่ 4.6)

ตารางที่ 4.6 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ใน *Hapalosiphon* sp. ที่เลี้ยงภายใต้ระยะเวลาการเลี้ยงที่แตกต่างกัน

ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน)	ปริมาณไขมัน (%)	น้ำหนักแห้งของสาหร่าย (g/L)	ผลผลิตไขมัน (g/L)
10	7.68 ± 0.46 ^c	0.4143 ± 0.0074 ^a	0.0318
20	8.08 ± 0.49 ^c	0.6487 ± 0.0186 ^b	0.0524
30	5.37 ± 0.33 ^b	0.651 ± 0.0719 ^c	0.034
40	1.45 ± 0.26 ^a	0.9450 ± 0.0351 ^c	0.0137

(ความเข้มแสง 726 Lux, L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

การเลี้ยง *Hapalosiphon* sp. ที่ความเข้มแสงที่ต่างกันคือ 1.333, 317.5, 726 และ 1, 955 Lux พบว่าความเข้มแสงที่ 1.333 Lux ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 6.2973 ± 0. 2722 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มแสงที่ 317.5 Lux แต่ไม่แตกต่างกับความเข้มแสงที่ 10 วัน 726 และ 1, 955 Lux และความเข้มแสงที่ 1, 955 Lux ให้ปริมาณน้ำหนักสาหร่ายสูงที่สุดคือ 2.4862 ± 0.1329 g/L และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มแสงที่ 1.333, 317.5 และ 726 Lux (ตารางที่ 4.7)

ตารางที่ 4.7 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ใน *Hapalosiphon* sp. ที่เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน

ความเข้มแสง (Lux)	ปริมาณไขมัน (%)	น้ำหนักแห้งของสาหร่าย (g/L)	ผลผลิตไขมัน (g/L)
1.333	6.30 ± 0. 27 ^b	0.1937 ± 0.0418 ^a	0.0122
317.5	4.67 ± 0. 49 ^a	0.3721 ± 0.0169 ^a	0.0174
726	5.63 ± 0. 42 ^{ab}	0.8154 ± 0.0956 ^b	0.0459
1, 955	5.04 ± 0. 45 ^{ab}	2.4862 ± 0.1329 ^c	0.1253

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

การเลี้ยง *Hapalosiphon* sp. ที่ระยะเวลาการรับแสงที่ต่างกันคือ 24 : 0, 16 : 8, 14 : 10 และ 12 : 12 ชั่วโมง พบว่าระยะเวลาการรับแสงที่ 24 ชั่วโมงให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 11.0851 ± 0.9295 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการระยะเวลาการรับแสงที่ 16 :

8 และ 14 : 10 ชั่วโมง แต่ไม่แตกต่างกับระยะเวลาการรับแสง 12 : 12 ชั่วโมง ระยะเวลาการรับแสงที่ 16:8 ชั่วโมง ให้ปริมาณน้ำหนักรวบรวมของสาหร่ายสูงที่สุดคือ 1.1237 ± 0.0964 g/L และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการระยะเวลาการรับแสงที่ 24 : 0, 14 : 10 และ 12 : 12 ชั่วโมง (ตารางที่ 4.8)

ตารางที่ 4.8 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ใน *Hapalosiphon* sp. ที่เลี้ยงภายใต้ระยะเวลาการรับแสงที่แตกต่างกัน

Light : Dark (ชม.)	ปริมาณไขมัน (%)	น้ำหนักแห้งของสาหร่าย (g/L)	ผลผลิตไขมัน (g/L)
24 : 0	11.09 ± 0.46^c	0.2547 ± 0.0794^a	0.0282
16 : 8	9.08 ± 0.49^b	1.1237 ± 0.0964^c	0.1020
14 : 10	8.83 ± 0.49^b	0.6337 ± 0.0872^b	0.0560
12 : 12	7.25 ± 0.41^a	0.6501 ± 0.1129^b	0.0472

(ความเข้มแสง 726 Lux)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

การเลี้ยง *Hapalosiphon* sp. ที่ความเค็มที่ต่างกันคือ 0, 5, 10, 15 และ 20 ppt พบว่าความเค็มที่ 10 ppt ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 6.6346 ± 0.6856 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเค็มที่ 0, 5, 15 และ 20 ppt พบว่าความเค็มที่ 15 ppt ให้ปริมาณน้ำหนักรวบรวมของสาหร่ายสูงที่สุดคือ 0.7572 ± 0.0104 g/L และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเค็มที่ 0, 5 และ 10 ppt แต่ไม่แตกต่างกับความเค็มที่ 20 ppt (ตารางที่ 4.9)

ตารางที่ 4.9 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ใน *Hapalosiphon* sp. ที่เลี้ยงภายใต้ความเค็มที่แตกต่างกัน

ความเค็ม (ppt)	ปริมาณไขมัน (%)	น้ำหนักแห้งของสาหร่าย (g/L)	ผลผลิตไขมัน (g/L)
0	5.09 ± 0.32^a	0.4148 ± 0.0462^a	0.0211
5	4.98 ± 0.50^a	0.4674 ± 0.0832^a	0.0233
10	6.63 ± 0.34^b	0.4896 ± 0.0480^a	0.0325
15	4.21 ± 0.49^a	0.7572 ± 0.0104^b	0.0319
20	4.41 ± 0.47^a	0.6909 ± 0.0261^b	0.0304

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)



การเลี้ยง *Hapalosiphon* sp. ที่ปริมาณไนโตรเจนที่ต่างกันคือ 200, 100, 50, 25 และ 10 % พบว่าปริมาณไนโตรเจนที่ 100 % ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 10.5169 ± 0.5096 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณไนโตรเจนที่ 50 และ 200 % แต่ไม่แตกต่างกับปริมาณไนโตรเจนที่ 25 และ 10% พบว่าปริมาณไนโตรเจนที่ 25 % ให้ปริมาณน้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงที่สุดคือ 0.4377 ± 0.0373 g/L และไม่แตกต่างนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณไนโตรเจนที่ 200, 100, 50 และ 10 % (ตารางที่ 4.10)

ตารางที่ 4.10 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ใน *Hapalosiphon* sp. ที่เลี้ยงภายใต้ปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน

ปริมาณไนโตรเจน (%)	ปริมาณไขมัน (%)	น้ำหนักแห้งของสาหร่าย (g/L)	ผลผลิตไขมัน (g/L)
200	5.18 ± 0.88^a	0.3284 ± 0.0664^a	0.0170
100	10.52 ± 0.51^c	0.3176 ± 0.0496^a	0.0334
50	8.15 ± 0.79^b	0.3036 ± 0.0270^a	0.0248
25	9.66 ± 0.48^{bc}	0.4377 ± 0.0373^a	0.0423
10	9.65 ± 0.42^{bc}	0.3138 ± 0.0771^a	0.0303

(ความเข้มแสง 726 Lux, L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดังเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

การเลี้ยง *Hapalosiphon* sp. ที่ปริมาณฟอสฟอรัสที่ต่างกันคือ 200, 100, 50, 25 และ 10 % พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสที่ 25% ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 7.6644 ± 0.4499 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 200 % และไม่แตกต่างกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 100, 50 และ 10% พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสที่ 50% ให้ปริมาณน้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงที่สุดคือ 0.3894 ± 0.0365 g/L และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 200, 25 และ 10 % แต่ไม่แตกต่างกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 100% (ตารางที่ 4.11)

การเลี้ยง *Hapalosiphon* sp. ที่ปริมาณเหล็กที่ต่างกันคือ 250, 200, 150, 100 และ 50 % พบว่าปริมาณเหล็ก ที่ 150% ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 8.4254 ± 0.3781 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณเหล็กที่ 250 % และไม่แตกต่างกับปริมาณเหล็กที่ 200, 100 และ 50% พบว่าปริมาณเหล็ก ที่ 200% ให้ปริมาณน้ำหนักของสาหร่ายสูงที่สุดคือ 0.5271 ± 0.0550 g/L และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณเหล็กที่ 50 % และไม่แตกต่างกับปริมาณเหล็กที่ 250, 150 และ 100% (ตารางที่ 4.12)

ตารางที่ 4.11 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ใน *Hapalosiphon* sp. ที่เลี้ยงภายใต้ปริมาณฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน

ปริมาณฟอสฟอรัส (%)	ปริมาณไขมัน (%)	น้ำหนักแห้งของสาหร่าย (g/L)	ผลผลิตไขมัน (g/L)
200	5.50 ± 0.26 ^a	0.3273 ± 0.0354 ^{ab}	0.0180
100	7.35 ± 0.37 ^b	0.2483 ± 0.0186 ^a	0.0183
50	7.49 ± 0.49 ^b	0.3894 ± 0.0365 ^b	0.0291
25	7.66 ± 0.45 ^b	0.3761 ± 0.0364 ^b	0.0288
10	7.32 ± 0.22 ^b	0.2887 ± 0.0186 ^{ab}	0.0211

(ความเข้มแสง 726 Lux, L:D : 24:0)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 4.12 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ใน *Hapalosiphon* sp. ที่เลี้ยงภายใต้ปริมาณเหล็กที่แตกต่างกัน

ปริมาณเหล็ก (%)	ปริมาณไขมัน (%)	น้ำหนักแห้งของสาหร่าย (g/L)	ผลผลิตไขมัน (g/L)
250	4.80 ± 0.48 ^a	0.3273 ± 0.0354 ^{ab}	0.0208
200	7.92 ± 0.50 ^b	0.2483 ± 0.0186 ^a	0.0417
150	8.43 ± 0.38 ^b	0.3894 ± 0.0365 ^b	0.0383
100	7.97 ± 0.50 ^b	0.3761 ± 0.0364 ^b	0.0320
50	7.15 ± 0.35 ^b	0.2887 ± 0.0186 ^{ab}	0.0248

(ความเข้มแสง 726 Lux, L:D : 24:0)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

4.2.2 ปริมาณไขมันใน *Mastigocladopsis* sp. ที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน
การเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย *Mastigocladopsis* sp. ในเวลาที่แตกต่างกันคือ 10, 20, 30 และ 40 วัน พบว่าที่ระยะเวลาในการเลี้ยงที่ 40 วัน มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (μ) สูงสุดคือ 0.101±0.006 day⁻¹ มีความแตกต่างกับระยะเวลาในการเลี้ยงที่ 10 วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 1.785±0.252 g/L มีความแตกต่างกับระยะเวลาในการเลี้ยงอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และให้ปริมาณไขมันสูงสุดคือ 0.072±0.013 g/L แต่ในด้านของปริมาณไขมัน พบว่าระยะเวลาในการเลี้ยงที่ 20 วัน ให้ปริมาณไขมันสูงสุดร้อยละ 7.046±0.170 % ซึ่งมีความแตกต่างกับระยะเวลาในการเลี้ยงที่ 40 วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

($p<0.05$) และให้ผลผลิตไขมันสูงสุดคือ 6.328 ± 0.256 mg/L/d ซึ่งมีความแตกต่างกับระยะเวลาในการเลี้ยงที่ 10 และ 40 วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) (ตารางที่ 4.13)

ตารางที่ 4.13 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของ *Mastigocladopsis* sp. ที่เลี้ยงในระยะเวลาในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน

ระยะเวลาในการเลี้ยง (day)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
10	0.064 ± 0.006^a	0.103 ± 0.032^a	6.440 ± 0.379^b	0.006 ± 0.002^a	4.147 ± 0.397^a
20	0.090 ± 0.004^b	0.298 ± 0.084^a	7.046 ± 0.170^b	0.025 ± 0.002^a	6.328 ± 0.256^b
30	0.095 ± 0.006^b	1.145 ± 0.056^b	5.734 ± 0.382^b	0.067 ± 0.002^b	5.438 ± 0.365^b
40	0.101 ± 0.006^b	1.785 ± 0.252^c	4.306 ± 0.791^a	0.072 ± 0.013^b	4.368 ± 0.276^a

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

การเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย *Mastigocladopsis* sp. โดยให้ความเข้มแสงที่แตกต่างกันคือ 0, 400, 740 และ 4, 120 Lux พบว่าในความเข้มแสงที่ 0 Lux มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.310 ± 0.098 ต่อวัน ไม่มีความแตกต่างกับความเข้มแสงอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และความเข้มแสงที่ 4, 120 Lux ให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 1.200 ± 0.086 g/L มีความแตกต่างกับความเข้มแสงอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) ในด้านของปริมาณไขมัน พบว่าความเข้มแสงที่ 4, 120 Lux ให้ปริมาณไขมันสูงสุดร้อยละ 23.31 ± 1.92 % ให้ปริมาณไขมัน 0.295 ± 0.023 g/L และให้ผลผลิตไขมัน 50.697 ± 3.257 mg/L/d ซึ่งมีความแตกต่างกับความเข้มแสงอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) (ตารางที่ 4.14)

การเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย *Mastigocladopsis* sp. โดยให้ระยะเวลาการให้แสงที่แตกต่างกันคือ 24: 0, 16: 8, 14: 10 และ 12: 12 ชั่วโมง (สว่าง: มืด ชม.) พบว่าที่ระยะเวลาการให้แสงที่ 14:10 ชั่วโมง มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.076 ± 0.014 /day มีความแตกต่างกับการให้แสงที่ 12:12 ชั่วโมงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 1.145 ± 0.155 g/L ไม่มีความแตกต่างกับการให้แสงอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) ในวันที่ 30 ของการเลี้ยง ในด้านของปริมาณไขมัน พบว่าระยะเวลาการให้แสงที่ 16:8 ชั่วโมง ให้ปริมาณไขมันสูงสุดร้อยละ 7.114 ± 1.216 % มีความแตกต่างกับการให้แสงที่ 14:10 ชั่วโมง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และให้ปริมาณไขมันคือ 0.092 ± 0.015 g/L มีความแตกต่างกับการให้แสงอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และให้ผลผลิตไขมัน 0.319 ± 0.105 mg/L/d ซึ่งมีความแตกต่าง

กับการให้แสงที่ 12:12 ชั่วโมง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) ในวันที่ 30 ของการเลี้ยง (ตารางที่ 4.15)

ตารางที่ 4.14 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของ *Mastigocladopsis* sp. ที่เลี้ยงในความเข้มแสงที่แตกต่างกัน

ความเข้มแสง (Lux)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
0	0.310 ± 0.098^a	0.220 ± 0.008^a	9.86 ± 0.26^{ab}	0.022 ± 0.001^a	30.545 ± 9.651^b
400	0.170 ± 0.014^a	0.415 ± 0.040^a	12.90 ± 2.53^b	0.054 ± 0.004^a	21.969 ± 1.771^{ab}
740	0.165 ± 0.016^a	0.430 ± 0.105^a	7.12 ± 0.46^a	0.033 ± 0.007^a	11.779 ± 1.132^a
4120	0.217 ± 0.014^a	1.200 ± 0.086^b	23.31 ± 1.92^c	0.295 ± 0.023^b	50.697 ± 3.257^c

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

ตารางที่ 4.15 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของ *Mastigocladopsis* sp. ที่เลี้ยงในระยะการให้แสงที่แตกต่างกัน

สว่าง : มืด (ชม.)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
16:8	0.056 ± 0.009^{ab}	1.145 ± 0.155^a	7.114 ± 1.216^b	0.092 ± 0.015^b	3.953 ± 0.610^b
14:10	0.076 ± 0.014^b	1.035 ± 0.190^a	3.989 ± 0.291^a	0.039 ± 0.006^a	3.050 ± 0.559^{ab}
12:12	0.035 ± 0.016^a	1.010 ± 0.149^a	4.444 ± 1.119^{ab}	0.042 ± 0.007^a	1.565 ± 0.706^a
24:0	0.067 ± 0.004^{ab}	0.935 ± 0.120^a	5.253 ± 0.301^{ab}	0.045 ± 0.004^a	3.504 ± 0.203^b

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

การเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย *Mastigocladopsis* sp. โดยให้ปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกันคือ 10, 25, 50, 100 และ 200 % พบว่าปริมาณไนโตรเจนที่ 200 % มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ $0.102 \pm 0.027 \text{ day}^{-1}$ ไม่มีความแตกต่างกับระดับไนโตรเจนอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และพบว่าปริมาณไนโตรเจนที่ 50 % ให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ $1.050 \pm 0.141 \text{ g/L}$ มีความแตกต่างกับปริมาณไนโตรเจนที่ 10 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) ให้ปริมาณไขมันทั้งหมดสูงสุดร้อยละ $7.960 \pm 1.288 \%$ ซึ่งมีความแตกต่างกับปริมาณไนโตรเจนที่ 10,

25 และ 100 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) ให้ปริมาณไขมันสูงสุด 0.077 ± 0.011 g/L ซึ่งมีความแตกต่างกับปริมาณไนโตรเจนอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) แต่ปริมาณไนโตรเจนที่ 200 % กลับให้ผลผลิตไขมันสูงสุดที่ 6.504 ± 1.717 mg/L/d ไม่มีความแตกต่างกับระดับไนโตรเจนที่ 50 และ 100 % แต่มีความแตกต่างกับปริมาณไนโตรเจนที่ 10 และ 25 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) (ตารางที่ 4.16)

ตารางที่ 4.16 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของ *Mastigocladopsis* sp. ที่เลี้ยงในระยะเวลาในปริมาณไนโตรเจนแตกต่างกัน

ไนโตรเจน (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
10	0.052 ± 0.012^a	0.615 ± 0.040^a	0.172 ± 0.004^a	0.001 ± 0.000^a	0.090 ± 0.021^a
25	0.091 ± 0.015^a	0.985 ± 0.092^b	0.144 ± 0.006^a	0.001 ± 0.000^a	0.131 ± 0.021^a
50	0.071 ± 0.013^a	1.050 ± 0.141^b	7.960 ± 1.288^c	0.077 ± 0.011^c	5.651 ± 1.012^b
100	0.063 ± 0.022^a	0.994 ± 0.173^b	5.400 ± 0.083^b	0.052 ± 0.009^b	3.397 ± 1.162^b
200	0.102 ± 0.027^a	0.837 ± 0.029^{ab}	6.382 ± 0.168^{bc}	0.054 ± 0.001^b	6.504 ± 1.717^b

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

การเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย *Mastigocladopsis* sp. โดยให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่ต่างกันคือ 10, 25, 50, 100 และ 200 % พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสที่ 100 % มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.165 ± 0.002 day⁻¹ ไม่มีความแตกต่างกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 50 และ 200 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสที่ 10 % ให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 1.190 ± 0.509 g/L ไม่มีความแตกต่างกับปริมาณฟอสฟอรัสอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และพบว่าที่ปริมาณฟอสฟอรัส 200 % ให้ปริมาณไขมันทั้งหมดสูงสุดร้อยละ 4.826 ± 0.144 % ไม่มีความแตกต่างกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 25 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และปริมาณไขมันสูงสุด คือ 0.036 ± 0.004 g/L ไม่มีความแตกต่างกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 25 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) ที่ผลผลิตไขมัน ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 7.714 ± 0.090 mg/L/d มีความแตกต่างกับปริมาณฟอสฟอรัสอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) (ตารางที่ 4.17)

การเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย *Mastigocladopsis* sp. โดยให้ปริมาณเหล็กที่ต่างกันคือ 50, 100, 150, 200 และ 250 % พบว่าปริมาณเหล็กที่ 200 % มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.082 ± 0.009 day⁻¹ ไม่มีความแตกต่างกับปริมาณเหล็กในทุกระดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และที่ปริมาณเหล็ก 100 % ให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 0.810 ± 0.420 g/L ไม่มีความแตกต่างกับปริมาณเหล็กในทุกระดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) และปริมาณเหล็กที่

50 % ให้ปริมาณไขมันทั้งหมดสูงสุดร้อยละ 9.09 ± 2.48 % มีความแตกต่างกับที่ปริมาณเหล็กในระดับอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) และให้ปริมาณไขมันกับผลผลิตไขมันสูงสุดอีกด้วย คือ 0.537 ± 0.315 g/L และ 13.529 ± 0.836 mg/L/d ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกับปริมาณเหล็กในทุกระดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) (ตารางที่ 4.18)

ตารางที่ 4.17 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของ *Mastigocladopsis* sp. ที่เลี้ยงในปริมาณฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน

ฟอสฟอรัส (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
10	0.151 ± 0.003^a	1.190 ± 0.509^a	3.308 ± 0.188^a	0.025 ± 0.004^a	4.990 ± 0.094^a
25	0.145 ± 0.003^a	0.930 ± 0.165^a	4.420 ± 0.169^b	0.036 ± 0.003^b	6.430 ± 0.115^c
50	0.161 ± 0.002^b	0.715 ± 0.033^a	3.619 ± 0.100^a	0.026 ± 0.001^a	5.819 ± 0.068^b
100	0.165 ± 0.002^b	0.815 ± 0.074^a	3.777 ± 0.330^a	0.031 ± 0.003^{ab}	6.218 ± 0.058^c
200	0.160 ± 0.002^b	0.760 ± 0.087^a	4.826 ± 0.144^b	0.036 ± 0.004^b	7.714 ± 0.090^d

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ตารางที่ 4.18 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของ *Mastigocladopsis* sp. ที่เลี้ยงในปริมาณเหล็กที่แตกต่างกัน

เหล็ก (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
50	0.067 ± 0.004^a	0.590 ± 0.185^a	9.09 ± 2.48^b	0.537 ± 0.315^b	13.529 ± 0.836^c
100	0.063 ± 0.007^a	0.810 ± 0.420^a	3.48 ± 0.16^a	0.033 ± 0.004^a	2.136 ± 0.236^a
150	0.069 ± 0.007^a	0.755 ± 0.053^a	3.81 ± 0.18^a	0.029 ± 0.002^a	2.618 ± 0.249^a
200	0.082 ± 0.009^a	0.800 ± 0.018^a	3.69 ± 0.15^a	0.029 ± 0.002^a	3.031 ± 0.334^a
250	0.063 ± 0.003^a	0.525 ± 0.076^a	3.87 ± 0.32^a	0.072 ± 0.001^a	8.189 ± 0.426^b

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

การเลี้ยงไฮยาโนแบคทีเรีย *Mastigocladopsis* sp. ในความเค็ม ที่ต่างกันคือที่ความเค็มที่ 0, 5, 10, 15 และ 20 ppt พบว่าความเค็มที่ 20 ppt ส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ มากที่สุดคือ $0.065 \pm 0.011 \text{ day}^{-1}$ มีความแตกต่างกับความเค็มที่ 20 ppt อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) น้ำหนักแห้งของสาหร่ายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าความเค็มที่ 20 ppt ให้ น้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงสุด คือ $2.445 \pm 0.487 \text{ g/L}$ มีความแตกต่างกับความเค็มที่ระดับอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ในด้านของปริมาณไขมันพบว่าที่ความเค็มที่ 10 ppt ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ $4.442 \pm 0.332 \%$ มีความแตกต่างกับความเค็มที่ระดับ 0, 5 และ 20 ppt อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ผลผลิตไขมันในระดับความเค็มที่ 20 ppt ให้ปริมาณไขมันสูงสุด คือ $0.072 \pm 0.011 \text{ g/L}$ มีความแตกต่างกับความเค็มที่ระดับอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) และผลผลิตไขมันที่ความเค็ม 20 ppt ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ $0.194 \pm 0.034 \text{ mg/L/d}$ ไม่มีความแตกต่างกับความเค็มที่ 10 ppt อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) (ตารางที่ 4.19)

ตารางที่ 4.19 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันของ *Mastigocladopsis* sp. ที่เลี้ยงในความเค็มที่แตกต่างกัน

ความเค็ม (ppt)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
0	0.021 ± 0.008^a	0.540 ± 0.060^a	2.609 ± 0.276^a	0.014 ± 0.001^a	0.056 ± 0.021^a
5	0.014 ± 0.005^a	0.660 ± 0.116^a	3.017 ± 0.351^b	0.019 ± 0.002^a	0.042 ± 0.015^a
10	0.041 ± 0.010^a	0.985 ± 0.172^b	4.442 ± 0.332^c	0.043 ± 0.003^a	0.182 ± 0.045^b
15	0.004 ± 0.001^a	1.505 ± 0.184^c	4.085 ± 0.473^c	0.061 ± 0.007^a	0.020 ± 0.005^a
20	0.065 ± 0.011^b	2.445 ± 0.487^d	2.977 ± 0.482^d	0.072 ± 0.011^b	0.194 ± 0.034^b

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

4.2.3 ปริมาณไขมันใน *Oscillatoria limnetica* ที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน

จากการศึกษาเลี้ยง *Oscillatoria limnetica* ในของอาหารสูตร BG-11 ที่มีระยะเวลาการเลี้ยงที่ 10, 20, 30 และ 40 วันพบว่าระยะเวลาการเลี้ยงที่ 40 วันได้น้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงสุด คือ $0.112 \pm 0.010 \text{ g/L}$ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระยะเวลาในการเลี้ยง ปริมาณไขมันที่ 40 วันให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ $19.45 \pm 0.61 \%$ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระยะเวลาการเลี้ยงอื่น และที่ผลผลิตไขมัน g/L/d ที่ 40 วันให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ $19.45 \pm 0.61 \text{ g/L/d}$ ซึ่งทุกระยะเวลามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลของการใช้ระยะเวลาการเลี้ยงส่งผลทั้งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตไขมันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีการ

เจริญเติบโตดี ทำให้มีผลผลิตไขมันสูงขึ้นตามลำดับและส่งผลต่อน้ำหนักสาหร่ายแห้งและปริมาณไขมันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วย (ตารางที่ 4.20)

ตารางที่ 4.20 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ของ *O. limnetica* ที่เลี้ยงในระยะเวลาการเลี้ยงที่ต่างกัน

ระยะเวลาในการเลี้ยง (day)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
10	0.036±0.003 ^a	0.280±0.042 ^a	12.53±0.46 ^a	0.031±0.002 ^a	0.338±0.111 ^a
20	0.058±0.002 ^b	0.370±0.010 ^{ab}	14.20±1.64 ^a	0.053±0.001 ^a	0.651±0.189 ^b
30	0.086±0.004 ^c	1.520±0.526 ^b	14.59±0.61 ^a	0.181±0.053 ^{ab}	0.911±0.284 ^c
40	0.112±0.010 ^d	1.420±0.531 ^{ab}	19.45±0.61 ^a	0.275±0.104 ^b	1.807±0.284 ^d

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

การเลี้ยง *O. limnetica* ในความเค็มที่ต่างกันคือที่ความเค็มที่ 0, 5, 10, 15 และ 20 ppt พบว่าความเค็มไม่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (/day) โดยทุกความเข้มข้นของความเค็มมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ น้ำหนักแห้งของสาหร่ายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าความเค็มที่ 20 ppt ให้น้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงสุด คือ 1.590 ± 0.072 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเค็มที่ 0 – 5 ppt ปริมาณไขมันที่ความเค็ม 0 ppt ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 7.25 ± 1.07 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเค็มที่ทุกระดับของความเค็ม ผลผลิตไขมัน (g/L) ที่ความเค็มทุกๆความเค็มให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และที่ผลผลิตไขมัน (g/L/d) ที่ความเค็มที่ 0 ppt ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.493 ± 0.061 ความเค็มส่งผลทั้งต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมัน คือเมื่อมีการเพิ่มความเค็ม (ppt) พบว่าให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งสาหร่ายและปริมาณไขมันลดลงแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4.21)

จากการศึกษาเลี้ยง *Oscillatoria limnetica* ในความเข้มข้นของไนโตรเจนของอาหารสูตร BG-11 ที่ 10, 25, 50, 100 และ 200% พบว่า ไนโตรเจนไม่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (/day) โดยทุกความเข้มข้นของไนโตรเจนมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ น้ำหนักแห้งของสาหร่ายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าความเข้มข้นที่ 10% ให้น้ำหนักแห้งของสาหร่ายต่ำสุด คือ 0.990 ± 0.195 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มข้นอื่น ปริมาณไขมันที่ความเข้มข้นไนโตรเจน 50% ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 9.08 ± 1.88 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มข้นไนโตรเจนทุกระดับ

ของความเข้มข้น ผลผลิตไขมัน (g/L) ที่ความเข้มข้นทุก ๆ ความเข้มข้นให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และที่ผลผลิตไขมัน (g/L/d) ที่ความเข้มข้นที่ 50% ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.851 ± 0.201 (ตารางที่ 4.22) การลดปริมาณไนโตรเจนลงจะทำให้มีปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นคาดว่าไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักของสาหร่ายเมื่อสาหร่ายขาดธาตุอาหารจึงมีการยับยั้งหรือลดการเจริญเติบโตลงจึงทำให้สาหร่ายกักเก็บไขมันไว้มากกว่าที่จะนำมาใช้ในการเจริญเติบโตต่อไป

ตารางที่ 4.21 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ของ *O. limnetica* ที่เลี้ยงที่ระดับความเค็มแตกต่างกัน

ความเค็ม (ppt)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
0	0.068 ± 0.008^a	0.700 ± 0.066^a	7.25 ± 1.07^a	0.050 ± 0.007^a	0.493 ± 0.061^a
5	0.061 ± 0.004^a	0.990 ± 0.093^a	5.56 ± 0.52^b	0.055 ± 0.005^a	0.341 ± 0.023^b
10	0.054 ± 0.006^a	1.335 ± 0.088^b	5.04 ± 0.55^b	0.067 ± 0.007^a	0.275 ± 0.030^c
15	0.059 ± 0.024^a	1.395 ± 0.073^b	6.25 ± 0.54^c	0.087 ± 0.007^a	0.370 ± 0.151^b
20	0.035 ± 0.004^a	1.590 ± 0.072^b	3.99 ± 0.53^d	0.063 ± 0.008^a	0.142 ± 0.016^c

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ตารางที่ 4.22 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ของ *O. limnetica* ที่เลี้ยงในความเข้มข้นของปริมาณไนโตรเจนแตกต่างกัน

ไนโตรเจน (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
200	0.115 ± 0.004^a	1.185 ± 0.185^a	4.23 ± 0.19^a	0.049 ± 0.008^a	0.360 ± 0.112^a
100	0.123 ± 0.009^a	1.350 ± 0.093^a	5.73 ± 0.12^{ab}	0.075 ± 0.004^a	0.532 ± 0.180^a
50	0.121 ± 0.006^a	1.555 ± 0.098^a	9.08 ± 1.88^b	0.129 ± 0.010^a	0.851 ± 0.201^b
25	0.089 ± 0.030^a	1.140 ± 0.395^a	7.55 ± 1.10^{ab}	0.100 ± 0.017^a	0.488 ± 0.247^a
10	0.100 ± 0.010^a	0.990 ± 0.195^b	6.94 ± 1.15^{ab}	0.062 ± 0.014^a	0.563 ± 0.167^a

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)



จากการศึกษาเลี้ยง *Oscillatoria limnetica* ในความเข้มข้นของฟอสฟอรัสของอาหารสูตร BG-11 ที่ 10, 25, 50, 100 และ 200% พบว่าความเข้มข้นที่ 200% ให้น้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงสุด คือ 1.345 ± 0.010 (g/L) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มข้น 10, 25 และ 50% ปริมาณไขมันที่ความเข้มข้นฟอสฟอรัส 50% ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 9.08 ± 1.88 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มข้นของฟอสฟอรัสทุกระดับของความเข้มข้นให้ ผลผลิตไขมัน (g/L) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และที่ผลผลิตไขมัน ($\text{g L}^{-1} \text{day}^{-1}$) ที่ความเข้มข้นที่ 100% ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.088 ± 0.011 ฟอสฟอรัสไม่ส่งผลทั้งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตไขมัน (g/L/d) แต่ส่งผลต่อน้ำหนักสาหร่ายแห้งและผลผลิตไขมัน (g/L) เมื่อได้สาหร่ายแห้งมากก็จะได้ปริมาณไขมันเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4.23) จากการทดลองพบว่าที่ฟอสฟอรัสที่ 100% ได้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือฟอสฟอรัสเป็นอีกธาตุอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตเมื่อมีมากเกินไปทำให้มีการเจริญเติบโตมากใช้พลังงานมากแต่เมื่อน้อยจะได้สาหร่ายที่ปริมาณน้อยทำให้ได้ไขมันไม่ดีเท่ากับระดับที่เหมาะสมกับความต้องการในสูตรอาหาร

ตารางที่ 4.23 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ของ *O. limnetica* ที่เลี้ยงในความเข้มข้นของปริมาณฟอสฟอรัสแตกต่างกัน

ฟอสฟอรัส (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
200	0.123 ± 0.002^a	1.345 ± 0.010^c	5.92 ± 0.49^a	0.080 ± 0.001^{bc}	0.559 ± 0.166^a
100	0.118 ± 0.002^a	1.260 ± 0.050^c	7.67 ± 2.05^a	0.088 ± 0.011^c	0.737 ± 0.164^a
50	0.128 ± 0.008^a	1.040 ± 0.029^b	6.04 ± 0.48^a	0.067 ± 0.004^b	0.616 ± 0.191^a
25	0.103 ± 0.035^a	0.825 ± 0.030^a	6.07 ± 0.52^a	0.047 ± 0.002^a	0.627 ± 0.210^a
10	0.118 ± 0.006^a	0.820 ± 0.034^a	6.21 ± 0.09^a	0.050 ± 0.002^a	0.565 ± 0.188^a

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

จากการศึกษาเลี้ยง *Oscillatoria limnetica* ในปริมาณเหล็กที่แตกต่างกันของอาหารสูตร BG-11 ที่ 50, 100, 150, 200 และ 250% พบว่าความเข้มข้นที่ 250% ให้น้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงสุด คือ 1.020 ± 0.278 (g/L) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกความเข้มข้น ปริมาณไขมันที่ความเข้มข้นเหล็ก 100% ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ $6.67 \pm 0.29\%$ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มข้นของเหล็กทุกระดับ และที่ผลผลิตไขมัน (g/L/d) ที่ความเข้มข้นที่ 200% ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.562 ± 0.188 (ตารางที่ 4.24) เหล็กส่งผลทั้งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตไขมันที่ความเข้มข้น 200% มีการเจริญเติบโตดี

ที่สุดและมีผลผลิตไขมันสูงที่สุดซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มข้นอื่น แต่ส่งผลต่อน้ำหนักสาหร่ายแห้งและ % ของปริมาณไขมัน คาดว่าเหล็กสามารถช่วยดูดซึมไนโตรเจนเมื่อเหล็กมีปริมาณน้อยทำให้ดูดซับไนโตรเจนไปใช้งานไม่ได้จึงเกิดความเครียดและเกิดการสะสมไขมันมากกว่านำไปใช้

ตารางที่ 4.24 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ของ *O. limnetica* ที่เลี้ยงในปริมาณเหล็กที่แตกต่างกัน

ระดับเหล็ก (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
250	0.089±0.011 ^b	1.020±0.278 ^a	5.67±0.39 ^a	0.066±0.013 ^b	0.374±0.127 ^a
200	0.112±0.012 ^{ab}	0.975±0.278 ^a	6.22±0.32 ^a	0.053±0.014 ^{ab}	0.562±0.188 ^b
150	0.101±0.003 ^{ab}	0.825±0.074 ^a	5.08±0.66 ^a	0.040±0.003 ^{ab}	0.405±0.114 ^a
100	0.107±0.005 ^b	0.835±0.102 ^a	6.67±0.29 ^a	0.059±0.004 ^b	0.529±0.167 ^b
50	0.085±0.003 ^a	0.495±0.034 ^a	5.64±0.62 ^a	0.029±0.002 ^a	0.365±0.104 ^a

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

จากการศึกษาเลี้ยง *Oscillatoria limnetica*. ในของอาหารสูตร BG-11 ที่มีความเข้มแสง 0, 400, 740 และ 4120 Lux พบว่าความเข้มแสงที่ 4120 Lux ให้น้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงสุดคือ 0.870±0.318 (g/L) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกความเข้มแสง และปริมาณไขมันที่ความเข้มแสง 0 Lux ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 14.64±1.43 % มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มแสงทุกระดับ และที่ผลผลิตไขมัน (g/L/d) ที่ความเข้มแสง 4120 Lux ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.264±0.084 g/L/d (ตารางที่ 4.25)ความเข้มแสงส่งผลทั้งต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมันที่ความเข้มแสง 0 Lux มีการเจริญเติบโตดีที่สุดและมีปริมาณไขมันสูงที่สุดซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มแสงอื่น แต่งไม่ส่งผลต่อน้ำหนักสาหร่ายแห้งและผลผลิตไขมัน

จากการทดลองผลที่ได้นั้นเมื่อแสงที่ 0 Lux มีปริมาณไขมันสูงที่สุดแต่มีการเจริญเติบโตต่ำที่สุด อาจเป็นเพราะว่าสาหร่ายต้องการแสงไปใช้ในขบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตเมื่อไม่มีแสงทำให้สาหร่ายเกิดความเครียดและไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จึงมีการสะสมอาหารและไขมันไว้ทำให้มีปริมาณไขมันมากที่สุด

ตารางที่ 4.25 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ของ *O. limnetica* ที่เลี้ยงในความเข้มข้นของ ปริมาณความเข้มแสงต่างกัน

ความเข้มแสง (Lux)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
0	0.026±0.005 ^a	0.260±0.042 ^a	14.64±1.43 ^b	0.039±0.006 ^a	0.252±0.080 ^a
400	0.029±0.008 ^a	2.575±2.089 ^a	6.97±1.66 ^a	0.048±0.014 ^a	0.135±0.030 ^a
470	0.038±0.005 ^{ab}	0.660±0.119 ^a	5.80±0.45 ^a	0.037±0.006 ^a	0.166±0.056 ^a
4120	0.053±0.008 ^b	0.870±0.318 ^a	6.61±0.96 ^a	0.067±0.018 ^a	0.264±0.084 ^a

(L:D : 24:0 h)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

จากการศึกษาเลี้ยง *O. limnetica* ในของอาหารสูตร BG-11 ที่มีการให้แสงต่างเวลากันที่ 16:8, 14:10, 12:12 และ 24:0 ชั่วโมงพบว่าระยะเวลาการให้แสงที่ 14:10 ให้น้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงสุด คือ 0.7800 ± 0.314 (g/L) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกช่วงเวลาและปริมาณไขมันที่ระยะเวลาที่ 12:12 ชั่วโมงให้ปริมาณไขมันสูงสุดคือร้อยละ 11.79 ± 0.40 % แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระยะเวลาการให้แสงทุกช่วงเวลาและที่ผลผลิตไขมัน (g/L/d) ที่ช่วงเวลา 14:10 ชั่วโมง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อช่วงเวลา 16:8 และ 24:0 (ตารางที่ 4.26) จากระยะเวลาการให้แสงส่งผลทั้งต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมัน 14:10 มีการเจริญเติบโตดีที่สุดและแต่ละช่วงเวลามีปริมาณไขมันสูงสุดคือ 12:12 เนื่องจากอาหารบางชนิดของสาหร่ายจะทำงานได้ดีในบางสภาวะซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและทางกายภาพ โดยเฉพาะกลางวัน-กลางคืน

ตารางที่ 4.26 ปริมาณไขมัน (ร้อยละน้ำหนักแห้ง) ของ *O. limnetica* ที่เลี้ยงในระยะเวลาการให้แสงต่างกัน

ระยะเวลาการให้แสง (ชั่วโมง)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
16:8	0.034±0.010 ^a	0.670±0.277 ^a	9.06±0.48 ^a	0.040±0.004 ^a	0.227±0.112 ^a
14:10	0.036±0.006 ^a	0.780±0.314 ^a	10.42±0.36 ^a	0.091±0.030 ^a	0.297±0.114 ^b
12:12	0.059±0.006 ^a	0.490±0.066 ^a	11.79±0.40 ^a	0.054±0.007 ^a	0.550±0.187 ^{ab}
24:0	0.077±0.047 ^a	0.140±0.318 ^a	10.09±0.40 ^a	0.014±0.007 ^a	0.755±0.482 ^a

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

4.2.4 ปริมาณไขมันใน *Botryococcus braunii* ที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน

จากการศึกษาการเลี้ยงสาหร่าย *B. braunii* เลี้ยงที่ความเข้มแสงแตกต่างกัน คือ 0, 400, 740 และ 4120 Lux พบว่าที่ความเข้มแสง 4120 Lux มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด คือ 0.179 ± 0.009 ต่อวัน โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุดที่ 4120 Lux คือ 2.025 ± 0.120 กรัม/ลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มแสงที่แตกต่างกัน ปริมาณไขมัน(%)พบว่าที่ความเข้มแสง 4120 Lux มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.854 ± 0.875 โดยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับความเข้มแสงที่ 740, 400, 0 Lux ความเข้มแสงที่ 4120 Lux ปริมาณไขมันสูงสุด คือ 1.957 ± 0.616 กรัม/ลิตร และที่ผลผลิตไขมัน ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 0.280 ± 0.016 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระยะการให้แสงที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.27)

ตารางที่ 4.27 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *B. braunii* ในความเข้มแสงที่แตกต่างกัน

ความเข้มแสง (Lux)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
0	0.066 ± 0.002^a	0.320 ± 0.021^a	6.273 ± 0.733^a	0.330 ± 0.094^a	0.020 ± 0.001^a
400	0.100 ± 0.006^b	0.640 ± 0.106^b	$7.720 \pm 0.242^{a,b}$	0.580 ± 0.190^a	0.049 ± 0.008^b
740	0.145 ± 0.012^c	1.035 ± 0.035^c	8.304 ± 0.280^b	0.837 ± 0.262^a	0.085 ± 0.002^c
4120	0.179 ± 0.009^d	2.025 ± 0.120^d	13.854 ± 0.875^c	1.957 ± 0.616^b	0.280 ± 0.016^d

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

จากการศึกษาการเลี้ยงสาหร่าย *B. braunii* เลี้ยงที่ระยะเวลาให้แสงแตกต่างกัน คือ 16:8, 14:10, 12:12, 24:0 พบว่าพบว่าที่ระยะให้แสงมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุดที่ 24:0 คือ 0.126 ± 0.011 กรัม/ลิตร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระยะให้แสงที่แตกต่างกัน ปริมาณไขมัน(%)พบว่าที่ระยะให้แสง 24:0 มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 16.995 ± 0.062 โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับระยะให้แสงที่ 12:12, 14:10, 16:8 ที่ระยะให้แสง 24:0 มีปริมาณไขมันสูงสุด คือ 1.732 ± 0.491 กรัม/ลิตร และที่ผลผลิตไขมัน ให้ผลผลิตสูงสุด 0.230 ± 0.011 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระยะการให้แสงที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน (ตารางที่ 4.28)

ตารางที่ 4.28 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *B. braunii* ในระยะให้แสงที่ต่างกัน

Light : Dark (h)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
16:8	0.101±0.008 ^a	1.600±0.074 ^a	14.321±0.062 ^a	1.175±0.391 ^a	0.115±0.004 ^a
14:10	0.108±0.007 ^a	1.665±0.151 ^a	15.241±0.872 ^a	1.220±0.392 ^a	0.127±0.012 ^a
12:12	0.125±0.008 ^a	1.685±0.143 ^a	15.942±0.935 ^a	1.302±0.355 ^a	0.140±0.012 ^a
24:0	0.126±0.011 ^a	1.820±0.083 ^a	16.995±0.062 ^a	1.732±0.491 ^a	0.230±0.011 ^b

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

จากการศึกษาการเลี้ยงสาหร่าย *B. braunii* เลี้ยงที่ความเค็มแตกต่างกัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 ppt พบว่าที่ความเค็ม 20 ppt มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด คือ 0.106 ± 0.009 ต่อวัน โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุดที่ความเค็ม 15 ppt คือ 2.145 ± 0.110 กรัม/ลิตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับความเค็มที่ 20 และ 10 ppt ตามลำดับ ปริมาณไขมัน(%)พบว่าที่ความเค็ม 0 ppt มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.817 ± 0.386 ที่ความเค็ม 0 ppt ให้ปริมาณไขมันสูงสุด คือ 0.847 ± 0.109 กรัม/ลิตร และที่ 15 ppt ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.136 ± 0.016 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระดับความเค็มที่ต่างกัน (ตารางที่ 4.29)

ตารางที่ 4.29 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *B. braunii* ในความเค็มที่ต่างกัน

ความเค็ม (ppt)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
0	0.086±0.019 ^{a, b}	0.700±0.057 ^a	9.817±0.386 ^c	0.847±0.109 ^b	0.068±0.001 ^a
5	0.063±0.002 ^a	1.290±0.107 ^b	6.255±0.401 ^b	0.397±0.016 ^a	0.080±0.008 ^b
10	0.076±0.007 ^a	2.060±0.108 ^c	5.797±0.079 ^{a, b}	0.440±0.045 ^a	0.119±0.002 ^b
15	0.085±0.004 ^{a, b}	2.145±0.110 ^c	6.343±0.592 ^b	0.542±0.029 ^a	0.136±0.016 ^c
20	0.106±0.009 ^b	2.125±0.216 ^c	4.987±0.230 ^a	0.535±0.048 ^a	0.106±0.012 ^b

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

จากการศึกษาการเลี้ยงสาหร่าย *B. braunii* เลี้ยงที่ระยะเวลาแตกต่างกัน คือ 10, 20, 30 และ 40 วัน พบว่าที่ระยะเวลาเลี้ยง 40 วัน มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด คือ 0.101 ± 0.006 ต่อวัน โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุดที่ 40 วัน คือ 1.055 ± 0.051 กรัม/ลิตร ปริมาณไขมัน(%)พบว่าที่ 40 วัน มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 46.563 ± 10.436 ให้ปริมาณไขมันสูงสุด คือ 4.707 ± 0.305 กรัม/ลิตร และให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.491 ± 0.023 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระยะเวลาเลี้ยงที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.30) จากผลทำให้ทราบได้ว่าที่ 40 วัน สาหร่าย *B. braunii* สามารถเจริญเติบโตได้น้ำหนักเซลล์แห้งมากที่สุด ซึ่งทำให้ปริมาณไขมันเพิ่มสูงด้วย เนื่องจากสาหร่าย *B. braunii* มีไขมันภายในเซลล์เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว เมื่อได้จำนวนเซลล์ที่มากก็จะทำให้ปริมาณไขมันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของสาหร่ายด้วย

ตารางที่ 4.30 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *B. braunii* ในระยะเวลาเลี้ยงที่แตกต่างกัน

ระยะเวลา (วัน)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
10	0.059 ± 0.003^a	0.695 ± 0.076^a	10.474 ± 0.504^a	0.625 ± 0.040^a	0.072 ± 0.008^a
20	0.109 ± 0.011^b	$0.780 \pm 0.016^{a,b}$	9.529 ± 0.783^a	1.045 ± 0.111^a	0.074 ± 0.001^a
30	0.099 ± 0.009^b	$0.765 \pm 0.045^{a,b}$	29.933 ± 6.952^b	2.967 ± 0.289^b	0.229 ± 0.013^b
40	0.101 ± 0.006^b	1.055 ± 0.051^b	46.563 ± 10.436^c	4.707 ± 0.305^c	0.491 ± 0.023^c

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนตั้งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

จากการศึกษาการเลี้ยงสาหร่าย *B. braunii* เลี้ยงที่ปริมาณหลักแตกต่างกัน คือ 50, 100, 150, 200 และ 250% พบว่าที่ปริมาณหลัก 250% มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด คือ 0.085 ± 0.006 ต่อวัน แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับที่ปริมาณหลักที่ 50, 100, 150, 200% โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุดที่ปริมาณหลัก 200% คือ 0.865 ± 0.028 กรัม/ลิตร ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติกับที่ปริมาณหลักที่ 50, 150, 100, 250% ตามลำดับ ปริมาณไขมัน(%)พบว่าที่ปริมาณหลัก 250% มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.328 ± 0.615 ที่ปริมาณหลัก 100% ให้ปริมาณไขมันสูงสุด คือ 0.842 ± 0.055 กรัม/ลิตร และที่ปริมาณหลัก 200% ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.079 ± 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับที่ปริมาณหลัก 250% (ตารางที่ 4.31)



ตารางที่ 4.31 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *B. braunii* ในปริมาณหลักที่แตกต่างกัน

หลัก (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
50	0.062±0.008 ^a	0.575±0.029 ^a	9.349±0.748 ^a	0.582±0.078 ^a	0.053±0.002 ^a
100	0.064±0.005 ^a	0.675±0.083 ^{a, b}	9.871±0.471 ^a	0.842±0.055 ^b	0.066±0.008 ^{a, b}
150	0.080±0.003 ^a	0.635±0.109 ^a	9.524±0.366 ^a	0.767±0.029 ^{a, b}	0.060±0.010 ^{a, b}
200	0.081±0.013 ^a	0.865±0.028 ^b	9.137±0.246 ^a	0.745±0.126 ^{a, b}	0.079±0.002 ^b
250	0.085±0.006 ^a	0.760±0.062 ^{a, b}	10.328±0.615 ^a	0.665±0.064 ^{a, b}	0.078±0.006 ^b

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

จากการศึกษาการเลี้ยงสาหร่าย *B. braunii* เลี้ยงที่ปริมาณไนโตรเจนแตกต่างกัน คือ 10, 25, 50, 100 และ 200% พบว่าที่ปริมาณไนโตรเจน 50% มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด คือ 0.119 ± 0.005 ต่อวัน โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุดที่ปริมาณไนโตรเจน 25% คือ 1.440 ± 0.086 กรัม/ ปริมาณไขมัน (%) พบว่าที่ปริมาณไนโตรเจน 25% มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.351 ± 0.307 ที่ปริมาณไนโตรเจน 50% ให้ปริมาณไขมันสูงสุด คือ 0.745 ± 0.030 กรัม/ลิตร และที่ปริมาณไนโตรเจน 25% ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.091 ± 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระดับปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.32)

ตารางที่ 4.32 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *B. braunii* ในปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน

ไนโตรเจน (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
10	0.095±0.009 ^b	1.030±0.047 ^a	4.659±0.197 ^a	0.432±0.044 ^a	0.048±0.002 ^a
25	0.114±0.003 ^c	1.440±0.086 ^b	6.351±0.307 ^b	0.727±0.025 ^c	0.091±0.005 ^d
50	0.119±0.005 ^c	1.285±0.054 ^b	6.208±0.275 ^{a, b}	0.745±0.030 ^c	0.079±0.003 ^c
100	0.102±0.004 ^{b, c}	1.255±0.017 ^b	5.327±0.129 ^a	0.545±0.023 ^b	0.066±0.009 ^b
200	0.071±0.005 ^a	1.025±0.067 ^a	5.320±0.267 ^a	0.380±0.027 ^a	0.054±0.003 ^a

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

จากการศึกษาการเลี้ยงสาหร่าย *B. braunii* เลี้ยงที่ปริมาณฟอสฟอรัสแตกต่างกัน คือ 10, 25, 50, 100 และ 200% พบว่าที่ปริมาณฟอสฟอรัส 25% มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด คือ 0.102 ± 0.002 ต่อวัน โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุดที่ปริมาณฟอสฟอรัส 200% คือ 0.885 ± 0.073 กรัม/ลิตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับที่ปริมาณฟอสฟอรัส 10, 25, 50, 100% ปริมาณไขมัน(%)พบว่าที่ปริมาณฟอสฟอรัส 25% มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.547 ± 0.229 ที่ปริมาณฟอสฟอรัส 25% ให้ปริมาณไขมันสูงสุด คือ 1.495 ± 0.035 กรัม/ลิตร และที่ปริมาณไนโตรเจน 25% ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.123 ± 0.016^b มิลลิกรัม/ลิตร/วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระดับปริมาณฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.33)

ตารางที่ 4.33 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *B. braunii* ในปริมาณฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน

ฟอสฟอรัส (%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/day)
10	$0.091 \pm 0.006^{a,b}$	0.880 ± 0.114^a	13.381 ± 0.441^c	1.225 ± 0.084^c	$0.117 \pm 0.015^{a,b}$
25	0.102 ± 0.002^b	0.850 ± 0.116^a	14.547 ± 0.229^d	1.495 ± 0.035^d	0.123 ± 0.016^b
50	$0.088 \pm 0.005^{a,b}$	0.780 ± 0.084^a	9.961 ± 0.164^a	0.877 ± 0.058^a	0.077 ± 0.008^a
100	0.078 ± 0.005^a	0.730 ± 0.076^a	13.777 ± 0.063^c	$1.080 \pm 0.070^{b,c}$	0.100 ± 0.010^b
200	0.083 ± 0.005^a	0.885 ± 0.073^a	11.610 ± 0.199^b	$0.970 \pm 0.060^{a,b}$	0.102 ± 0.008^b

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

4.2.5 ปริมาณไขมันใน *Scenedesmus dimorphus* ที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่ต่าง

จากการศึกษาเลี้ยง *S. dimorphus* ในความเข้มข้นของอาหารสูตร *chlorella medium* ที่ต่างกันคือที่ความเข้มข้น 100, 75, 50, 25 และ 10 % พบว่าความเข้มข้นของอาหารไม่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวันโดยในทุกความเข้มข้นของอาหารมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ น้ำหนักแห้งของสาหร่ายเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าความเข้มข้นของอาหารที่ 100 % ให้น้ำหนักแห้งของสาหร่ายสูงสุด คือ 0.930 ± 0.019 g/L มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มข้นของอาหารที่ทุกระดับของความเข้มข้นอาหาร ปริมาณไขมันที่ความเข้มข้นของอาหารที่ 100 % ให้ปริมาณไขมันสูงที่สุดคือร้อยละ 19.28 ± 0.29 ไม่มีความแตกต่างกันกับความเข้มข้นของอาหาร 75 %, ปริมาณไขมันที่ความเข้มข้นของอาหาร 100 % ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 0.180 ± 0.003 g/L มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความ

เข้มข้นของอาหารที่ทุกระดับของความเข้มข้นอาหาร และที่ผลผลิตไขมันที่ความเข้มข้นของอาหาร 100 % ให้ผลผลิตไขมันสูงสุด คือ 23.34 ± 1.42 mg/L/d ไม่มีความแตกต่างกันกับที่ความเข้มข้นของอาหาร 75 % (ตารางที่ 4.34)

ตารางที่ 4.34 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ที่ความเข้มข้นของอาหารสูตร chlorella medium แตกต่างกัน

ความเข้มข้นอาหาร(%)	μ (/day)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
10	0.127 ± 0.006^a	0.655 ± 0.009^a	15.24 ± 0.17^a	0.098 ± 0.000^a	19.44 ± 1.02^{ab}
25	0.116 ± 0.005^a	0.750 ± 0.059^b	15.75 ± 0.61^a	0.123 ± 0.008^b	18.33 ± 0.91^a
50	0.128 ± 0.010^a	0.770 ± 0.017^b	15.85 ± 0.22^a	0.120 ± 0.001^b	20.42 ± 1.61^{ab}
75	0.122 ± 0.004^a	0.785 ± 0.022^b	18.50 ± 0.23^b	0.146 ± 0.003^c	22.68 ± 0.82^c
100	0.121 ± 0.007^a	0.930 ± 0.019^c	19.28 ± 0.29^b	0.180 ± 0.003^d	23.34 ± 1.42^c

(ความเข้มแสง 740 Lux, L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

จากการศึกษาเลี้ยงสาหร่าย *S. dimorphus* โดยให้ระยะเวลาการรับแสงที่ต่างกันคือ 24 : 0, 16 : 8, 14 : 10 และ 12 : 12 ชั่วโมง (Light : Dark ชม.) พบว่า พบว่าที่ระยะเวลาการให้แสงที่ 16: 8 ชั่วโมง มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.106 ± 0.006 ต่อวัน โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 2.365 ± 0.047 g/L มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระยะการให้แสงที่แตกต่างกัน ปริมาณไขมัน พบว่าระยะเวลาการให้แสงไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณไขมันโดยปริมาณไขมันที่ได้ในทุกระยะการให้แสงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณไขมัน ที่ระยะเวลาการให้แสงที่ 16: 8 ชั่วโมง ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 0.374 ± 0.009 g/L ผลผลิตไขมัน ได้ค่าสูงสุด คือ 16.56 ± 0.95 mg/L/d มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระยะการให้แสงที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.35)

จากการศึกษาเลี้ยงสาหร่าย *Scenedesmus dimorphus* โดยให้ความเข้มแสงที่แตกต่างกันคือ 0, 400, 740 และ 4, 120 Lux พบว่าที่ความเข้มแสงที่ 4, 120 Lux ต่อวันมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.107 ± 0.010 ต่อวัน โดยให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 2.810 ± 0.124 g/L มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเข้มแสงที่แตกต่างกัน พบว่าที่ความเข้มแสง 4, 120 Lux มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.76 ± 0.28 โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับความเข้มแสงที่ 400 Lux แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับความเข้มแสงที่ 0 Lux ปริมาณไขมันสูงสุด ที่ความเข้มแสง 4, 120 Lux คือ 0.541 ± 0.017 g/L

และที่ผลผลิตไขมัน ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 21.17 ± 2.05 mg/L/d มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระยะการให้แสงที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.36)

ตารางที่ 4.35 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ในระยะเวลาการให้แสงที่แตกต่างกัน

L:D (ชม.)	μ (/d)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
24:0	0.086 ± 0.002^a	1.050 ± 0.017^b	15.46 ± 0.54^a	0.163 ± 0.003^a	13.08 ± 0.31^a
16:8	0.106 ± 0.006^b	2.365 ± 0.047^c	15.57 ± 0.44^a	0.374 ± 0.009^b	16.56 ± 0.95^b
14:10	0.089 ± 0.003^a	1.250 ± 0.052^{ab}	15.10 ± 0.23^a	0.191 ± 0.006^a	13.97 ± 0.51^a
12:12	0.076 ± 0.005^a	1.180 ± 0.098^a	15.54 ± 0.42^a	0.180 ± 0.013^a	11.76 ± 0.90^a

(ความเข้มแสง 740 Lux)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ตารางที่ 4.36 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ในความเข้มแสงที่แตกต่างกัน

ความเข้มแสง (Lux)	μ (/d)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
0	0.0318 ± 0.004^a	0.750 ± 0.028^a	18.49 ± 0.37^a	0.139 ± 0.005^a	5.87 ± 0.83^a
400	0.044 ± 0.004^a	0.985 ± 0.083^{ab}	19.68 ± 0.19^b	0.185 ± 0.013^b	8.74 ± 0.90^a
740	0.040 ± 0.006^a	1.105 ± 0.081^b	19.17 ± 0.19^{ab}	0.199 ± 0.004^b	7.84 ± 1.29^a
4, 120	0.107 ± 0.010^b	2.810 ± 0.124^c	19.76 ± 0.28^b	0.541 ± 0.017^c	21.17 ± 2.05^b

(L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

จากการศึกษาเลี้ยงสาหร่าย *S. dimorphus* โดยให้ปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน คือ 10, 25, 50, 100 และ 200 % พบว่าที่ปริมาณไนโตรเจน 200 % มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดที่สุดคือ 0.123 ± 0.007 ต่อวัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณไนโตรเจนที่ 10 % ในขณะที่ปริมาณไนโตรเจนที่ 25, 50 และ 100 % มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และที่ปริมาณไนโตรเจนที่ 200 % ให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 1.045 ± 0.037 g/L ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณไนโตรเจนที่ 100 % ปริมาณไขมัน พบว่าที่ปริมาณไนโตรเจน 10 % มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.33 ± 0.41 โดย

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณไนโตรเจนที่ 50 % ปริมาณไขมันสูงสุดที่ปริมาณไนโตรเจน 50 % คือ 0.184 ± 0.007 g/L ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับทุกปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน ที่ผลผลิตไขมันที่ปริมาณไนโตรเจน 50 % ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 21.14 ± 1.50 mg/L/d มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.37)

ตารางที่ 4.37 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ในปริมาณไนโตรเจนที่ต่างกัน

ไนโตรเจน (%)	μ (/d)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
10	0.077 ± 0.007^a	0.855 ± 0.041^a	20.33 ± 0.41^c	0.169 ± 0.005^a	15.67 ± 1.47^a
25	0.115 ± 0.004^b	0.885 ± 0.026^a	18.30 ± 0.39^b	0.165 ± 0.004^a	21.06 ± 0.73^b
50	0.115 ± 0.008^b	0.970 ± 0.048^{ab}	18.38 ± 0.34^b	0.184 ± 0.007^a	21.14 ± 1.50^b
100	0.120 ± 0.004^b	1.040 ± 0.060^b	16.84 ± 0.54^a	0.174 ± 0.009^a	20.36 ± 0.80^b
200	0.123 ± 0.007^b	1.045 ± 0.037^b	16.79 ± 0.32^a	0.178 ± 0.004^a	20.72 ± 1.23^b

(ความเข้มแสง 740 Lux, L:D : 24:0)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

จากการศึกษาเลี้ยงสาหร่าย *S. dimorphus* โดยให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่ต่างกัน คือ 10, 25, 50, 100 และ 200 % พบว่าที่ปริมาณฟอสฟอรัสที่ 200 % มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.132 ± 0.002 ต่อวัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับทุกปริมาณฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน และที่ปริมาณฟอสฟอรัสที่ 200 % ให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 1.345 ± 0.009 g/L ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณไนโตรเจนที่ 100 % ปริมาณไขมันพบว่าที่ปริมาณฟอสฟอรัส 10 % มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 19.35 ± 1.20 โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 25 % ปริมาณไขมันสูงสุดที่ปริมาณฟอสฟอรัส 100 % คือ 0.192 ± 0.006 g/L มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับทุกปริมาณฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน ที่ผลผลิตไขมันที่ปริมาณฟอสฟอรัส 25 % ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 20.65 ± 0.51 mg/L/d ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณฟอสฟอรัสที่ 10 % (ตารางที่ 4.38)

ตารางที่ 4.38 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ในปริมาณฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน

ฟอสฟอรัส (%)	μ (/d)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
10	0.105±0.003 ^a	0.820±0.033 ^a	19.35±1.20 ^c	0.147±0.007 ^a	20.49±0.62 ^c
25	0.116±0.002 ^b	0.825±0.029 ^a	17.80±0.54 ^c	0.146±0.004 ^a	20.65±0.51 ^c
50	0.123±0.002 ^b	1.040±0.029 ^b	15.06±0.32 ^b	0.156±0.004 ^{ab}	18.67±0.30 ^b
100	0.123±0.005 ^b	1.260±0.049 ^c	14.94±0.53 ^b	0.192±0.006 ^c	18.42±0.37 ^b
200	0.132±0.002 ^c	1.345±0.009 ^c	12.70±0.23 ^a	0.172±0.001 ^b	16.86±0.25 ^a

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนอนเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

จากการศึกษาเลี้ยงสาหร่าย *S. dimorphus* โดยให้ปริมาณเหล็กที่แตกต่างกันคือ 50, 100, 150, 200 และ 250 % พบว่าที่ปริมาณเหล็กที่ 200 % มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.120±0.006 ต่อวัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณเหล็กที่ 250, 150 และ 100 % แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณเหล็กที่ 10 % ที่ปริมาณเหล็กที่ 250 % ให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 1.715±0.012 g/L มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกปริมาณเหล็กที่แตกต่างกัน ปริมาณไขมันพบว่าที่ปริมาณเหล็ก 250 % มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 24.67±0.49 โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกปริมาณเหล็กที่แตกต่างกันและมีปริมาณไขมันสูงสุดที่ปริมาณเหล็กคือ 0.430±0.004 g/L มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับทุกปริมาณเหล็กที่แตกต่างกัน ที่ผลผลิตไขมันที่ปริมาณเหล็ก 250 % ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 27.21±0.34 mg/L/d ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณเหล็กที่ 200 % (ตารางที่ 4.39)

ตารางที่ 4.39 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ในปริมาณเหล็กที่แตกต่างกัน

เหล็ก (%)	μ (/d)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
50	0.090±0.001 ^a	0.900±0.028 ^a	15.09±0.47 ^a	0.136±0.004 ^a	13.60±0.17 ^a
100	0.117±0.004 ^b	1.335±0.222 ^b	15.44±0.15 ^a	0.203±0.003 ^b	18.03±0.62 ^b
150	0.113±0.004 ^b	1.335±0.009 ^b	19.24±0.08 ^b	0.256±0.001 ^c	21.75±0.94 ^c
200	0.120±0.006 ^b	1.290±0.028 ^b	21.39±0.35 ^c	0.271±0.003 ^d	25.69±1.32 ^d
250	0.113±0.001 ^b	1.715±0.012 ^c	24.67±0.49 ^d	0.430±0.004 ^e	27.21±0.34 ^d

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนอนเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

จากการศึกษาเลี้ยงสาหร่าย *S. dimorphus* โดยมีความเค็มที่แตกต่างกันคือ 0, 5, 10, 15 และ 20 ppt พบว่าที่ความเค็มที่ 5 ppt มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดคือ 0.077 ± 0.002 ต่อวัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับทุกระดับความเค็มที่แตกต่างกัน ที่ความเค็มที่ 10 ppt ให้น้ำหนักสาหร่ายแห้งสูงสุด คือ 2.495 ± 0.046 g/L มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระดับความเค็มที่แตกต่างกัน ปริมาณไขมันพบว่าที่ความเค็มที่ 5 ppt มีปริมาณไขมันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.27 ± 0.23 โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความเค็มที่ 10 และ 15 ppt และความเค็มที่ 10 ppt มีปริมาณไขมันสูงสุดที่ 0.298 ± 0.003 g/L มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับทุกระดับความเค็มที่แตกต่างกัน ที่ผลผลิตไขมันความเค็มที่ 5 ppt ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 12.37 ± 1.34 mg/L/d มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกระดับความเค็ม (ตารางที่ 4.40)

ตารางที่ 4.40 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ในความเค็มที่แตกต่างกัน

ความเค็ม (ppt)	μ (/d)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ปริมาณไขมัน (%)	ปริมาณไขมัน (g/L)	ผลผลิตไขมัน (mg/L/d)
0	0.076 ± 0.006^b	1.475 ± 0.043^a	13.29 ± 0.16^c	0.193 ± 0.004^b	10.22 ± 0.85^{bc}
5	0.086 ± 0.009^b	1.580 ± 0.056^a	14.27 ± 0.23^d	0.229 ± 0.006^c	12.37 ± 1.34^c
10	0.075 ± 0.001^b	2.495 ± 0.046^c	11.80 ± 0.22^b	0.298 ± 0.003^d	8.92 ± 0.18^b
15	0.077 ± 0.002^b	2.022 ± 0.105^b	11.96 ± 0.29^b	0.244 ± 0.011^c	9.22 ± 0.27^b
20	0.056 ± 0.002^a	1.365 ± 0.167^a	10.81 ± 0.06^a	0.157 ± 0.013^a	6.12 ± 0.22^a

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวนึงเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

4.3 การเพาะเลี้ยงระดับมหวมวล

การทดลองเลี้ยงสาหร่ายในบ่อเพาะเลี้ยงขนาดความจุ 1000 ลิตร โดยใช้ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่าย *S. dimorphus* ซึ่งเป็นสาหร่ายที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดนอกห้องปฏิบัติการ ผลพบว่าปริมาณไขมันลดลงจากที่ได้ในห้องปฏิบัติการมาก และการเลี้ยงโดยเพิ่มปริมาณเหล็กให้ไขมันมากที่สุดคือ 8.70 ± 0.01 % แต่การเลี้ยงในสูตรอาหาร *chlorella medium* ปกติให้ผลผลิตไขมันสูงที่สุดคือ 2.44 ± 0.04 mg/L/D (ตารางที่ 4.41) และเมื่อทดลองนำไปเลี้ยงในปุ๋ยสูตรการค้าที่ใช้สำหรับพืชทั่วไปคือสูตร 16-16-16 (ตารางที่ 4.42) และสูตร 18-12-6 (ตารางที่ 4.43) ผลพบว่าเมื่อเลี้ยงในสูตรปุ๋ยสูตร 18-12-6 ที่ 5 g/L สาหร่ายให้ไขมันมากถึง 44.83 ± 2.10 % ส่วนการเลี้ยงในสูตรปุ๋ย 16-16-16 ที่ 4 กรัมต่อลิตรให้ผลผลิตไขมันสูงที่สุด 52.35 ± 3.68 mg/L/D

ตารางที่ 4.41 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ในสูตรปุ๋ยที่แตกต่างกันเมื่อเพาะเลี้ยงในระดับมหมวล

	μ (/days)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ไขมัน (%)	ผลผลิต ไขมัน(g/L)	lipid(mg/L/D)
Control	0.04 ± 0.00^a	8.08 ± 0.18^b	8.11 ± 0.02^a	0.46 ± 0.01^a	2.44 ± 0.04^a
ลด N 2 เท่า	0.02 ± 0.00^b	6.36 ± 0.29^d	6.38 ± 0.01^c	0.14 ± 0.00^d	0.36 ± 0.00^d
เพิ่ม Fe 2.5 เท่า	0.02 ± 0.00^b	8.68 ± 0.33^a	8.70 ± 0.01^a	0.37 ± 0.00^b	1.05 ± 0.02^b
ลด P 10 เท่า	0.02 ± 0.00^b	6.76 ± 0.13^c	6.78 ± 0.01^b	0.22 ± 0.01^c	0.76 ± 0.00^c

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ตารางที่ 4.42 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ในปุ๋ยสูตร 16-16-16 เมื่อเพาะเลี้ยงในระดับมหมวล

g/l	μ (/days)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ไขมัน (%)	ผลผลิตไขมัน (g/L)	lipid(mg/L/D)
4	0.16 ± 0.00^b	2.67 ± 0.12^d	32.14 ± 3.38^a	0.86 ± 0.16^a	52.35 ± 3.68^a
8	0.32 ± 0.00^a	6.42 ± 0.03^c	7.17 ± 1.53^b	0.46 ± 0.10^c	23.20 ± 1.21^b
12	0.12 ± 0.00^c	9.09 ± 0.11^b	5.05 ± 0.30^c	0.46 ± 0.03^c	6.18 ± 0.95^c
16	0.15 ± 0.00^b	13.35 ± 0.46^a	5.02 ± 0.18^c	0.67 ± 0.02^b	7.70 ± 0.88^c

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ตารางที่ 4.43 การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันใน *S. dimorphus* ใน 18-12-6 เมื่อเพาะเลี้ยงในระดับมหมวล

g/l	μ (/days)	น้ำหนักแห้ง (g/L)	ไขมัน (%)	ผลผลิตไขมัน (g/L)	lipid(mg/L/D)
2.5	0.10 ± 0.00^b	1.02 ± 0.04^d	17.36 ± 2.69^b	0.18 ± 0.02^d	17.16 ± 1.33^b
5	0.05 ± 0.00^c	2.71 ± 0.10^c	44.83 ± 2.10^a	1.22 ± 0.02^a	21.55 ± 1.54^a
10	0.15 ± 0.00^a	3.95 ± 0.11^b	11.71 ± 2.36^c	0.46 ± 0.05^c	18.05 ± 1.05^b
15	0.06 ± 0.00^c	7.20 ± 0.24^a	11.00 ± 1.04^c	0.79 ± 0.03^b	6.92 ± 0.89^c

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับที่แตกต่างกันในแถวแนวดิ่งเดียวกันคือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

4.4 วิจารณ์ผลการทดลอง

แสงจัดเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของสาหร่าย ภายในเซลล์ของสาหร่ายจะมีรงควัตถุหลักคือคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งจะใช้พลังงานแสงเพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนที่ได้มาจากน้ำ หรือแหล่งให้ไฮโดรเจนอื่นๆ เพื่อสร้างอาหารสำหรับใช้ในการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามแสงอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้มากขึ้นหรือน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้รับแสงความเข้มแสง และคุณภาพแสงที่เหมาะสม และนอกจากแสงจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงโดยตรงแล้วยังมีบทบาทในด้านการกระตุ้นหรือลดการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการทางสรีรวิทยาของไซยาโนแบคทีเรียอีกด้วย

สาหร่ายสีเขียวมีช่วงความเข้มแสงที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 5-7.5 กิโลลักซ์ ถ้าสาหร่ายได้รับความเข้มแสงมากเกินไปจะทำให้การสังเคราะห์แสงลดลงเนื่องจากกระบวนการต่างๆภายในเซลล์ถูกยับยั้ง ส่งผลให้การสะสมปริมาณสารภายในเซลล์เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะมีผลทำให้การสังเคราะห์ ATP ลดลง โดยความเข้มแสงที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสาหร่ายซึ่งอาจมาจากลักษณะของถิ่นที่อยู่ที่แตกต่างกันในธรรมชาติ

การเลี้ยงสาหร่าย *Botryococcus braunii* ที่ความเข้มแสงสูงมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของเซลล์สาหร่าย เมื่อมีปริมาณแสงมาก การสังเคราะห์แสงก็จะมากขึ้น ทำให้การเจริญเติบโตมากขึ้น และส่งผลให้ปริมาณไขมันสูงขึ้น เนื่องจากสาหร่าย *Botryococcus braunii* มีการสะสมไขมันภายในเซลล์มากอยู่แล้ว เมื่อมีปริมาณเซลล์มากจึงทำให้ปริมาณไขมันสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Li และ Qin. (2005) ที่ได้ศึกษาสาหร่าย *Botryococcus braunii* สามสายพันธุ์จากจีน (CHN) , สหราชอาณาจักรอังกฤษ (UK) และ ญี่ปุ่น (JAP) ที่ 3 ระดับความเข้มแสงที่ 60, 100 และ 300 W/m² ถูกใช้ในการทดลองกับ *B. braunii* สามสายพันธุ์ สำหรับดูการเจริญเติบโตและปริมาณไขมัน ในแต่ละความเข้มแสงมีการทำซ้ำ 3 ซ้ำใน flask 250 ML แสงใช้หลอด cool fluorescent ที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ความเข้มแสงต่างกัน ควบคุมอุณหภูมิที่ 25 °C พบว่าสายพันธุ์เจริญเติบโตที่เร็วที่สุดที่ CHN ที่ 60 W/m² และเจริญเติบโตช้าที่สุดที่ 300 W/m² (p < 0.05) ความเข้มแสงที่เหมาะสมกับสาหร่าย *B. braunii* ทั้งสามสายพันธุ์คือที่ความเข้มแสง 60 W/m² โดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีในทุกสายพันธุ์ เมื่อมีการเพิ่มความเข้มแสงจะพบว่าในสายพันธุ์ CHN มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ในขณะที่บางสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์ JAP การเพิ่มความเข้มแสงกลับทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

สายพันธุ์ CHN ปริมาณไขมันสูงที่ 60 และ 100 W/m² ในขณะที่ปริมาณไขมันจากสายพันธุ์ UK สูงสุดที่ 60 W/m² , และต่ำสุดที่ 300 W/m² เมื่อแสงถึง 300 W/m² ไขมันไม่แตกต่างกันระหว่างสามสายพันธุ์ ความเข้มแสงที่เหมาะสมกับสาหร่าย *B. braunii* ทั้งสามสายพันธุ์ต่อปริมาณไขมันในแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันไป เช่น ในสายพันธุ์ JAP เมื่อมีการเพิ่มความเข้มแสงจะพบว่า ที่ 60 W/m² ถึง 300 W/m² เป็นช่วงความเข้มแสงที่สาหร่ายสายพันธุ์นี้สามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยมีปริมาณไขมันสูงสุดที่ความเข้มแสง 100 W/m² และเมื่อเลี้ยงที่ความเข้มแสงสูง 300



W/m^2 ปริมาณไขมันลดลง ในขณะที่สายพันธุ์ UK การเพิ่มความเข้มแสงจาก 60 W/m^2 ที่เป็นการเพิ่มความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเป็น 100 W/m^2 กลับทำให้มีปริมาณไขมันลดลง

Khotimchenko *et al.* (2005) ที่ศึกษาถึงผลของความเข้มแสงต่อปริมาณไขมันในสาหร่ายสีแดงขนาดเล็ก *Tichocarpus crinitus* ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 3 สัปดาห์ ที่ความเข้มแสง 70 – 80 % photosynthetically active radiation (PAR) คือปริมาณแสงช่วงที่ความยาวคลื่น 400-700 nanometer และ 8 – 10 % ของ PAR ที่ความเข้มแสง 70 – 80 % ของ PAR น้ำหนักสดของสาหร่าย $3.4 \pm 0.3 \text{ mg/g}$ ส่วนความเข้มแสง 8 – 10 % ของ PAR จะได้ $4.2 \pm 0.5 \text{ mg/g}$ จากการวิเคราะห์ไขมันแต่ละชนิดซึ่งมีทั้ง glycolipids, phospholipids และ neutral lipids กลุ่มไขมันหลักที่สำคัญคือ glycolipids มี 57.5–62.7% ของปริมาณไขมันทั้งหมด ผลการทดลองที่ได้ปริมาณไขมันแต่ละชนิดในทั้งสองความเข้มแสงมีปริมาณที่ต่างกันที่ความเข้มแสง 70-80% ให้ปริมาณไขมันชนิด TG, MGDG สูงกว่า ส่วนที่ความเข้มแสง 8-10% ให้ปริมาณไขมันชนิด DGDG, SQDG, PC และ PG สูงกว่า ไขมันแต่ละชนิดมีประโยชน์คือเป็นโครงสร้างของเยื่อเซลล์ (Lipid bilayer) เป็นแหล่งให้พลังงาน และเป็นแหล่งกำเนิดกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับสาหร่าย

Solovchenko *et al.* (2008) ทำการศึกษาถึงผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก *P. incisa* ในที่ๆมีความเข้มแสงแตกต่างกันเป็นระยะเวลา 14 วัน ได้แก่ ความเข้มแสงต่ำ ($35 \text{ } \mu\text{mol photon/m}^2/\text{s}$) ความเข้มแสงปานกลาง ($200 \text{ } \mu\text{mol photon/m}^2/\text{s}$) และความเข้มแสงที่สูง ($400 \text{ } \mu\text{mol photon/m}^2/\text{s}$) โดย daylight fluorescent lamps และให้อากาศอย่างสม่ำเสมอ ที่อุณหภูมิ 25°C อาหารที่ใช้เลี้ยงคือ BG-11 ผลที่ได้คือความเข้มแสงที่สูงที่สุด $400 \text{ } \mu\text{mol photon/m}^2/\text{s}$ มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยที่ดีที่สุดเท่ากับ 0.47 mg DW/day เพราะในความเข้มแสงที่สูงที่สุด $400 \text{ } \mu\text{mol photon/m}^2/\text{s}$ จะทำให้สาหร่ายมีการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายให้เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Ying *et al.* (2001) โดยเลี้ยง marine diatoms 6 ชนิด แล้วนำมาเปรียบเทียบปริมาณไขมันที่ได้ที่ความเข้มแสง 5000 Lux และ 1500 Lux โดยเลี้ยงใน flask ขนาด 3 ลิตร ในสูตรอาหาร f/2 medium ที่อุณหภูมิ $22 \pm 1^\circ\text{C}$ และความเค็มที่ 28 ppt พบว่าปริมาณไขมันของ *Chaetoceros gracilis* B13, *Phaeodactylum tricornutum* B118, *Phaeodactylum tricornutum* B221 และ *Cylindrotheca fusiformis* B211 ที่ความเข้มแสง 1500 Lux ให้ปริมาณไขมันสูง คือร้อยละ 10.78 ± 2.69 , 5.93 ± 1.03 , 13.38 ± 1.80 และ 15.93 ± 0.91 ตามลำดับ สาเหตุที่เลี้ยงในความเข้มแสงต่ำแล้วให้ปริมาณไขมันสูง เพราะในความเข้มแสงต่ำสาหร่ายจะความเครียดทำให้เกิดการยับยั้งการแบ่งเซลล์ จึงส่งผลทำให้มีการสะสมไขมันเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาให้แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยจะใช้สังเคราะห์แสงทำให้เซลล์เพิ่มจำนวนมากขึ้นและสาหร่าย *Botryococcus braunii* มีปริมาณไขมันภายในเซลล์มาก ทำให้เมื่อมีการเจริญเติบโตมาก ปริมาณไขมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Meseck *et al.* (2005) เรื่องระยะเวลาการให้แสงต่อการเจริญเติบโต และสารอาหารของสาหร่าย *Tetraselmis chui* (สายพันธุ์ PLY429) โดยเลี้ยงในอาหารสูตร E/4 ที่มีลักษณะความเข้มข้นของ

สารอาหารคล้ายกับสูตรอาหาร Guillard's f/2 ควบคุมความเป็น กรด-ด่าง และอุณหภูมิที่ 18 °C ในระยะเวลาเลี้ยง 28 วัน โดยช่วงเวลาที่ได้รับแสงต่างกันคือ 24 : 0, 16 : 8, 12 : 12 และ 8 : 16 ชั่วโมง (Light : Dark ชม.) พบว่าระยะเวลาการให้แสงที่นาน อย่าง 24 : 0 ชั่วโมง มีอัตราการแบ่งเซลล์ต่อวันสูงสุด 0.61 ± 0.04 และจำนวนเซลล์สุดท้ายเท่ากับ $2.833 \pm 0.141 \times 10^6$ เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยผลผลิตที่ได้มากกว่าระยะเวลาการให้แสงที่ 16 : 8, 12 : 12 และ 8 : 16 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่สาหร่ายได้รับแสง (Photoperiod) มีผลต่อการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วในการเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กระยะเวลาการให้แสงในการเลี้ยงไม่ควรจะต่ำกว่า 16 ชั่วโมง การมีช่วงมืดและสว่างเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย เนื่องจากในช่วงมืดจะมีการเมตาบอลิซึมเกิดขึ้น และในสภาพที่ให้แสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง จะบังคับให้สาหร่ายสังเคราะห์แสงตลอดเวลาเกิดความจำเป็น (รวมทรัพย์, 2540) แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาการให้แสงอาจมีความเหมาะสมต่อสาหร่ายแต่ละชนิดแตกต่างกันไป

Ho et al. (2009) ได้ทำการศึกษาสาหร่าย *Porphyridium cruentum* ที่เลี้ยงโดยให้แสง (Light :Dark) 6:8, 12:12 และ 18:6 ชั่วโมง เลี้ยงในที่มืดที่ให้กลูโคสและกลีเซอรอล ใน Erlenmeyer flasks 500 ml ที่ 30 °C ความเข้มแสงที่ $10-25 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ ในอาหารสูตร f/2 medium ระยะเวลา 25 วัน พบว่าการให้แสงที่ 12:12 ชั่วโมง ให้ปริมาณไขมันสูงสุดคือ 19.9 (%w/w) เนื่องจากธาตุอาหารบางชนิดในสาหร่ายจะทำงานได้ดีในสภาวะที่มีแสงหรือไม่มีแสงที่ต่างกันไป เช่น จากกระบวนการตรึงไนโตรเจน (N_2 -fixation) ซึ่งในการบวนการนี้จะต้องอาศัยเอนไซม์ไนโตรจีเนส ขึ้นอยู่กับ genus/species และสภาพทางกายภาพ เช่น กลางวัน/กลางคืนด้วย โดยเอนไซม์ไนโตรจีเนสจะสามารถทำงานได้ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน

ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ สมถวิล และ อมรรัตน์ (2550) ได้ทำการวิเคราะห์ไขมันในสาหร่ายสีเขียว *Nannochloropsis oculata* ที่เลี้ยงโดยให้ระยะเวลาการให้แสง : ไม่ให้แสงแตกต่างกัน 4 ระดับคือ 12:12, 14:10, 18:6 และ 24:0 ชั่วโมง พบว่า *Nannochloropsis oculata* ที่เลี้ยงที่ 24:0 ชั่วโมง ให้ปริมาณไขมันสูงสุดที่ 1.84 ± 0.21 %น้ำหนักแห้ง เพราะในการรับแสงตลอด 24 ชั่วโมง *Nannochloropsis oculata* เกิดความเครียดทำให้เกิดการยับยั้งการแบ่งเซลล์ จึงส่งผลทำให้เกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้น

ความเค็มมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย *Botryococcus braunii* เนื่องจากในน้ำทะเลมีธาตุอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้สาหร่ายดึงเอาธาตุอาหารมาใช้ในการเจริญเติบโตได้ ซึ่งทำให้เซลล์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ผลผลิตไขมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากความเค็มที่สูงส่งผลต่อเซลล์สาหร่าย ทำให้มีการสร้างคาร์โบไฮเดรตขึ้นมาป้องกันเซลล์มากขึ้น คาร์โบไฮเดรตที่มากส่งผลให้ไขมันเพิ่มขึ้น โดยคาร์โบไฮเดรตที่มากถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในเซลล์

Rao et al. (2007) ทำการศึกษาความเค็มในสาหร่าย *Botryococcus braunii* โดยเลี้ยงใน Erlenmeyer flask ขนาด 500 ml ใช้อาหาร Chu 13 medium 200 ml มีการเติม Sodium chloride ในอัตราตั้งแต่ 17-85 mM เลี้ยงเป็นเวลา 2 อาทิตย์ นำหัวเชื้อ *B. braunii* 20% (v/v) เก็บที่อุณหภูมิ 26 ± 1 °C ความเข้มแสงที่ 1.2 ± 0.2 klux ให้แสงสลับมืด 16:8 ทุกวันเป็นเวลา 2 อาทิตย์

ทำการทดลอง 3 ซ้ำ พบว่า *B. braunii* สามารถเจริญเติบโตได้ทุกความเค็มที่ทดสอบ (17-85 mM) ชีวมวลเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มความเค็มและชีวมวลสูงสุดคือ 17 mM และ 34 mM และภายใต้ความเค็มที่ 34-85 mM จะทำให้มีส่วนประกอบของไขมันในส่วนของ palmitic acid เพิ่มขึ้นเป็น 1.7-2.25 เท่า และมี oleic acid เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ตามลำดับ

Takagi et al. (2006) ได้ทดลองเลี้ยงสาหร่าย *Dunaliella teriolecta* ATCC 30929 ในอาหาร NORO medium ในระดับความเข้มข้น NaCl ที่ 0.5 และ 1.0 M โดยเลี้ยงใน flask ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 30 °C และความเข้มแสง 150 $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$ พบว่าจากการเลี้ยงที่ให้ NaCl ที่ 1.0 M ให้ปริมาณไขมันร้อยละ 67 % สูงกว่าที่ระดับความเข้มข้น NaCl ที่ 0.5 M ให้ปริมาณไขมันร้อยละ 60 โดยที่ระดับความเข้มข้น NaCl ที่ 0.5 M มี Tricylglycerides (TG) ในไขมัน 40.8 % น้อยกว่าที่ความเข้มข้น NaCl ที่ 1.0 M มี Tricylglycerides (TG) ในไขมัน 56.6 %

ความเข้มข้นเกลือสูงนำไปสู่กลไกการปรับตัวของสาหร่ายเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ ในสภาวะดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาหร่ายในทางสรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่าย โดยพบว่าสาหร่ายขนาดเล็กจำนวนมากจะสะสมสารอาหารเช่น กรีเซอรอล น้ำตาลแมนนิทอล (Mannitol) และ glycerol galatocide เมื่อต้องการความคุมน้ำและเกลือในเซลล์ (Osmoregulatory) ในการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของความเค็มหรือความดันออสโมติก (osmotic pressure) จากสภาพแวดล้อม ความเค็มที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสาหร่าย (Hu, 2004)

ผลการศึกษาพบว่าปริมาณไขมันสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญที่ 9.95 ± 0.34 % ได้จากการเพาะเลี้ยงในความเค็ม 10 ppt อัตราผลผลิตที่สูงสุดของไขมัน คือ 0.049 กรัมต่อลิตรพบที่ระดับความเค็มนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าที่ความเค็มสูงกว่า 10 ppt ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการสะสมไขมันในสาหร่ายสายพันธุ์นี้ และมีความเป็นไปได้ว่าเซลล์สาหร่ายอาจจะเก็บสะสมพลังงานเพิ่มขึ้นสำหรับการขับเกลือในรูปของ Na^+ ในเซลล์เพื่อรักษาสมดุลออสโมติก (Vonshak และ Torzillo, 2004) จากนั้นจะลดปริมาณของอาหารที่สะสม (ไขมัน)

การเพิ่มขึ้นของความเค็มตั้งแต่ 0 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลผลิตมวล 1.6 เท่าของมวลชีวภาพในสาหร่ายไฮยาโนแบคทีเรีย โดยในสาหร่าย *Hapalosiphon* sp. มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของมวลชีวภาพในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเค็มสูง 15 ppt (0.76 ± 0.01 กรัมต่อลิตร) เมื่อเปรียบเทียบกับ 0-10 ppt ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเค็มกระตุ้นการเจริญเติบโตในสายพันธุ์สาหร่ายนี้ การค้นพบนี้คล้ายกับรายงานของ Becker (1994) ที่พบว่าบางสายพันธุ์ของสาหร่ายน้ำจืดสามารถเพาะเลี้ยงได้ดีขึ้นในน้ำทะเลมากกว่าในอาหารเพาะเลี้ยงสาหร่ายปกติ Becker (1994) รายงานว่าน้ำทะเลในแหล่งธรรมชาตินั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุหลัก และจุลชีพอาหาร เป็นที่ต้องการสำหรับการเจริญเติบโตของสาหร่ายน้ำจืดหลายชนิด

เมื่อไฮยาโนแบคทีเรีย ได้รับความเค็มจะมีผลทำให้การเจริญเติบโตลดลงทำให้มีการสะสมไขมันไว้ในเซลล์มากกว่านำไปใช้ในการเจริญเติบโต Khatoon et al. (2010) ได้ทำการทดลองเพาะเลี้ยงไฮยาโนแบคทีเรีย (*Oscillatoria* sp.) ใช้ระดับความเค็ม 6 ระดับ 0, 15, 20, 25, 30 และ 35

มิลลิกรัมต่อลิตร ในแต่ละการทดลองทำการทดลอง 3 ซ้ำ ทำการลดความเค็ม (ต่ำกว่า 30 g/L) ทำการ diluted น้ำทะเลกับน้ำกลั่น (MilliQ, Millipore, Germany) ในขณะที่ความเค็มสูง (35 g/L) จันกระทั่งได้ความเข้มข้นที่ต้องการ ทำการเลี้ยงใน Conway medium ที่อุณหภูมิ 28°C ความเข้มข้นแสงที่ $31.9 \mu\text{E m}^{-2} \text{s}^{-1}$ สลับแสง-มืด 12 ชั่วโมง ทำการวิเคราะห์การเจริญเติบโตและปริมาณไขมันวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าระดับความเค็มที่แตกต่างแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ การเจริญเติบโตของ *Oscillatoria* sp. ที่ดีที่สุดคือ 25 g/L ปริมาณไขมันใน *Oscillatoria* sp. สูงสุด 25-35 g/L ดังนั้นระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของ *Oscillatoria* sp. คือ 25 g/L แต่ในทางกลับกันปริมาณไขมันใน *Oscillatoria* sp. จะมีปริมาณไขมันมากที่ระดับความเค็มสูง

ปริมาณเหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของรงควัตถุ, โปรตีนหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ สาหร่ายจะดูดซึมในรูป Fe^{+2} หรือ Fe^{+3} ถ้าหากขาดจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และรูปร่างเซลล์ (สุนิรัตน์, 2549) โดยเหล็กเป็นธาตุอาหารที่ช่วยในการดูดซึมไนโตรเจน Liu et al. (2008) ศึกษาผลของความเข้มข้นเหล็กในการสะสมไขมันใน *C. vulgaris* โดยเลี้ยงในอาหาร F/2-Si medium ที่อุณหภูมิ $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ภายใต้ความเข้มแสง $100 \mu\text{mol/m}^2/\text{s}$ โดยเปิดไฟสว่าง 14 h และปิดไฟ 10 h เลี้ยงจนเจริญเติบโตถึงระยะ late-exponential ที่ความเข้มข้นเหล็ก $2.22 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$ หลังจากนั้นนำมาเลี้ยงใน flasks 250 ml แต่ละ flasks เลี้ยงที่ 200 ml ที่ Chelated iron อย่างเช่น เติม $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}/\text{EDTA}$ จำนวน 5 ระดับ คือ 0, 1.2×10^{-8} , 1.2×10^{-7} , 1.2×10^{-6} , $1.2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ ตามลำดับ วิเคราะห์ไขมันด้วยสีย้อม Nile Red และสกัดไขมันจาก Chloroform/methanol (2/1, v/v) และชั่งน้ำหนัก พบว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เติม FeCl_3 ที่ความเข้มข้นจาก 1.2×10^{-8} ถึง $1.2 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ เจริญเติบโตดีที่สุดและได้ความหนาแน่นเซลล์สูง แม้การเพาะเลี้ยงที่เติมด้วย Fe^{3+} $1.2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ แสดงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะแรก จนถึงวันที่ 19 เริ่มเจริญเติบโตช้าลงและคงที่ก่อน ทริทเม้นท์อื่นๆ ความหนาแน่นเซลล์ระยะสุดท้าย การเพาะเลี้ยงที่เสริมด้วยความเข้มข้น Fe^{3+} สูง มีความหนาแน่นเซลล์ระยะสุดท้ายต่ำกว่าความเข้มข้น Fe^{3+} ต่ำ

ปริมาณไนโตรเจนจะมีผลต่อน้ำหนักแห้งของเซลล์สาหร่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสาหร่าย โดยในปกติไนโตรเจน มีหน้าที่หลักในการสังเคราะห์แสง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสารหลายชนิดภายในเซลล์ เช่น โปรตีน คลอโรฟิลล์ กรดนิวคลีอิก สร้างรงควัตถุ ช่วยในกิจกรรมการทำงานเอนไซม์ (สุนิรัตน์, 2549) ในสภาวะที่มีการขาดไนโตรเจนหรือมีการจำกัดปริมาณไนโตรเจน จะส่งผลต่อการสังเคราะห์แสง และปริมาณรงควัตถุของเซลล์ ในส่วนของอาหารสะสมจะเกิดการสะสมของสารประกอบคาร์บอนในปริมาณเพิ่มขึ้น อย่างเช่น พวกลิพิด หรือ โพลีแซคคาไรด์ เป็นผลให้เกิดการสะสมไขมันภายในเซลล์เพิ่มขึ้น (Hammond และ Glatz, 1988)

Xin et al. (2010) ในสาหร่าย *Scenedesmus* sp. ผลของไนโตรเจนต่อ ปริมาณไขมัน โดยมีระดับความเข้มข้นของไนโตรเจน ($\text{NO}_3\text{-N}$) แตกต่างกันว่า 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร, 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร, 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร, 15.0 มิลลิกรัม/ลิตร และ 25.0 มิลลิกรัม/ลิตร โดยมีระดับความเข้มข้นไนโตรเจน

เริ่มต้นที่ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร ในอาหารสูตร BG-11 ระยะเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมิ 25 °C ให้แสงสว่าง:มืดในอัตรา 14:10 ชั่วโมง ความเข้มแสง 55–60 $\mu\text{mol photons m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ พบว่าที่ความเข้มข้นไนโตรเจน 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ปริมาณไขมันสูงสุดถึง 30 %

Widjaja et al. (2009) ทำการทดลองโดยเลี้ยงสาหร่าย *C. vulgaris* ในสูตรอาหาร Fitzgerald ในสภาพอาหารปกติ 4 ลิตร ให้แสง fluorescent 18 w 4 หลอด โดยเตรียมเป็นแนวตั้งระยะห่างจากเชื้อ 20 cm ให้แสงอย่างต่อเนื่อง ให้แสงเฉลี่ยที่ 30 $\mu\text{E}/(\text{m}^2 \text{ s})$ วัดปริมาณค่า optical density of cell โดยวัดค่าความดูดกลืนแสงที่ 682 nm ทุก 24 ชั่วโมง เก็บเกี่ยวเซลล์ที่ระยะใกล้เคียง linear โดยความเข้มข้นของเซลล์ประมาณ 1.1×10^7 cell/ml หลังจากนั้นตรวจสอบผลกระทบของการทำให้ขาดไนโตรเจน โดยเตรียมการเลี้ยง 1 ลิตร ที่ใกล้เคียง linear แล้วเจือจางความเข้มข้นของไนโตรเจนให้ลดลงโดยทำให้เป็น 3 ลิตร และดำเนินการเลี้ยงสำหรับ 7 และ 17 วัน แล้วเก็บเกี่ยวโดยเปรียบเทียบปริมาณไขมันรวมระหว่างสูตรอาหารปกติและสูตรอาหารขาดไนโตรเจน ที่อัตราการไหลเวียน CO_2 20 ml/min โดยเลี้ยงภายใต้สูตรอาหารปกติ 15 และ 20 วัน หลังจากนั้นเปลี่ยนไปเลี้ยงในอาหารที่ขาดไนโตรเจน 7 และ 17 วัน แสดงให้เห็นว่า ปริมาณไขมันเพิ่มขึ้น เพราะในสภาวะที่ไนโตรเจนลดลง ทำให้ *C. vulgaris* เกิดความเครียดทำให้เกิดการยับยั้งการแบ่งเซลล์ จึงส่งผลทำให้เกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้น

การ Converti et al. (2009) ได้ทดลองลดความเข้มข้น NaNO_3 ในการเลี้ยง *C. vulgaris* ในสภาวะ NaNO_3 ที่ 1.500, 0.750 และ 0.375 g/L ตามลำดับ ในสูตรอาหาร Bold's Basal Medium โดยให้ นำไปเลี้ยงใน Erlenmeyer flask 2 ลิตร นาน 14 วัน ให้ความเข้มแสง $70.0 \mu\text{E m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ (ตารางที่ 4) ผลพบว่าระดับ NaNO_3 ที่ 0.375 g/L มีผลทำให้ *C. vulgaris* มีปริมาณไขมันสูงที่สุดคือ $15.31 \pm 0.51\%$ เพราะเมื่อ NaNO_3 ลดลง ทำให้สาหร่ายเกิดความเครียด จึงทำให้มีปริมาณไขมันสูงและไขมันที่มาจากกระบวนการ metabolism โดยสาหร่ายจะเปลี่ยนอาหารสะสมจากแป้งเป็นไขมันแทน

เมื่อเทียบกับการทดลองลดความเข้มข้น NaNO_3 ในการเลี้ยง *Nannochloropsis oculata* ในสภาวะ NaNO_3 ที่ 0.300, 0.150 และ 0.075 g/L ตามลำดับ ในสูตรอาหาร Guillard นำไปเลี้ยงใน Erlenmeyer flask 2 ลิตร นาน 14 วัน ให้ความเข้มแสง $70.0 \mu\text{E}/\text{m}^2/\text{s}$ ผลพบว่าระดับ NaNO_3 ที่ 0.075 g/L มีผลทำให้ *N. oculata* มีปริมาณไขมันสูงที่สุดคือ $15.86 \pm 0.59\%$ เพราะเมื่อ NaNO_3 ลดลง ทำให้สาหร่ายเกิดความเครียดจะทำให้มีปริมาณไขมันสูงและไขมันที่มาจากกระบวนการ metabolism โดยสาหร่ายจะเปลี่ยนอาหารสะสมจากแป้งเป็นไขมันแทน แต่สาเหตุที่ในการทดลองปริมาณไนโตรเจนที่ 100% มีปริมาณไขมันดีที่สุด คาดว่า *Hapalosiphon* sp. เป็นสาหร่ายกลุ่มสีเขียวแกมน้ำเงิน ซึ่งมี heterocyst ที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศเองได้ ดังนั้นเมื่อมีการลดปริมาณไนโตรเจนลงจึงไม่มีผลต่อปริมาณไขมันใน *Hapalosiphon* sp.

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต มีบทบาทต่อกระบวนการต่างๆ ภายในเซลล์ โดยเฉพาะกระบวนการถ่ายเทพลังงาน และกระบวนการสร้างกรดนิวคลีอิก รวมทั้งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ช่วยให้ค่ากรด-เบส ค่อนข้างคงที่ ถ้าสาหร่ายขาดฟอสฟอรัสจะมีผลต่อการเจริญเติบโต คือ โปรตีน รงควัตถุชนิดคลอโรฟิลล์-เอ RNA และ DNA จะลดลง แต่แป้งหรือ

คาร์โบไฮเดรตกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทำให้รูปร่างเซลล์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ลัดดา, 2540) ผลที่มักเกิดขึ้นในการตอบสนองต่อความเครียดจากสารอาหารของเซลล์สาหร่ายคือ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารโมเลกุลใหญ่ (macromolecule) ของเซลล์ เมื่อฟอสฟอรัสที่จำกัลดจะทำให้มีการลดลงของปริมาณโปรตีน และค่อนข้างเพิ่มการสะสมของไขมันและคาร์โบไฮเดรต (Bertilsson et al., 2003) สำหรับฟอสฟอรัสที่จำกัลดสามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วน โปรตีน, ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตได้

โดยสอดคล้องกับรายงานของ Xin et al. (2010) ในสาหร่าย *Scenedesmus* sp. ผลของฟอสฟอรัส ($\text{PO}_4\text{-P}$) ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมันโดย มีระดับความเข้มข้นของฟอสฟอรัสแตกต่างกันที่ 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารดัดแปลงสูตร BG-11 ระยะเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมิ 25 °C ให้แสงสว่าง:มืดในอัตรา 14:10 ชั่วโมง ความเข้มแสง 55–60 $\mu\text{mol photons/m}^2/\text{s}$ พบว่าที่ความเข้มข้นฟอสฟอรัส 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ปริมาณชีวมวลของสาหร่ายสูงสุดคือ $0.98 \pm 0.12 \times 10^6$ เซลล์ต่อมิลลิกรัมต่อวัน ที่ความเข้มข้นฟอสฟอรัส 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ปริมาณไขมันสูงสุดถึงร้อยละ 53 ต่อน้ำหนักแห้งสาหร่าย แต่ได้ปริมาณชีวมวลของสาหร่ายค่อนข้างต่ำเช่นเดียวกับในโตรเจนที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ $0.26 \pm 0.01 \times 10^6$ เซลล์ต่อมิลลิกรัม

การที่ลดความเข้มข้นของอาหารลงจากสูตรปกติ เมื่อสารอาหารทุกกลุ่มลดลงไม่ว่ากลุ่มธาตุอาหารหลักเช่นพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกลุ่มธาตุอาหารรองเช่น เหล็ก แมงกานีส ฯลฯ เป็นผลให้สาหร่ายได้รับสารอาหารน้อยลงการเจริญเติบโตจึงลดลงไป ในส่วนของปริมาณไขมัน การที่สารอาหารน้อยลงจะส่งผลให้สาหร่ายนั้นลดการนำเอาพลังงานไปใช้ในการเจริญเติบโต เกิดการสะสมอาหารมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณไขมันสูงขึ้นด้วย โดยสังเกตได้จากที่ระดับความเข้มข้นของอาหารที่ 50, 25 และ 10 % ยังคงมีปริมาณไขมันที่ดี โดยปริมาณไขมันนั้นไม่ได้ลดลงไปตามความเข้มข้นของอาหารที่น้อยลง