

เอกสารอ้างอิง

1. ปทุมพิศ วิมลวัตรเวที. การเพาะเชื้อจากน้ำเจาะจากช่องต่าง ๆ ของร่างกาย. ใน : กองมาตรฐานชั้นสูงตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก, 2529:34-35
2. จุณจันท์ วิสัยลักษณ์คณา. การเพาะเชื้อจากน้ำไขสันหลังและสารน้ำจากร่างกาย. ใน: จุณจันท์ วิสัยลักษณ์คณา และนิชา เจริญศรี. แบคทีเรียวินิจฉัย พิมพ์ครั้งที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537: 199-214
3. Finegold SM, Baron EJ. Bailey and Scott's diagnostic microbiology. 7th ed. St. Louis : The C.V. Mosby Company, 1986. 4. Volk WA. Essentials of Medical Microbiology. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1987
5. Lennette EH, Balows A, Hausler WJ and Truant JP. Manual of clinical microbiology 3rd ed. Washington DC : American society for microbiology, 1980.
6. Keane WF, Everett ED, Fine RN, et al. CAPD related peritonitis management and antibiotic therapy recommendations travenol peritonitis management advisory committee. Peritoneal Dial Bulln. 1987; 7:55-68.
7. Dawson MS, Harford AM, Garner BK, et al. Total volume culture technique for the isolation of microorganisms from continuous ambulatory peritoneal dialysis patients with peritonitis. J. Clin. Microbiol. 1985; 22:391-4.

8. West TE, Walshe JJ, Krol CP. and Amsterdam D. Staphylococcal peritonitis in patient on continuous peritoneal dialysis. J.Clin.Microbiol. 1986; 23:809-12.
9. สุรภี พฤกษชาติวุฒิ, สุรพล กอบววรรณกุล, บุษบา เจริญสุข และกฤษฎา ด้านภักดี. เปรียบเทียบวิธีการเพาะเชื้อจากน้ำยาล้างช่องท้องในผู้ป่วยโรคไต. วารสารเทคนิคการแพทย์. 16;2: 111-114.



หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น