

ภาคผนวก

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยร้อยละการตายของลูกน้ำยุงลายที่เก็บจากหมู่บ้านเมื่อทดลองกับอะ เบทที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

ความเข้มข้น (มก./ล.)	ค่าเฉลี่ยการตายของลูกน้ำยุงลาย (%)					
	บ.โคกสูง	บ.สร้างหิน	บ.นาบางใต้	บ.ทุ่งนางโกล	บ.เสียว	สายพันธุ์ห้อง Lab
0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
8.0×10^{-5}	4.0	3.0	3.0	6.0	5.0	6.0
4.0×10^{-4}	30.0	34.0	29.0	34.0	29.0	35.0
2.0×10^{-3}	50.0	53.0	45.0	49.0	45.0	52.0
1.0×10^{-2}	99.0	98.0	95.0	98.0	97.0	99.0
5.0×10^{-2}	100.0	100.0	99.0	100.0	100.0	100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่า Diagnostic dosages สำหรับตรวจสอบความไวรับของลูกน้ำยุงลาย
ชนิด Ae. aegypti (WHO, 1981)

ชนิดสารพิษฆ่าแมลง	ความเข้มข้นที่ใช้วินิจฉัย (มก./ล.)
มาลาโซออน	1.00
เพนิโตรโซออน	0.06
เพนโซออน	0.05
เทมิฟอส (อะ เบท)	0.02
คลอไพริฟอส	0.01