

บทที่ 3
ผลการศึกษา

ลักษณะและรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เฝ้าตายจำนวน 8 รายประกอบไปด้วย

3.1 อายุ

ผู้ตายจำนวน 8 ราย มีอายุน้อยที่สุด 33 ปี สูงสุด 57 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.4 ปี (SD=7.67)

3.2 สถานะภาพการสมรส

ผู้ตายจำนวนทั้ง 8 รายสมรส และอยู่กินกับครอบครัว

3.3 อาชีพครอง

ผู้ตายจำนวน 7 ราย จาก 8 ราย หรือร้อยละ 87.5 ยังคงประกอบอาชีพ ร้องคือทำนา และทำมาหากินเหมือนเช่นคนอีสานในท้องถิ่นทำมาหากิน ส่วนอีก 1 ราย หรือ ร้อยละ 12.5 รับจ้างชักจืดเสื่อผ้า

3.4 การศึกษา

ผู้ตายจำนวน 7 ราย จาก 8 ราย หรือร้อยละ 87.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนอีก 1 ราย จบชั้นมัธยมศึกษา

3.6 เชื้อชาติ

ผู้ตายทั้ง 8 ราย มีเชื้อชาติไทย ไทยอีสาน

3.7 เวลาที่เสียชีวิต

ผู้ตาย 1 ราย เสียชีวิตในช่วงเวลา 19-20 นาฬิกา ที่เหลืออีก 7 ราย หรือ ร้อยละ 87.5 เสียชีวิตในช่วงเวลาดึกสงัด คือช่วงเวลาตั้งแต่ 23 นาฬิกา ถึง 4 นาฬิกา ของวันใหม่ โดยเสียชีวิตช่วงเวลา 23-24 นาฬิกาและ 02-03 นาฬิกา ช่วงละ 2 ราย และ 24-01 นาฬิกา และ 03-04 นาฬิกา ช่วงละ 1 ราย

3.8 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ก) ผู้ตายทั้ง 8 รายมีการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ไม่พอเพียง เนื่องจากมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย

ข) ผู้ตาย ทั้ง 8 ราย บริโภคข้าวจากโรงสี

ค) ผู้ตาย 6 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 75 บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก ส่วนข้าวจำวนั้น บริโภคนาน ๆ ครั้ง ส่วนที่เหลืออีก 2 ราย บริโภคข้าวเหนียวกับข้าวจำวนบ่อย ๆ กัน และอีกรายหนึ่งบริโภคเฉพาะข้าวเหนียวเป็นหลักอย่างเดียว

ง) ผู้ตายทั้ง 8 ราย นิยมบริโภคปลาแดดดิบ เหมือนเช่นชาวชนบทอีสานโดยทั่วไป

3.9 พฤติกรรมในการทำงาน

ก) ผู้ตายทั้ง 8 ราย นอกจากเป็นเจ้าของที่รักษาความปลอดภัยแล้วยังคงประกอบอาชีพรองด้วย คือ 1 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 12.5 ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า ส่วนที่เหลืออีก 7 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 87.5 ยังคงประกอบอาชีพเดิมควบคู่กันไปด้วย คือ ทำนา ทำอยู่ทำกินเหมือนเช่นคนอีสานทำ โดยใช้เวลาที่ไม่ได้เข้าเวรทำ ส่วนเวลาที่เข้าเวรก็มีบุตร ภรรยา คอยดูแล

ข) ผู้ตายทั้ง 8 ราย หรือร้อยละ 50 ดื่มเครื่องดื่มประเภทชูกำลัง เช่น ลิโพ กระทั่งแดง เอ็ม-100 บ่อย ๆ ไม่พบว่าใช้ยาประเภทแก้ปวดหรือยาอื่น พบใช้ยาแก้ปวดหรือยาแก้ปวดอื่น ๆ 3 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 37.5 และพบว่ากินยาสมุนไพรพื้นบ้านประเภทยาหม้อจำนวน 2 ราย หรือร้อยละ 25

3.10 พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความเครียด

ก) ผู้ตาย 4 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 50 ดื่มสุรา 3 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 37.5 พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง อีก 1 ราย หรือร้อยละ 12.5 ไปวัด 5 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 62.5 สูบบุหรี่เป็นประจำ 2 ราย หรือร้อยละ 25 สูบนาน ๆ ครั้ง และอีก 1 ราย หรือร้อยละ 12.5 ไม่สูบบุหรี่เลย

ข) ไม่พบว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วไปเล่นการพนัน พบว่าผู้ตายทั้ง 8 ราย เคยเล่นพนันหวยเถื่อน และ 1 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 12.5 เล่นพนันมวยที่สถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดบ่อย ๆ

3.11 สาเหตุเนื่องมาจากพันธุกรรม

พบว่า 2 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 25 มีญาติเคยไหลตาย โดย 1 ราย พี่ชายร่วมบิดามารดาเดียวกันไหลตาย และอีก 1 ราย น้องชายไหลตาย