

(รวมทั้งสูตรเคซีนและสูตรที่ปราศจากไนโตรเจนด้วย) พบว่า กากเรปซีด และกากทานตะวันมีคุณภาพโปรตีนไม่ต่างกัน ($P>0.05$) โดยมีค่า PER เท่ากับ 1.3 และ 1.0 และ NPR เท่ากับ 2.9 และ 2.9 ค่า NPU ที่คำนวณจากการวิเคราะห์ซากและจากสิ่งขับถ่ายเท่ากับ 45.5 vs. 56.0% และ 72.7 vs. 66.7% ส่วนค่า NPV เท่ากับ 7.9 vs. 9.5 และ 12.1 vs. 11.3 g.N/kg DM feed ตามลำดับ สำหรับค่า BV และ TD ที่ศึกษาในหนูของกากเรปซีดก็มีค่าไม่ต่างจากกากทานตะวันอย่างมีนัยสำคัญ คือ มีค่า BV เท่ากับ 84.9 vs. 83.8% และ TD เท่ากับ 83.8 vs. 83.6% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กากที่ศึกษาทั้งสองชนิดมีคุณภาพโปรตีนต่ำกว่าเคซีน ($P<0.05$)

Thesis Title	Evaluation of True Digestibility, Metabolizable Energy and Protein Quality of Sunflower and Rapeseed Meals		
Author	Mr. Weerasak Samart		
M.S. (Agriculture)	Animal Science		
Examining Committee :	Assoc. Prof. Dr. Suchon Tangtaweewipat	Chairman	
	Assoc. Prof. Dr. Boonlom Cheva-Isarakul	Member	
	Assoc. Prof. Dr. Viboon Ratanapanone	Member	

ABSTRACT

Sunflower meal (SFM) contained CP lower than rapeseed meal (RSM) and soy bean meal (SBM; 28.7 vs. 37.8 and 46.3% DM) but contained higher CF (29.5 vs. 11.8 and 7.6% DM). RSM contained EE lower than SFM and SBM (1.0 vs. 5.4 and 7.9% DM) therefore it had lower gross energy content than the other two meals (4.5 vs. 4.8 and 5.1 kcal/g DM).

The digestibility trial was conducted in 4 artificial anus cocks and 4 normal cocks. It revealed that the true digestibility of most nutrients (DM, CP, EE, NFE and OM) in SBM was significantly higher than SFM and RSM, while that of CF was the highest in SFM. Artificial anus cocks showed higher digestibility of DM, CP, NFE and OM but lower of CF than normal cocks, while that of EE had no significant difference.

True digestible energy (TDE) was found to be higher than ADE. True metabolizable energy (TME) was also higher than AME with regardless of chicken types. However, the energy values of SBM was significantly higher than SFM and RSM. The TME value of the 3 feedstuffs are 3.7 vs. 2.8 and 2.2 kcal/g DM, respectively.

Protein quality of SFM and RSM using 80 heads of 7 days old chicks and 20 heads of 3 weeks old albino rats. Each kind of animals was divided to 4 dietary groups

(including casein and N-free diet). It was found that RSM and SFM had similar protein quality. Their PER values were 1.3 vs. 1.0 and NPR were 2.9 vs. 2.9; NPU values which calculated from carcass analysis and excreta were 45.5 vs. 56.0% and 72.7 vs. 66.7%, respectively. The NPV values were 7.9 vs. 9.5 and 12.1 vs. 11.3 g.N/kg DM feed, . There were no significant differences between RSM and SFM on BV and TD determined in rat (BV = 84.9 vs. 83.8% and TD = 83.8 vs. 83.6%%). However, the protein quality of these 2 oil seed meals was lower than casein ($P < 0.05$).