

3936870 NSMC/M : สาขาวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก ; พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)
 ศัพท์ที่สำคัญ : การสนับสนุนทางสังคม / พฤติกรรมการดูแลบุตรวัยเตาะแตะ /
 มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี

พัชรินทร์ กิตติขงโสภณ : การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลบุตรวัย
 เตาะแตะของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี (STUDY OF SOCIAL SUPPORT AND CHILD-
 REARING BEHAVIORS FOR TODDLERS OF HIV-INFECTED MOTHERS) คณะ
 กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ฟองคำ ติลกสกุลชัย, Ph.D.(Nursing), นางลักขณ์ จินตนาติก,
 พย.ค., วิรัตน์ ไกล่บุปผา, กศ.ม.(วัดผลการศึกษา), 126 หน้า. ISBN 974-589-738-8

ในปัจจุบันการติดเชื้อเอชไอวีกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เพราะเป็นโรค
 ติดต่อร้ายแรงที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงและเด็ก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสนับสนุน
 ทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลบุตรวัยเตาะแตะของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีกลุ่ม
 ตัวอย่างเป็นมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีที่พาบุตรมารับการตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลศิริราช
 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลบำราศนราดูร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 จำนวน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัว แบบสัมภาษณ์การ
 สนับสนุนทางสังคม แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลบุตรวัยเตาะแตะ และนำข้อมูลมา
 วิเคราะห์ห่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม และการสนับสนุนทางสังคม
 รายด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูล ข่าวสาร ด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า ด้าน
 วัสดุ สิ่งของ เงินทอง แรงงาน และด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความสัมพันธ์ทาง
 บวกกับพฤติกรรมการดูแลบุตรวัยเตาะแตะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .001,
 .001, .001, .01 และ .01 ตามลำดับ ($r = .8490, r = .8285, r = .7229, r = .7313$ และ $r = .7257$
 ตามลำดับ) ส่วนพฤติกรรมการดูแลบุตรวัยเตาะแตะ พบว่า มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีมีพฤติ
 การดูแลบุตรโดยรวมอยู่ในระดับดี

ผลการวิจัยเสนอแนะให้ พยาบาลควรให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มารดาที่ติดเชื้อ
 เอชไอวีได้รับการสนับสนุนทางสังคมอย่างเพียงพอ อันจะส่งผลให้มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีมี
 พฤติกรรมการดูแลบุตรวัยเตาะแตะที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป