

3836975 PHPH/M : สาขาวิชา : พยาบาลสาธารณสุข ; (สาธารณสุขศาสตร์)

ศัพท์สำคัญ : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / เอช ไอ วี / สตรีตั้งครรภ์/

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

ฉัจฉนา สุปียพันธ์ุ: ผลการสอนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ แก่สตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ของศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร กรุงเทพมหานคร (THE EFFECT OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES EDUCATION INSTRUCTION USING THE HEALTH BELIEF MODEL AMONG PREGNANT WOMEN OF HEALTH CENTER SERVICE 29 CHAUNG NUCHANETRA, BANGKOK METROPOLITAN) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: จรรยา เสี่ยงเสนาะ M.P.H., เจตน์สันต์ แดงสุวรรณ M.P.H., วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล วท.ม. 216 หน้า ISBN 974-588-985-7

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการสอนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ในสตรีตั้งครรภ์อายุ 13-35 ปี ตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก ของศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2540 กลุ่มตัวอย่าง 96 คน จับคู่เปรียบเทียบตามกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน 48 คู่ โดยกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามด้วยตนเองก่อนการสอนครั้งที่ 1 และหลังการสอนครั้งที่ 2 2 สัปดาห์ และกลุ่มเปรียบเทียบตอบแบบสอบถาม 2 ครั้งในเวลาเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่สร้างตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ สถิติที่ใช้คือ ค่าที(t-test) และสถิติเชิงสัมพันธ์(paired t-test)

ผลการวิจัยพบว่า สตรีตั้งครรภ์กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การปฏิบัติในเรื่องการลดพฤติกรรมเสี่ยงและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์ เพิ่มมากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการรับรู้ผลดีและอุปสรรคจากการปฏิบัติตามคำแนะนำ และการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ แต่เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทำให้ทราบว่า การจัดกิจกรรมการสอนโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ทำให้กลุ่มสตรีตั้งครรภ์เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งควรนำกิจกรรมนี้ไปจัดในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์คนอื่นๆ ให้เกิดการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อไป