

3536188 NSMC/M: การพยาบาลแม่และเด็ก : พย.ม. ( การพยาบาลแม่และเด็ก )

ศัพท์สำคัญ : กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม / ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตร / มารดา /  
เอคส์

พวงทิพย์ สาเลขกานนท์ : การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในมารดาที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ( MATERNAL - NEWBORN ATTACHMENT IN MOTHERS WITH H I V SEROLOGICAL POSITIVE ). คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ยูพิน จันทร์คคะ , วท.บ. ( พยาบาล ) , ค.ม. ( วิจัยการศึกษา ) , ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ , ค.ม. ( สถิติการศึกษา ) , กศ.ค. ( การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ) , สุปราณี อัทธเสรี , วท.บ. ( พยาบาล ) , ค.ม. ( การวัดและประเมินผลการศึกษา ) 87 หน้า. ISBN 974-589-137-1

การที่มารดามีการติดเชื้อ เอช ไอ วี มีผลกระทบทางร่างกายและจิตสังคมในมารดาเหล่านี้ มารดาที่มีความวิตกกังวลต่อภาวะสุขภาพของตนและบุตรในครรภ์ กลัวสังคมรังเกียจ ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก ผู้วิจัยต้องการศึกษาสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก เปรียบเทียบว่ามารดาที่มีปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และการคลอดที่แตกต่างกัน จะมีสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกแตกต่างกันหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่ผลการตรวจเลือดพบว่ามีติดเชื้อ เอช ไอ วี และมาคลอดในโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลบำราศนราดูร จำนวน 120 คน ใช้แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสัมพันธภาพในมารดาที่มีปัจจัยแตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และการทดสอบค่า t (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 15-36 ปี มีอายุเฉลี่ย 25 ปี ร้อยละ 85.8 มีสถานภาพการสมรสคู่ ร้อยละ 65.0 อยู่ในครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ 60.0 มีบุตรคนแรก ร้อยละ 60.8 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และมีรายได้เฉลี่ย 6,989 บาท กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนสัมพันธภาพโดยรวมเท่ากับ 4.1 อยู่ในระดับดี มารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพการสมรส ลำดับที่ของการคลอด และระดับการศึกษา แตกต่างกัน จะมีสัมพันธภาพกับทารกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 .01 .01 .05 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า มารดาที่มีการศึกษาค่ำ หรือมีรายได้น้อย หรือไม่มีคู่สมรส หรือมีบุตรมากกว่า 1 คน เป็นกลุ่มที่มีสัมพันธภาพต่อทารกต่ำกว่ามารดากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรประเมินปัจจัยเหล่านี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในมารดากลุ่มนี้ต่อไป